

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, etc.

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})

Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6^{me})

ABONNEMENT ANNUEL C. C. P. Lyon 101-98	France et Colonies Françaises	500 francs
	Etranger	600 —

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION : Mardi 9 juin, à 20 h. 15

Admission de :

M. R. BÉRARD, Professeur E. N. P., rue Etienne-Mimard, St-Etienne, parrains MM. Mouterde et Terreaux. — M. Marc PITRE, 103, rue Dugesclin, Lyon, parrains Mme Schnurr et M. Coquillat. — M. BRUNET, Professeur au Lycée de Saint-Rambert-l'Île-Barbe (Rhône), parrains MM. Fiasson et Coquillat. — LIBRAIRIE DES SCIENCES, 76-78, Coudenberg (Place Royale), Bruxelles (Belgique).

Questions diverses.

SECTION ENTOMOLOGIQUE : Samedi 13 Juin, à 15 heures

A. DUFRANE : *Saturniidae* d'Afrique.

Captures d'insectes effectuées au cours des dernières excursions.

Présentation d'insectes. — Questions diverses.

SECTION BOTANIQUE : Samedi 13 Juin, à 17 heures

A. QUENEY : Le lac de Chalain (Jura) et sa flore.

Présentation de Plantes. — Questions diverses.

**SECTION GÉNÉRALE (Anthropologie, Biologie, Microscopie,
Sciences Naturelles) : Samedi 20 Juin, à 17 heures**

G. MAZENOT : Révision de la faune malacologique du loess du Bas-Dauphiné aux environs de Lyon.

Questions diverses.

SECTION MYCOLOGIQUE : Lundi 15 Juin, à 20 h. 30

Colonel LACAZE : La classification des Russules d'après « Les Agaricales », T. II (suite).

Dispositions à prendre pour l'Exposition mycologique d'automne.

Présentation de Champignons frais. — Questions diverses.

les églantuleux fort rares manquant fréquemment. — Francheville, Brindas, Craponne, Tassin, Beaunant, Civrieux

Espèce remarquable, éloignée de toute autre dans les *Accitripina*, confondue dans les cultures de JORDAN avec ses hybrides, ce qui a causé l'erreur de SUDRE (*Hieracium* du Centre de la France) lequel lui a réuni *H. concinnum* qui n'a rien à voir avec elle !

H. salticolum Jord. in herb. (Sect. *Accipitrina*). — Tige de 4-8 dm., droite, assez robuste, poilue et rude ; feuilles nombreuses d'un vert pâle, les inférieures longues, lancéolées, longuement atténuées à la base, les moyennes plutôt elliptiques aiguës, les supérieures un peu élargies et arrondies à la base ; toutes à poils épars en dessous, à dents aiguës écartées souvent fortes dans les inférieures, serrées et fines dans les autres, panicule assez allongée à rameaux et pédoncules fins à duvet dense en haut, dressés ou peu écartés ; capitules médiocres à ligules d'un jaune citrin, styles livides ; péricline à bractées subobtusées, foncées mais claires sur les bords, à duvet mélangé de poils simples rares et très courts avec une ligne médiane de poils mélangés, les églantuleux plus longs — Francheville, Marcy, Pollionnay.

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 14 Mars 1963.

FLORULE BRYOLOGIQUE DE MARSEILLEVEYRE

par André LAWALRÉE.

Dans son travail de 1937, MOLINIER (p. 16) a publié une liste de 24 mousses du massif de Marseilleveyre, déterminées par l'Abbé SQUIVER de Carondelet. Ma femme et moi, nous avons recueilli en août 1952 dans le même massif quelques mousses que M. E. CASTAGNE (Tervueren, Belgique) nous a aimablement déterminées et qu'il a accepté d'intercaler dans ses collections. Nous l'en remercions de tout cœur. Ces récoltes portent à 35 le nombre d'espèces connues pour le massif. Il n'y a pas de doute que des recherches systématiques augmenteraient considérablement ce chiffre. Voici la liste des mousses connues du massif de Marseilleveyre, avec l'indication suivante des stations :

- sur les murs des propriétés de Marzargues, Molinier : Maz., MOL. ;
- sur le sol de certaines des garrigues de la sablière d'Anjarre, Molinier : Anj., MOL. ;
- sur les rochers suintants de la Fontaine de Voyre, Molinier : Voyre, MOL. ;
- dans les fentes des rochers moins humides et sur les rochers eux-mêmes, Molinier : rochers, MOL. ;
- rochers secs près des Fabriques, le long du sentier montant au col des Baumettes, Anne-Marie et André Lawalrée-Collaris n° 122 : Baum., L.-C. 122 ;
- entre la Madrague et le bois de la Selle, le long du tracé noir, Anne-Marie et André Lawalrée-Collaris n° 125 : Madr., L.-C. 125 ;
- rochers arides près de la Fontaine de Voyre, Anne-Marie et André Lawalrée-Collaris n° 131 ou 132 : Voyre, L.-C. 131, ou : Voyre, L.-C. 132 ;
- Fontaine de Voyre, Anne-Marie et André Lawalrée-Collaris, n° 137 : Voyre, L.-C. 137.

1. *Fissidens cristatus* Wils. (= *F. decipiens* De Not.). — Rochers, MOL.
2. *Fissidens osmundoides* Hedw. — Madr., L.-C. 125.
3. *Encalypta streptocarpa* Hedw. — Rochers, MOL.

4. *Weisia tortilis* (Schwägr.) C. Müll. (= *Hymenostomum tortile* Br. et Schimp.). — Anj., MOL.
5. *Eucladium verticillatum* Br. et Schimp. — Voyre, L.-C. 137.
6. *Trichostomum brachydontium* Br. — Madr., L.-C. 125 ; Voyre, L.-C. 132.
7. *Trichostomum crispulum* Br. — Madr., L.-C. 125 ; Voyre, L.-C. 131, 132 et 137.
8. *Tortella flavovirens* (Br.) Broth. (= *Trichostomum flavovirens* Br.). — Voyre, MOL.
9. *Tortella nitida* (Lindb.) Broth. — Baum., L.-C. 122 ; Voyre, L.-C. 131, et 137.
10. *Pleurochaete squarrosa* (Brid.) Lindb. — Anj., MOL.
11. *Barbula convoluta* Hedw. — Anj., MOL ; Voyre, L.-C. 131.
12. *Barbula fallax* Hedw. — Maz., MOL. ; Madr., L.-C. 125.
13. *Barbula membranacea* Hedw. — Maz., MOL.
14. *Barbula unguiculata* Hedw. — Anj., MOL.
15. *Pottia Davalliana* (Sm.) C. Jens. (= *P. minutula* [Schleich.] Schimp.). — Anj., MOL.
16. *Pottia lanceolata* (Hedw.) C. Müll. — Anj., MOL. ; rochers, MOL.
17. *Aloina aloides* (Koch) Kindb. (= *Barbatula aloides* Koch)). — Maz., MOL.
18. *Tortula inermis* (Brid.) Mont. — Baum., L.-C. 122.
19. *Tortula intermedia* (Brid.) Berk. — Madr., L.-C. 125 ; Voyre, L.-C. 131.
20. *Tortula muralis* Hedw. f. *obcordata* (Schimp.) Moenkem. (= *Barbula muralis* Timm. var. *obcordata* Schimp.). — Maz., MOL.
21. *Torula ruralis* (Hedw.) Schwägr. (= *Barbula ruralis* Hedw.). — Rochers, MOL.
22. *Grimmia crinita* Brid. — Maz., MOL.
23. *Grimmia orbicularis* Bruch. — Maz., MOL.
24. *Grimmia pulvinata* Sm. — Voyre, L.-C. 131.
25. *Funaria calcarea* Wahlenb. — Rochers, MOL.
26. *Bryum argenteum* Hedw. — Maz., MOL.
27. *Bryum torquescens* Bruch et Schimp. — Maz., MOL. ; Anj., MOL. ; Voyre, MOL.
28. *Orthotrichum anomalum* Hedw. — Rochers, MOL.
29. *Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske (= *Hypnum cuspidatum* Hedw.). — Anj., MOL.
30. *Camptothecium lutescens* Bruch et Schimp. — Anj., MOL.
31. *Homalothecium sericeum* Bruch et Schimp. — Rochers, MOL. ; Madr., L.-C. 125 ; Voyre, L.-C. 131, et 137.
32. *Rhynchostegiella Teesdalei* (Sm.) Limpr. — Voyre, L.-C. 131, 132, et 137.
33. *Rhynchostegiella tenella* (Dicks.) Limpr. — Voyre, L.-C. 137.
34. *Eurhynchium circinatum* (Brid.) Bruch et Schimp. — Voyre, MOL.
35. *Eurhynchium meridionale* (Schimp.) De Not. — Voyre, L.-C. 131, et 132.

OUVRAGE CITÉ :

- R. MOLINIER. — Carte des Associations végétales des Massifs de Carpiagne, Puget et Marseilleveyre ; S. I. G. M. A., Comm. n° 58, 46 p., 1 carte (1937). — Extrait du Bulletin « Le Chêne », n° 44, 3^{me} et 4^{me} trimestres 1937.

Auderghem, San Miniato, Janvier 1953.

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 14 Mars 1953.