

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})

Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6^e)

ABONNEMENT ANNUEL : France et Colonies Françaises : 700 francs — C.C.P. Lyon 101-98
Etranger 800 francs

NOTES FLORISTIQUES (MASSIF CENTRAL — BAS-BUGEY — DOMBES)

par P. CARIÉ.

1°. LAC PAVIN.


Le lac Pavin, typiquement un lac de cratère, est situé à une quinzaine de kilomètres au sud du Mont Dore.

On y trouve, très près de l'embarcadère : *Potamogeton praelongus* ; en dehors du cratère, au bas des pentes Nord : *Salix phylicifolia* (*S. bicolor*), sans fleur ni fruit, étant donné la date (fin juillet).

2°. LAC DES ESCLAUZES.

Ce lac, situé dans le Puy-de-Dôme, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest du Mont Dore, est un lac de tourbière, peu profond, à bords irréguliers. Toute la partie nord et nord-ouest du lac n'est qu'une succession de narses, tourbières mouvantes, assez dangereuses. A peu près au centre du lac, il y a une petite île qui n'est elle-même qu'une tourbière à *Sphagnum* un peu surélevée au-dessus du niveau du lac.

On peut accéder à cette île par deux passages : le premier, proche du village des Esclauzes, est jalonné de perches, l'autre situé dans la partie nord-est est marqué par des Saules peu élevés. Toute la moitié sud du lac est en eau dont la profondeur ne dépasse pas 7 à 8 mètres.



Dans l'île, on trouve : *Eriophorum gracile*, peu abondant ; *Calamagrostis lanceolata*, rare ; *Carex limosa*, rare ; *Carex pauciflora*, assez abondant ; *Scheuchzeria palustris*, abondant ; *Drosera intermedia*, deux ou trois petites places de quelques décimètres carrés ; *Nuphar pumilum*, en bordure sud de l'île.

Dans les narses, en grande quantité : *Rhynchospora alba* ; *Drosera rotundifolia*, en si grande abondance que certaines narses forment de vastes tapis rouges.

Dans la partie sud-ouest du lac, sur une plage sablonneuse submergée : *Littorella lacustris*, très abondante.

3°. LAC DE CÉRIN.

Celui-ci est situé dans le Bas-Bugey, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Belley ; c'est un très petit lac qui a un peu moins de 100 m de diamètre.

Dans la tourbière à sphaigne qui l'entoure, on trouve : *Drosera longifolia*, en grande quantité par place ; *Drosera rotundifolia* ; et mêlé à ces deux Droseras : *Rhynchospora alba*, très abondant.

C'est en somme la même association qu'au lac des Esclauzes.

4°. MARAIS ENTRE SERRIÈRE-DE-BRIORD ET VILLEBOIS (Ain).

On y trouve *Lathyrus palustris* et *Carex filiformis*. Pour ce dernier c'est le gisement le plus proche de Lyon, actuellement connu, mais non encore signalé.

5°. DANS LES DOMBES.

La station de *Carex cyperoides*, signalée par THOMMEN, il y une dizaine d'années, existe toujours, au sud de Dompierre, le long du Vieux Jonc.

A l'étang de la Grange, près de Tramoye, sur la plage est de l'étang : *Elatine hexandra*, en grande quantité.

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 12 octobre 1957.

ERRATA AU BULLETIN XXVI n° 10 DE DECEMBRE 1957

Supplément au Catalogue des Plantes vasculaires de l'Ardèche,
par M. BREISTROFFER

p. 284, n° 408 bis. — Lire : *narbonensis*, au lieu de « *narbonnensis* ».

p. 288, n° 977-981. — Remplacer la 6^e ligne de ce paragraphe, qui reproduit accidentellement la 4^e (corrigée !), par la suivante :

... ssp. *arnicoides* G. Bonnier] ; excl. (?) *H. intermedium* Lapeyr. 1813 et ...

p. 291, n° 1382-83. — Lire Q. au lieu de R.

ECHANGES, OFFRES ET DEMANDES

RECHERCHE squelettes ou ossements isolés (crânes, pattes, etc...) de mammifères et d'oiseaux actuels préparés et ouvrages ou périodiques illustrés traitant en tout ou partie de l'ostéologie des Vertébrés vivants et fossiles (quaternaires). Faire offre détaillée à *Direction régionale des Antiquités préhistoriques, Romaneche-Thorins (Saône-et-Loire)*.

Jan BECHYNE, Museum G. FREY, à Tutzing b. München (Allemagne), prie MM. les Coléoptérologues de la région lyonnaise de bien vouloir avoir l'amabilité de lui confier pour étude les *Chrysochloa*, surtout de la rive droite du Rhône.

Claude-L. JEANNE, 306, cours de la Somme à Bordeaux, aimerait à entrer en relations d'échanges avec Coléoptérologues. Lui écrire.

AIMERAIS ENTRER en relations avec des MYCOLOGUES, même débutants, s'intéressant aux Basidiomycètes Aphyllophorales (à l'exclusion des Polypores), ou susceptibles d'en récolter. — J. BODIN, Laboratoire de Botanique de l'Université, 16, quai Claude-Bernard, Lyon.

A VENDRE, prix intéressant : Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon de 1921 à mai 1940 et Annales du tome 73 au tome 80. Ecrire au bibliothécaire qui transmettra.