

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON. D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Abonnement
annuel } 10 francs.SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

1729 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux
c/c Lyon, 101-98

Le Bulletin n^o 2 n'a pu paraître en son temps par suite d'une grève des ouvriers typographes de la région lyonnaise.

CANDIDATS ADMIS EN LA SÉANCE DU 22 JANVIER DERNIER

M. Champion-British, M^{me} Cassou, MM. Puillet, Burnichon, Geneste, Vines, Rousset, Woldrich, Mazard, Isnard, Aulas, Babault, M^{me} Rousset, MM. Went, Guadagno, Charlier, Berquet, Giraud, Laville, Gorgus et de M. Van Straelen, chef de travaux à l'Université de Bruxelles, 14, rue des Sols, *Paléontologie, Crustacés fossiles*, parrains MM. Dérognat et Gaillard. — M. Larchevêque (Théodore), docteur en droit, avocat à la Cour d'appel, 7, rue Fulton, Bourges (Cher), parrains MM. Ravinet et Nicod. — M. Grassé (Pierre), chargé de travaux pratiques de Protistologie à la Faculté des Sciences, Montpellier, *Protistes, Acridiens*, parrains MM. Lichteinstein et Kühnholtz-Lordat. — M. Barbier (F.), pharmacien, place de l'Eglise, Charolles (Saône-et-Loire), parrains MM. Uselli et Riel. — M. Morault (Charles), chirurgien-dentiste, 2, rue Newton, Nantes (Loire-Inférieure), *Lépidoptères*, parrains MM. Riel et Nicod. — M^{me} Muller (Suzanne), 29, rue Saint-Jean, Lyon. — M. Muller (Laurent), 29, rue Saint-Jean, Lyon, parrains M^{me} et M. Damians. — M. Ceaux (Joseph), Pouilly-sous-Charlieu (Loire). — M. Robelin (Félix), Saint-Nizier-sous-Charlieu (Loire), parrains MM. le D^r Dupont et Uselli. — M. Wehrli (D^r Eugène), 23, Claragraben, Bâle (Suisse), *Zoologie, Entomologie, Lépidoptères*, parrains MM. Mongenet et Riel. — M. Corneloup (Antoine), pharmacien, la Clayette (Saône-et-Loire), parrains MM. Uselli et Riel. — M. Cavallier (Camille), administrateur-directeur de la Société anonyme des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, 9, rue Saint-Léon, Nancy (Meurthe-et-Moselle), *Géologie*, parrains MM. Clerc et Riel. — M. Péneau (Joseph), professeur aux Facultés libres de l'Ouest, 2, rue Volney, Angers (Maine-et-Loire), *Hémiptères, Géologie*, parrains MM. Dejoux et Riel. — M. Ducroux (D^r Henri), rue Baudinot, Charolles (Saône-et-Loire), *Botanique*. — M. Thévenon, insti-

tardent par à languir lorsqu'ils sont envahis par de multiples colonies de cet insecte.

M. POUCHET présente les champignons suivants :

Sarcoscypha Coccinea. Récolte abondante et précoce de cette espèce que l'on trouve habituellement au printemps, deux spécimens ont l'hymenium d'un beau jaune orangé. Récolté à Saint-Maurice-de-Beynost (Ain).

Tricholoma Argyraceum Bulliard, récolté à Saint-Maurice-de-Beynost.

Tricholoma Conglobatum Witt, récolté au fort de Montessuy par M. W. Campens.

Lenzites trabea Pers, récolté à Saint-Maurice-de-Beynost.

Merulius papyrinus Bulliard, récolté à Saint-Maurice-de-Beynost.

Auricularia Cucullata Brand, récolté à Lyon, place Saint-Pothin, sur *Hilanthus glandulosa*.

SEANCE GÉNÉRALE DU 22 JANVIER

M. RIEL présente les lépidoptères suivants du genre *Earias* Hübner (famille des *Noctuidæ*, sous-famille des *Acontianæ*) :

Earias chlorana Linné. Ile du Grand-Camp, Vaux-en-Velin et Saint-Fons (Rhône), Fontgaillarde (Basses-Alpes). Chenille sur *Salix Viminalis* et sur d'autres espèces de *Salix* dont elle lie et recourbe les feuilles. Les chenilles de l'Ile du Grand-Camp et de Saint-Fons, récoltées respectivement les 23 juin 1903 et 3 juillet 1907, ont donné leurs papillons respectivement le 10 juillet et du 19 au 23 juillet. La chenille de Vaux-en-Velin, récoltée le 20 août 1909, a donné son papillon le 25 mai 1910. Ce dernier, issu d'une chrysalide ayant passé l'hiver, est d'un vert beaucoup plus jaune que les quatre de l'Ile du Grand-Camp et de Saint-Fons, qui sont d'un vert plus franc.

Earias bernana Hübner, Lyon, à la partie supérieure du chemin des Deux-Amants, un échantillon très frais pris sur un pilier de reverbère, le 13 mai 1912. C'est la première fois que cette espèce est trouvée à Lyon. Elle avait été signalée antérieurement par Homberg, à Digne (Basses-Alpes). Elle n'est indiquée comme se trouvant en France par aucun des ouvrages généraux sur les lépidoptères, même les plus récents, qui ne l'indiquent qu'en Poméranie, Silésie, Galicie, Hongrie, Autriche et Piémont.

Earias insulana Boisduval, Kaolack (Sénégal). Récolte de G. Melou. Espèce très répandue dans les régions tropicales de l'Ancien Monde et pouvant être très nuisible au coton (*Gossypium herbaceum*) qui est une de ses plantes nourricières. Elle ne paraît pas dépasser, dans la direction du Nord, la Sicile et le sud de l'Espagne.

Earias cupreoviridis Walker, Kaolack (Sénégal). Récolte de G. Melou. Espèce répandue en Afrique et en Asie.

M. LE PRÉSIDENT fait part, à la Société, d'une demande de M. Usuelli, fondateur de notre groupe de Pouilly-sous-Charlieu. M. Usuelli serait reconnaissant à ses collègues qui voudraient bien faire don à ce groupe de leurs ouvrages en double pour aider à constituer une bibliothèque scientifique.