

BULLETIN MENSUEL  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937  
des SOCIÉTÉS BOTANIQUES DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES  
et de leurs GROUPEs REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc.

**Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, 69006 Lyon**

**TRESORERIE :**

T A R I F

	1982
Abonnement France .....	90 F
Membre scolaire .....	45 F
Abonnement Etranger .....	100 F
Changement d'adresse, inscription ou réintégration en sus	10 F

**N.B.** — Les virements à notre C.C.P. LYON 101-98 H ou les chèques bancaires, doivent être rédigés au nom de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON.

**SOMMAIRE**

BALAZUC J. — Laboulbéniales (Ascomycètes) de Madagascar, des Comores et des Mascareignes .....	6
BOUR R. — Etude systématique du genre endémique malgache <i>Pyxis</i> Bell, 1827 ( <i>Reptilia</i> , <i>Chelonii</i> ) (Note complémentaire) .....	28
NÉTIEN G. — <i>Brachypodium phoenicoides</i> R. et S. (= <i>Brachypodium ramosum</i> P.B. var. <i>phoenicoides</i> Koch) dans la région lyonnaise .....	31
NÉTIEN G. — <i>Gagea saxatilis</i> Merk. et Koch. (= <i>G. bohémica</i> (Zausch) R.S. s.sp. <i>saxatilis</i> Koch. (Merk. et Koch.)) .....	32

**GAGEA SAXATILIS MERK. ET KOCH.**  
(= **G. BOHEMICA (ZAUSCH.) R. S. S.S.P. SAXATILIS KOCH.**  
(**MERK. ET KOCH.**))

par G. NÉTIEN.

J. FOURREAU dans son « Catalogue des plantes qui croissent spontanément le long du cours du Rhône » (Ann. Soc. Linn. Lyon, t. 20), signale pour la première fois cette espèce à Vienne le 2 février 1867.

Le Dr SAINT-LAGER en avril 1875 (C.R. Soc. bot. Lyon) signalait sa présence sur les rochers granitiques à l'entrée de la vallée de Leveau, au-dessus de la fabrique de draps de M. BONNIER.

Cette espèce a toujours attiré l'attention des botanistes lyonnais comme on peut le constater par les différents compte rendus parus depuis.

En 1915, M. JACQUET (C. R. Soc. Bot. Lyon, 18 mai) signale une station derrière le vieux château de Seyssuel.

En 1937, J. MÉRIT, (Bull. S.L.L., 44, N° 3) rappelle une station découverte par M. POUZET, vers Seyssuel, à proximité d'une propriété qu'il possédait dans ce village. Il signale la présence de cette espèce dans le massif cristallin de Laveyron-Tain (Drôme), déjà indiquée par LENOBLE dans son Catalogue.

En 1947, il redonne (Bull. S.L.L., N° 4, p. 82) la station classique d'Estressin-Seyssuel.

En 1956, COQUILLAT, dans sa Flore manuscrite en donne la synthèse.  
Nous actualisons les observations des membres de notre Section.

**Isère :**

Seyssuel : Terrain clos vers le château : station disparue.

Château en ruines de Roche-Piquée : la plante existe toujours sur les replats cristallins, les landes et abrupts dominant le Rhône.

Vallée de Leveau : Rochers granitiques à l'entrée du vallon, actuellement inaccessibles (usines), plus loin sur emplacements favorables, présence douteuse ?

**Ardèche :**

Col de la Croix Saint-André : sur un mamelon à l'est, 790 m (LENOBLE).

Tournon : Anfractuosités dans les rochers en montant à Pierras.

La Roche Gordon : près du Coiron (REVOL).

**Drôme :**

Massif de Laveyron-Tain : Sur les pentes et le sommet de Pierre-Aiguille (entre Tain et le village de Croze).

La station existe toujours sur les replats rocheux près de l'antenne de télévision.

Sur les Adrets, au nord du village de Croze.

La floraison précoce en février-mars et la petitesse de cette plante qui mesure entre 3 et 5 cm expliquent qu'elle peut passer inaperçue.

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 15 avril 1981.

N° d'inscription à la C.P.P.P. : 52 199

Le Gérant : Marc TERREAUX

Imp. TERREAUX Frères, 157-159, rue Léon-Blum, 69 - Villeurbanne