

Tome 58

fascicule 6

Juin 1989

Abonnement 140 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : R. ALLEMAND

***Paeonia officinalis* L. subsp. *officinalis* (Renonculacées),
espèce nouvelle pour la flore de l'Isère**

Luc Garraud

1 rue des Aubépins, 69500 Bron.

***Paeonia officinalis* L. subsp. *officinalis* (Renonculaceae),
a new species for the flora of the Isère department.**

Le 28 juillet 1986, non loin de Bourg d'Oisans, près du petit village du Garcin, nous récoltions une pivoine rarement signalée dans cette région. Après consultation des flores et des travaux récents de recensement du conservatoire de Gap, nous avons remarqué qu'à ce jour, la plante n'a jamais été trouvée dans le département de l'Isère. *Flora europea* reste l'ouvrage le plus fiable pour la détermination des pivoines françaises. Notre récolte correspond à *Paeonia officinalis* L. subsp. *officinalis*, la sous-espèce *villosa* plus méridionale se rencontre de la Drôme aux Alpes-Maritimes.

Le village du Garcin se trouve dans les gorges de l'Infernet où coule la Romanche. C'est une vallée assez encaissée qui s'ouvre et se resserre, laissant place à quelques rares replats maintenus en pâturages. C'est sur la rive gauche de la Romanche qu'une population de trente individus colonise, à l'abri de quelques arbustes, les abords d'un pré à fauche au bas des falaises. Difficilement perceptibles dans la végétation, les plantes étaient fructifiées en juillet 1986. Dans ce secteur le substrat est calcaire et présente une flore hélio-thermophile intéressante à signaler : *Veronica spicata* L., *Astragalus cicer* L., *Astragalus onobrychis* L., *Amelanchier ovalis* Medic., *Dictamnus albus* L., *Prunus spinosa* L., *Rubus idaeus* L., *Alyssoides utriculata* (L.) Medic. (= *Vesicularia utriculata* Lam.).

La vallée de la Romanche présente d'autres lieux propices au développement des pivoines, elles sont à rechercher ainsi que d'autres espèces. Une étude de ce secteur rarement exploré serait intéressante.

Nous tenons à remercier M. le Pr. P. BERTHET pour ses déterminations et M. DALMAS du conservatoire de Gap pour ses renseignements concernant la répartition des pivoines.

RÉFÉRENCE

TUTIN T. G. et al., 1964-1980. — *Flora europea*. Cambridge Univ. Press. 5 vol., 2399 pp.