

Tome 60

fascicule 5

Mai 1991

Abonnement 140 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : R. ALLEMAND


Cyclamen balearicum Willk. (Primulacées) en France

Francis Lagarde

1139 avenue des Maladreries, F 30100 Alès.

Cyclamen balearicum Willk. (Primulaceae) in France

Le genre *Cyclamen* est composé d'une quinzaine d'espèces dont certaines comportent de nombreuses variantes (*Cyclamen persicum* Mill. duquel sont issus nos cyclamens des fleuristes, *C. coum* Mill., *C. hederifolium* Willd. (= *C. neapolitanum* Tenore), *C. repandum*



Sibth. & Smith.). Sa zone de distribution est le bassin méditerranéen, surtout du centre vers l'est. Deux espèces sont exclusives à l'ouest de l'Italie : *Cyclamen africanum* Boiss. & Reut. (Algérie) et *C. balearicum* Willk. (sud de la France, Baléares).

Cyclamen balearicum Willk. est une petite espèce qui pousse dans les rocailles calcaires de ravins humides¹, ombrés d'arbres et d'arbustes à feuilles persistantes, en France tout au moins. Si, aux Baléares, il est assez commun, dans le sud de la France il est très dispersé et ses stations disjointes : Pyrénées orientales (une), Hérault (une) et Gard (cinq)². Son tubercule est petit, 2 cm maximum de diamètre, globuleux, brun clair avec quelques radicules partant de sa partie inférieure ; une tige souterraine, plus ou moins longue, portant feuilles et pédoncules, part de la partie supérieure du tubercule. Les feuilles sont jolies, vert foncé avec des marbrures blanc argenté, rarement entièrement vertes, violet carmin en dessous. Les fleurs penchées, solitaires à l'extrémité d'un pédoncule, sont toujours blanches (couleur partagée avec *Cyclamen creticum* Hildebr. et *C. cypricum* Schott. & Kotschy³) ponctuées de fines veines roses dans la partie supérieure des pétales, elles sont très parfumées. Le style est saillant. Les feuilles apparaissent de décembre à février, les fleurs d'avril à mai.

Ses proches parents sont *Cyclamen repandum* Sibth. & Smith. aux nombreuses formes, dont il a longtemps porté le nom comme var. *stenopetalum*, que l'on trouve à l'état spontané de la Corse à Rhodes, essentiellement dans l'humus des sous-bois et *Cyclamen creticum* Hildebr., endémique de Crète.

Je remercie MM. Raoul AURIAULT, Christian BERNARD et Pierre AUBIN pour l'aide qu'ils m'ont apportée pour la rédaction de cet article.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- LORET H. et BARRANDON A., 1876. — *Flore de Montpellier*, Paris, 425 pp.
DE POUZOLZ, 1862. — *Flore du département du Gard*. Coulet C., Montpellier et Delahaye A., Paris, 2 : 31-32.
SAUNDERS D. E., 1975. — *Cyclamen*. Elliot R. C., F.L.S., 34.

1. Toutes les stations sont proches de rivières ou de ruisselets intermittents, voire dans le lit du cours d'eau, comme c'est le cas dans le Gard.

2. Toutes les stations ont été vérifiées.

3. D'autres espèces, dont la couleur normale des fleurs n'est pas le blanc, ont parfois des sujets blancs : *Cyclamen purpurascens* Mill. (= *C. europeum* L.) en Haute-Savoie près de Genève et dans le nord de la Croatie, reconnaissable aussi par ses feuilles entièrement vertes dessus et dessous. *C. repandum* Sibth. & Smith. en Corse et aussi en culture, *C. hederifolium* Willd. en Grèce et courant en culture.