

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON

SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES, RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE



33 rue Bossuet, F 69006 LYON

SOMMAIRE

ABERLENC H.-P. et CURLETTI G. – Une nouvelle espèce pour la faune de France : <i>Agrilus (Agrilus) cytisi</i> Baudi, 1870 (Coleoptera Buprestidae)	55
COLOMB C. – Nouvelles données sur les premiers états et la géonémie de quelques espèces de Lépidoptères	44
LABRIQUE H. et CHAVANON G. – Une nouvelle sous-espèce de <i>Scaurus</i> F. (Coleoptera Tenebrionidae)	41
NOARS P. – Compte rendu de la sortie de la section botanique à Gresse-en-Vercors (Isère), le 12 juin 2004	38
Analyses d'ouvrages	36

CONTENTS

ABERLENC H.-P. et CURLETTI G. – A new species in the French Fauna : <i>Agrilus (Agrilus) cytisi</i> Baudi, 1870 (Coleoptera : Buprestidae)	55
COLOMB C. – New data about early stages and distribution of some species of moths	44
LABRIQUE H. et CHAVANON G. – <i>Scaurus mesatlanticus horstensis</i> , a new subspecies of <i>Scaurus</i> (Coleoptera Tenebrionidae) from Morocco	41
Book review	36

Compte rendu de la sortie de la section botanique à Gresse-en-Vercors (Isère), le 12 juin 2004

Paulette Noars

6 allée des Cerisiers, 69450 Saint Cyr au mont d'Or

Arrêt du matin à la Montagne de Gresse à une altitude de 1500 m environ. Nous herborisons derrière le parking, sur les pentes herbeuses. La partie la plus basse est très humide. La partie haute, plus sèche, en face, est dominée par des crêtes où affleurent les calcaires de l'Urgonien.

Sedum sexangulare L.

Cynoglossum officinale L.

Anthyllis montana L.

Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC.

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Polish, au calice velu, qui se distingue ainsi de *Rhinanthus minor* L. dont le calice sans poils est plus petit et plus rugueux.

Meum athamanticum (Jacq.) ou Fenouil des Alpes.

Polygala calcarea F.W.Schultz, qui se distingue de par sa rosette de feuilles au tiers de la tige.

Coeloglossum viride L. Hartman. (l'Orchis grenouille).

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó.

Tragopogon pratensis L., dont les bractées ont la même longueur que les ligules.

Tragopogon dubius Scopoli, dont les bractées de l'involucre dépassent nettement le capitule.

Valeriana dioica L., dans l'eau au fond du vallon.

Ranunculus aconitifolius L., aux pédoncules velus et aux fleurs blanches.

Carum carvi L. (Anis des Alpes), aux feuilles très finement découpées et aux petites ombelles rosées ou blanches.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Phyteuma orbiculare L.

Phyteuma spicatum L.

Carex halleriana Asso

Leontodon hispidus L.

Linum alpinum Jacq.

Traunsteineria globosa Reichenb. est une Orchidée rose dont le labelle se termine par une petite boule.

Erysimum ochroleucum (Schleicher) DC., Brassicacée à grandes fleurs jaunes.

Minuartia rostrata (Pers.) Reichenb., petite Caryophyllacée ayant des feuilles à 3 nervures.

Rhamnus alpina L.

Rhamnus pumila Turra, sous-arbrisseau couché contre les rochers.

Sorbus aria (L.) Crantz

Sorbus mougeotii Soyer-Willemet et Godron

Veronica teucrium L., qui forme de grandes grappes bleues (*V. austriaca* subsp. *teucrium* (L.) D.A. Webb).

Veronica beccabunga L.

Helianthemum oelandicum (L.) DC, de petite taille avec de petites fleurs jaunes.

Orchis ustulata L. (Orchis brûlé).

Draba aizoides L.

Noccaea alpestris ssp. *sylvium* Gaudin Kuerguelen.

Astragalus depressus L., Fabacée acaule aux très petites fleurs blanchâtres à carène noire et aux gousses au ras du sol.

Alyssum alyssoides (L.) L.

Turritis glabra L.

Hieracium cymosum L., avec ses étonnants capitules de capitules.

Gentiana angustifolia Vill., aux grosses clochettes bleues isolées.
Gentiana verna L. ssp *delphinensis* Beauverd, aux fleurs plus petites, d'un bleu plus clair et au calice ailé.
Paradisea liliastrum (L.) Bertol. (ou lis de St Bruno).
Senecio doronicum (L.) L., à grands capitules jaunes.
Arabis turrata L. reconnaissable à ses siliques rangées du même côté.
Linum alpinum Jacq.
Allium sphaerocephalum L.
Hornungia petraea (L.) Reichenb.
Saxifraga paniculata Miller
Saxifraga granulata L.
Saxifraga tridactylites L.
Cerastium arvense L.

Après-midi : 1^{er} arrêt au carrefour de Chauplane (au-dessous du col de l'Allimas)

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.F. Lang

Plusieurs Erables : *Acer pseudoplatanus* L., *A. opalus* Miller dont les feuilles présentent des lobes arrondis, *A. campestre* L. aux feuilles plus petites et dont les jeunes rameaux présentent souvent des épaississements de liège.

Des Orchidées : *Orchis spitzelli* Sauter ex Koch, de teinte marron, labelle aplati, lobe médian spatulé.

Orchis purpurea Huds.

Orchis pallens L., jaune, à odeur d'urine de chat.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, avec ses feuilles tachetées et son labelle à 3 lobes.

Dactylorhiza sambucina L. jaune, à odeur agréable et montrant des bractées tout au long de la grappe.

Cephalanthera damasonium (Miller).

Des Apiacées :

Laserpitium latifolium L.

Sanicula europea L., aux petites ombelles contractées.

Bunias orientalis L.

Vaccinium myrtillus L. (rare sur calcaire, mais occupe des emplacements décalcifiés).

Galium rotundifolium L.

Prenanthes purpurea L., commune dans la hêtraie-sapinière mais non fleurie en cette saison.

Luzula silvatica (Hudson) Gaudin. Les feuilles de la base sont larges et poilues.

2^e arrêt à la Tourbière de la Batie avec une vue superbe sur le mont Aiguille. La route pour l'atteindre en voiture nécessite de bons amortisseurs !

Nous montons d'abord par le sentier à gauche, qui longe la forêt, pour voir les merveilleux sabots de Venus : *Cypripedium calceolus* L.

Nous rencontrons, en outre :

Sorbus aria (L.) Crantz.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., de teinte violette (Orchis moustique).

Platanthera bifolia (L.) L.M.C. Richard

Listera ovata (L.) R.Br., plante vigoureuse.

Listera cordata R. Br., très petite, n'est pas encore fleurie.

Euphorbia dulcis L. aux glandes rouges.

Euphorbia amygdaloides L. aux glandes jaunes en croissants. Le latex bleuit à l'air.

Paris quadrifolia L. que l'on classe maintenant dans les Trilliacées.

Genista pilosa (L.)

Luzula pilosa L.

Luzula nivea (L.) DC.

Carex sylvatica Huds. aux épis pendants.

Lilium martagon L. est reconnaissable à ses feuilles verticillées, mais il n'est pas encore fleuri.

Veronica latifolia L.

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2005, 74 (2).

Lathyrus vernus L.
Pyrola chlorantha Swartz
Moneses uniflora (L.) A. Gray.
Ophrys insectifera L.
Aster bellidiastrum (L.) Scop. ressemble à une grande pâquerette isolée.
Aposeris fetida (L.) Less. a des feuilles assez semblables à celles du Pissenlit. Elles dégagent une odeur de pommes de terre quand on les froisse.
Salvia glutinosa L. aura des fleurs jaunes en automne.
Campanula rhomboidalis L.
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman est une petite fougère qui pousse sur calcaire.
Linum catharticum L. est petit, à fleurs blanches. C'est le seul lin à feuilles opposées, ce qui lui donne un air de Caryophyllacée.

Nous explorons ensuite la tourbière proprement dite. C'est une tourbière qui a presque achevé son atterrissement. On y trouve :

Carum carvi L.

Valeriana dioica L.

Des Cyperacées :

Une Linaigrette : *Eriophorum latifolium* Hoppe.

Carex flava L.

Carex panicea L.

Carex davalliana Sm. est un *Carex* dioïque.

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link, Scirpe dont les épis sont plaqués et les épillets distiques.

Filipendula ulmaria (L.) Maxime, la Reine des prés.

Equisetum palustre L.

Lotus maritimus L.

Pinguicula grandiflora Lmk.

Trollius europeus L.

Narcissus poeticus L.

Tulipa sylvestris L. ssp. *australis* (Link) Pamp. qui venait juste de terminer sa floraison et dont on pouvait encore voir la couleur jaune du périanthe.

Campanula glomerata L.

Polygonum bistorta L.

Veronica serpyllifolia L. caractérisée par la présence de racines adventives au niveau des noeuds.

Euphorbia flavicoma ssp. *verrucosa* (Fiori) Pignatti

Ornithogalum angustifolium Boreau diffère d'*O. umbellatum* par son bulbe allongé, pyriforme.

Leontodon hispidus L., grande Astéracée jaune.

Thesium pratense Ehrh. une Santalacée hemi-parasite (*Thesium pyrenaicum* Pourret).

Gymnadenia conopsea L.

Nardus stricta L., sous forme de petites touffes noyées dans les autres plantes.

Sur la petite route de Chauplane, au retour :

Cephalaria alpina L. Dipsacacée qui ne fleurira qu'en juillet.

Asphodelus albus Miller.