

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON
SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

ANNÉES 1926-1927

NOUVELLE SÉRIE. — TOME SOIXANTE-TREIZIÈME



α βοτάναι σιγηλῶς τὸ ὠφελοῦν
πρὸςχονται.

LYON

JOANNÈS DESVIGNE & C^{IE}, LIBRAIRES-ÉDITEURS

36 A 42, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU

—
1928

DESCRIPTIONS

DE COLÉOPTÈRES EXOTIQUES.

PAR

M. PIC (1)

Présenté à la Société Linnéenne de Lyon, en la Séance du 6 décembre 1926.

MACRATIA BINHANA Pic. Insecte allongé, prothorax et milieu des élytres noirs, membres roux testacés, base des fémurs postérieurs brune. Tête un peu grosse, lisse, à peine ponctuée, fortement impressionnée sur le vertex ; antennes longues, à derniers articles peu épaissis et courts ; prothorax allongé, pas très large, rétréci en arrière, assez fortement et peu densément ponctué ; élytres pas très longs, subparallèles, roux vers les épaules et au sommet, largement noirs au milieu, inégalement ponctués avec des traces de stries ; pattes assez robustes. Long. 5 mm. Tonkin : Hoa-Binh.

Voisin de *M. nigripennis* Pic, tête plus fortement impressionnée, élytres un peu moins longs et autrement colorés.

NEMOSTIRA JENEIPENNIS Pic. Insecte allongé, brillant, noir métallique avec les élytres bronzés, palpes, antennes et partie des pattes rousses. Tête assez longue, irrégulièrement ponctuée, yeux gros, un peu écartés ; antennes longues et grêles, dernier article excessivement long, sinué ; prothorax un peu plus long que large, un peu rétréci en avant et étranglé postérieurement avec les angles postérieurs avancés, peu et irrégulièrement ponctué ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, atténués au sommet, strié-ponctués, intervalles peu larges, présentant quelques gros points ; pattes grêles. Long. 12 mm. Chine.

Voisin de *N. sinensis* Pic, plus foncé, prothorax un peu moins large, élytres plus longs.

(1) Les diagnoses, pour prendre date, ont paru dans le *Bull. Soc. Linn.*, n° 1, 1927, p. 5 et 6.

CHARIOTHECA ARCUATIPES Pic. Insecte assez allongé, brillant, noir avec le dessus bleuté. Tête à ponctuation assez forte, un peu écartée, subtronquée en avant, antennes rousses ; prothorax court et large, presque droit et faiblement crénelé sur les côtés, à angles antérieurs presque droits, un peu déprimé sur la base, à ponctuation assez forte et écartée ; élytres un peu plus larges que le prothorax, convexes, peu allongés, rétrécis au sommet, à stries fortement ponctuées, intervalles subconvexes, ponctués ; pattes grêles, tibias antérieurs fortement coudés. Long. 5 mm. Ile Banguey.

Voisin de *C. metallica* Pic, plus allongé, prothorax plus déprimé, pattes foncées, etc.

CHARIOTHECA PILIPES Pic. Insecte allongé, brillant, noir bleuâtre avec les élytres cuivreux. Tête et prothorax à ponctuation médiocre et espacée, ce dernier assez court et large, subarqué et un peu crénelé sur les côtés, impressionné en arrière sur le disque, angles antérieurs avancés ; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez longs, atténués au sommet, à stries faibles, fortement ponctuées, intervalles déprimés, peu ponctués ; pattes en partie pileuses, tibias arqués, antérieurs tuberculés en dedans vers le sommet, postérieurs sinués et bi-échancrés en dedans. Long. 10 mm. Sumatra.

Plus grand que le précédent, à coloration différente, tibias antérieurs non coudés et tuberculés, etc.

TETRAGLENES RUFESCENS Pic. Insecte étroit, peu brillant, à pubescence blanche éparsée, de coloration rousse. Tête robuste, pas très longue, antennes à peine plus longues que le corps, diversement villeuses, à poils longs et courts ; prothorax cylindrique, peu long, fortement ponctué ; élytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, peu rétrécis au sommet et subacuminés chacun en pointe courte, à ponctuation forte et contiguë, marqués d'une dépression près de la suture qui apparaît en partie surélevée. Long. 8 mm. Tonkin.

Diffère de *hirticornis* F. par la coloration concolore et les antennes à poils courts et longs.

ZOTALE LONGIPENNIS Pic. Insecte allongé, roux ayant des bandes grises en partie interrompues sur les élytres. Tête courte, sillonnée au milieu ; antennes un peu plus longues que le corps, à premier article peu épais ; prothorax peu allongé, fortement et densément ponctué, orné de trois bandes grises dont une médiane ;

élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, parallèles, courtement atténués au sommet, fortement et densément ponctués, ornés de trois bandes grises en partie interrompues, pourtour un peu pubescent. Long. 7 mm. Chine.

Voisin de *Z. minuta* Pic, en diffère, à première vue, par les élytres plus longs et plus larges par rapport au prothorax.

MELIXANTHUS ATRIVENTRIS Pic. Insecte subovale, convexe, noir, prothorax marqué de jaune sur les côtés, élytres jaunes, assez largement noirs au sommet, avec une grosse macule humérale et la suture noires. Yeux assez écartés, tête à ponctuation forte, peu écartée; prothorax court et large, rétréci en avant, étroitement rebordé en avant et sur les côtés, peu distinctement ponctué avec une rangée transversale de points sur le milieu de la base; écusson assez grand; élytres larges et courts, un peu rétrécis en arrière, subtronqués au sommet, ayant des rangées de points fins; pygidium fortement ponctué. Long. 3 mm. Tonkin: Hoa-Binh. Reçu du R. P. de Cooman.

Voisin de *M. rufiventris* Pic, en diffère, à première vue, par le ventre et le sommet des élytres noirs.