

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON
SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

ANNÉES 1926-1927

NOUVELLE SÉRIE. — TOME SOIXANTE-TREIZIÈME



α βοτάναι σιγηλῶς τὸ ὠφελοῦν
πρὸς τυχόνται.

LYON

JOANNÈS DESVIGNE & C^{IE}, LIBRAIRES-ÉDITEURS

36 A 42, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU

—
1928

FAUNE
DES
COLÉOPTÈRES DE LA RÉGION LYONNAISE
FAMILLE DES LONGICORNES

PAR
D^r S. BONNAMOUR

avec la collaboration de la Section Entomologique de la Société Linnéenne
de Lyon.

Présenté à la Société Linnéenne de Lyon, en la Séance du 14 novembre 1927.

Pour la rédaction de ce catalogue des Longicornes, nous avons suivi la nomenclature du remarquable ouvrage de Planet (1), sur les *Longicornes de France*, auquel nous renvoyons pour la description de chaque insecte.

Nous avons puisé aux mêmes sources que pour notre catalogue des Cincidèles. Nos collègues de la Section entomologique ont tous répondu aimablement à mon appel. Nous apportons simplement comme document nouveau, les indications tirées de la belle collection de l'entomologiste lyonnais, le D^r Robert, qui a été si obligeamment donnée à notre Société, par son gendre, notre collègue le D^r Commandeur.

Tribu I. — SPONDYLIENS.

Genre SPONDYLIS Fabricius.

SPONDYLIS BUPRESTOÏDES Linné.

Répandu dans toutes les parties de la France où se trouvent des forêts de pins et de sapins, dans les souches desquels vit sa larve. On l'a trouvé :

Dans le Rhône : Saint-Didier-au-Mont-d'Or, attiré par la lumière (E. Roman) ; Vaugneray (P. Nicod) ; le Lyonnais (coll. Gabillot), Yzeron (Riel), Lamure, Poule (Pic).

Dans l'Isère : Saint-Julien-de-Ratz (Sérullaz) ; Grande-Charreire (coll. Rey).

(1) M. Planet, les Longicornes de France (*Encyclopédie entomologique*, Paris, Lechevalier, 1924).

Dans la Loire : au Mont-Pilat (Falcoz).

Dans la Haute-Loire : à Tence (Maneval).

Dans l'Ardèche : à la Louvesc (ma coll.).

Dans la Savoie : à Saint-Michel-de-Maurienne (ma coll.).

Dans la Haute-Savoie : Chamonix (M. Rey).

Tribu II. — PRIONIENS.

I. Genre PRIONUS Müller.

PRIONUS CORIARIUS Linné.

Vit dans les vieilles souches de plusieurs espèces d'arbres : le Chêne, le Hêtre, le Châtaignier, le Cerisier et le Pin.

Semble répandu dans la majeure partie de la France continentale.

Dans le Rhône : Mornant, Brignais (ma coll.) ; Vaugneray (P. Nicod) ; le Lyonnais (coll. Gabillot).

Dans l'Isère : Vienne, Châtonay (Falcoz) ; Saint-Julien-de-Ratz (Serrullaz).

Dans la Haute-Savoie : environs de Conflans (Perrier et de Manuel).

Dans l'Ardèche : la Louvesc (ma coll.).

Dans la Haute-Loire : Tence (Maneval).

Dans le Jura : forêt de Chaux, sur une souche de chêne (Gruardet)

II. Genre TRAGOSOMA Serville.

TRAGOSOMA DEPSARCUM Linné.

Est un hôte des forêts de Conifères, mais ne se trouve qu'à partir de 1.800 mètres d'altitude, dans les montagnes des Alpes et des Pyrénées.

On l'a signalé (d'après Planet) en Savoie (Stierlin).

En Haute-Savoie : Chamonix (Villard, coll. Gabillot, Perrier et de Manuel).

III. Genre ERGATES Serville.

ERGATES FABER Linné.

Hôte habituel du Pin dans les souches duquel vit sa larve.

D'après Planet, il est répandu dans la majeure partie de la France méridionale ; il est commun dans les Landes, le Var, les

Alpes-Maritimes, les Pyrénées, et dans une partie de la région lyonnaise.

Dans cette région on l'a trouvé :

Dans le Rhône : Grisard, au-dessus de Sainte-Colombe (Falcoz) ; Vaugneray (P. Nicod) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Pet-du-Loup près Givors (Sérullaz) ; la Tour-de-Salvagny, Yzeron (Riel).

Dans la Haute-Loire : à Tence (Maneval).

Il semble bien que le Rhône soit sa limite septentrionale.

IV. Genre *ÆGOSOMA* Serville.

ÆGOSOMA SCABRICORNE Scopol.

Vit aux dépens du Hêtre, mais attaque aussi le Tilleul, le Châtaignier, le Peuplier, le Saule, le Noyer, le Chêne, ainsi que les arbres fruitiers : le Cerisier, le Prunier, le Poirier, etc.

Est répandu dans toute la France orientale et méridionale. Planet dit qu'on le trouve dans la région lyonnaise (Mulsant).

Dans le Rhône : à Lyon même, parc de la Tête-d'Or, les Massues (Riel) ; Bron (Pic) ; Saint-Genis-Laval (ma coll.) ; Saint-Didier-au-Mont-d'Or, vallon d'Arches (E. Roman) ; Vaugneray (P. Nicod) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Saint-Yvours (Sérullaz) ; Irigny (ma coll.).

Dans l'Isère : à Vienne, Estressin (M. Falcoz, qui a trouvé sa larve dans l'Ailante) ; Grande-Chartreuse (coll. Rey).

Dans la Côte-d'Or : Saint-Jean-de-Losne (Testout).

Tribu III. — LEPTURIENS.

SECTION I. LEPTURAIRES.

I. Genre *STRANGALIA*.

1^o *STRANGALIA* AURULENTA Fabricius.

Signalée de différentes régions de la France où poussent l'Orme, le Saule, le Noyer, le Châtaignier, le Bouleau, le Hêtre, arbres aux dépens desquels vit sa larve.

Dans notre région, on l'a trouvée :

Dans le Rhône : Limonest (E. Roman) ; le Lyonnais (coll. Gabillot, coll. Robert).

Dans l'Isère : Feyzin (Falcoz) ; la Grande-Sure (Sérullaz).

Dans le Dauphiné (Planet) : Chartreuse (coll. Rey, Riel).

Dans la Savoie (Planet) : les Tines (coll. Robert).

Dans la Haute-Savoie : forêt de Rhône, Tamié (Perrier et de Manuel).

Dans le Jura : Fraisans (Gruardet).

2^o STRANGALIA QUADRIFASCIATA Linné.

Se rencontre partout où se trouvent des Saules, des Bouleaux, des Aulnes et des Peupliers, dans les souches desquels vit sa larve.

Dans notre région on l'a signalée :

Dans l'Isère : Mont Buet (Falcoz), le Dauphiné (Planet), Grande-Chartreuse (coll. Rey).

Dans la Haute-Savoie : Chamonix (E. Roman, coll. Rey, Riel) ; bois du Mardon, Hauteluce (Perrier et de Manuel).

Dans la Savoie (Planet).

Dans la Haute-Loire : Tence (Maneval).

3^o STRANGALIA ARCUATA Panzer.

Plus rare que la précédente ; vit probablement aux dépens des mêmes arbres. Se trouve surtout sur les fleurs.

Sembler être plus spécialement montagnarde.

Planet la signale de Lorraine et d'Alsace et pour notre région :

Dans l'Isère : la Grande-Chartreuse.

Mais je n'en ai trouvé aucune indication dans nos collections lyonnaises. Elle a été prise en 1873 au Colombier (Ain) et en 1876 à Bonneval (Savoie) (1).

4^o STRANGALIA ÆTHIOPS Poda.

Se trouve surtout sur les fleurs des Valérianes (Bedel). Un peu plus fréquente, surtout plus répandue que la précédente.

Planet la signale du Jura, de l'Allier et de la Drôme.

On l'a trouvée :

En Savoie : Valloires, fort du Télégraphe (ma coll.).

Dans l'Ain : Nantua (coll. Gabillot) ; les Echets (coll. Robert).

Dans la Côte-d'Or : Saint-Jean-de-Losne (Testout).

5^o STRANGALIA MACULATA Poda.

Très commune partout ; sa larve vit dans différentes essences et en particulier dans le Bouleau.

(1) A. T., Belley, quelques mots sur sa flore et sur sa faune entomologique, *Feuille des Jeunes Naturalistes*, 1873, n^o 43, p. 83, et *Quinze jours dans les Alpes de Savoie, même journal*, 1876, n^o 73, p. 6.

On l'a rencontrée :

Dans le Rhône : Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman) ; Vaugneray (P. Nicod) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Dardilly (Riel).

Dans l'Isère : le Vercors, la Grande-Chartreuse, le Devoluy (Falcoz, coll. Rey, Riel, Testout) ; Allevard, le Bourg-d'Oisans (Gruardet) ; Saint-Julien-de-Ratz, la Grande-Sure (Sérullaz).

Dans la Loire : Mont Pilat (Falcoz).

Dans l'Ain : Hauteville (ma coll.).

Dans la Haute-Loire : Tence (Haute-Loire).

Dans la Savoie : Chales, fort du Télégraphe (ma coll.).

Dans la Haute-Savoie : Talloires, le Salève (ma coll.).

Dans le Jura : Fraisans, sur les fleurs de ronces (Gruardet).

Dans le Doubs : Pontarlier (Gruardet).

I. *Sous Genre TYPOCERUS.*

TYPOCERUS ATTENUATUS Linné.

Assez répandu surtout dans les régions montagneuses, sur les fleurs en ombelles, les Spirées.

Dans notre région a été trouvé :

Dans le Rhône : Saint-Genis-Laval, sur des Roses (ma coll.) ; Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Yvours (Sérullaz) ; Tassiu (Riel).

Dans l'Isère : le Vercors, la Grande-Chartreuse, le Devoluy (Falcoz) ; Allevard (Gruardet).

Dans la Loire : le Mont Pilat (Falcoz).

Dans le Jura : forêt de Chauz, près Fraisans (Jura).

Dans l'Ain : Belley (A. T.).

II. *Sous Genre STENURA.*

1° STENURA NIGRA Linné.

Répandue dans une grande partie de la France. On l'a rencontrée dans notre région :

Dans le Rhône : à Dardilly, à Limonest (E. Roman) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; le Beaujolais (coll. Rey) ; Charbonnières (Riel).

Dans l'Isère : Vienne, Grisard (Falcoz) ; Allevard (Gruardet).

Dans le Jura : Fraisans (Gruardet).

Dans la Côte-d'Or : Saint-Jean-de-Losne (Testout).

Dans l'Ain : Belley (A. T.).

2° *STENURA BIFASCIATA* Müller.

Vit sur les fleurs des arbrisseaux et des plantes basses. Semble plus estivale que la précédente.

Dans le Rhône : à Lyon, jardin de la Faculté de Médecine, sur des Ombellifères ; Saint-Genis-Laval, sur des blés en fleur ; Champagne-au-Mont-d'Or (ma coll.) ; Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Yvours (Sérullaz) ; Dardilly (Riel) ; Francheville (ma coll.) ; Poule (Pic).

Dans l'Isère : Vienne (Falcoz) ; Décines (Riel) ; la Grande-Chartreuse (Testout).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.) ; la Maurienne (Riel).

Dans la Haute-Savoie : Talloires (ma coll.).

Dans la Haute-Loire : Tence (Maneval).

Dans le Jura : Fraisans (Gruardet).

Dans les Hautes-Alpes : la Grave (Gruardet).

3° *STENURA MELANURA* Linné.

Très voisine de la précédente dont elle diffère par un aspect plus mat, une pilosité plus fournie, le dessous du corps entièrement noir chez l'un et l'autre sexe, une dépression transversale du prothorax limitée à chacune des sinuosités basilaires du bord postérieur ; la ponctuation du prothorax dense et bien marquée.

Très commune sur les fleurs les plus diverses des plantes basses ou herbacées.

Dans le Rhône : Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; bois de Marcy (Riel) ; Saint-André-la-Côte (ma coll.) ; Poule (Pic).

Dans l'Isère : Moras (ma coll.) ; Vienne, la Grande-Chartreuse, le Devoluy (Falcoz) ; la Grande-Chartreuse (Testout) ; la Grande Sure (Serullaz).

Dans l'Ain : Divonne (E. Roman) ; Hauteville (ma coll.).

Dans la Haute-Savoie : Talloires, sur des Ombellifères (ma coll.) ; le Salève (ma coll.).

Dans la Savoie : Chamouix (coll. Robert).

Dans le Jura : Fraisans (Gruardet).

Dans le Doubs : Pontarlier (Gruardet).

III. Sous Genre SPHENALIA.*SPHENALIA REVESTITA* Linné.

Semble peu répandue dans notre région. On l'a signalée :

Dans le Rhône : Saint-Didier-au-Mont-d'Or, un mâle de la variété *ferruginea* Mulsant (E. Roman) ; Vaugneray (P. Nicod) ; Lyonnais (coll. Gabillot) ; Yvours (Sérullaz) ; Charbonnières (Riel).

Dans l'Isère : Vienne, élevé sur branche d'Orme (Falcoz).

Dans la Savoie : sur les fleurs d'Aubépine, Moutiers (Perrier et de Manuel).

II. Genre **LEPTURA** Linné.

1^o **LEPTURA DUBIA** Scopoli, syn. **L. CINCTA** Gyll.

Sa larve se développe dans l'aubier des Sapins morts. Doit donc se trouver partout où il y a des sapins ; semble répandue dans toute la France.

Dans notre région a été trouvée :

Dans le Rhône : Lamure (Pic).

Dans l'Isère : Pjanet l'a prise à la Grande-Chartreuse ; elle y a été retrouvée par Gabillot, Rey, Gruardet, E. Roman, Riel, Testout. Dans le Devoluy (Falcoz).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.) ; montagnes de la Savoie (Perrier et de Manuel).

Dans la Haute-Savoie : dans les montagnes (Perrier et de Manuel).

Dans le Doubs : à Pontarlier (Gruardet).

Dans la Loire : au Mont Pilat (Falcoz).

2^o **LEPTURA SANGUIOLENTA** Linné.

Sa larve vit dans les souches des Conifères. Semble plus localisée aux régions montagneuses.

On l'a signalée :

Dans le Rhône : les Jumeaux de Vaugneray (Colleur, Riel), Lamure (Pic).

Dans l'Isère : à la Grande-Chartreuse (coll. Gabillot, coll. Rey, Riel, E. Roman, Testout) ; à la Grande Sure (Sérullaz) ; le Bourg-d'Oisans (Gruardet) ; le Devoluy (Falcoz).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe (ma coll.) ; dans la Maurienne (Falcoz) ; Argentières (coll. Robert) ; montagnes de la Savoie (Perrier et de Manuel).

Dans la Haute-Savoie : Talloires (ma coll.) ; montagnes de la Haute-Savoie (Perrier et de Manuel).

Dans la Loire : au Mont Pilat (Falcoz).

Dans les Basses-Alpes : aux environs de Fontgaillarde (Riel).

3° LEPTURA TESTACEA Linné (*rubra* ♀ L.).

La larve vit dans les Conifères. On trouvera donc cette espèce partout où il y a des forêts de Pins et de Sapins, spécialement d'après Planet dans les Alpes et les Pyrénées.

Dans notre région on l'a signalée.

Dans le Rhône : Saint-André-la-Côte (ma coll.) ; le Lyonnais (coll. Gabillot) ; Vaugneray (Nicod) ; le Mont Verdun, les Echarmaux, Saint-Martin-en-Haut (E. Roman) ; la Tour-de-Salvagny (Riel) ; Lamure, Poule (Pic).

Dans la Savoie : fort du Télégraphe, le Salève (ma coll.).

Dans la Haute-Savoie : Talloires, la Tournette (ma coll.).

Dans l'Isère : Saint-Julien-de-Ratz, la Grande Sure (Sérullaz) ; la Grande-Chartreuse (coll. Rey, Riel, Testout) ; Allevard (Gruardet) ; le Vercors (Falcoz) ; Chartreuse de Saint-Hugon (Riel).

Dans le Doubs : Pontarlier (Gruardet).

Dans la Haute-Loire : Tence (Maneval).

Dans la Loire : Mont Pilat (Falcoz).

Dans l'Ain : Belley (A. T.).

4° LEPTURA VIRENS Linné.

Espèce de montagne, dont la larve vit aussi sur les Conifères ; Planet la signale de Savoie, du Dauphiné, du Jura et des Pyrénées.

On l'a trouvée :

Dans la Haute-Savoie : Talloires (ma coll.) ; Tamié, lac de la Girottaz, Beaufort (Perrier et de Manuel).

Dans l'Isère : la Grande Sure (Sérullaz) ; la Grande-Chartreuse (coll. Rey, E. Roman, Riel) ; le Vercors, le Mont Buet (Falcoz).

5° LEPTURA SCUTELLATA Fabricius.

Vit aux dépens du Chêne, de l'Aulne, du Hêtre et du Pin maritime.

On l'a trouvée :

Dans l'Isère : la Grande-Chartreuse (coll. Rey).

Dans la Haute-Savoie : forêts de Rhône et du Gueberre (Perrier et de Manuel).

La collection Gabillot en contient quelques exemplaires dont la provenance est indiquée simplement : les Alpes.

(A suivre.)