

# ANNALES

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE

## DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON  
SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

---

ANNÉES 1926-1927

NOUVELLE SÉRIE. — TOME SOIXANTE-TREIZIÈME



α βοτάναι σιγηλῶς τὸ ὠφελοῦν  
πρὸς τυχόνται.

LYON

JOANNÈS DESVIGNE & C<sup>IE</sup>, LIBRAIRES-ÉDITEURS

36 A 42, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU

—  
1928

# CURCULIONIDES NOUVEAUX

## DE L'AFRIQUE TROPICALE

FABR

A. HUSTACHE

Présenté à la Société Linnéenne de Lyon, en la Séance du 11 octobre 1920.

(Suite)

---

### CEUTHORRHYNCHUS SCHIMPERI n. sp.

Brièvement ovale, d'un rouge ferrugineux, les interstries des élytres munis chacun d'un rang de soies nombreuses, épaisses, semi-dressées, flaves; canal rostral profond sur le prosternum, effacé en arrière de ce dernier.

Rostre plus long que le prothorax, cylindrique, modérément arqué, d'un roux clair, submat, ponctué et éparsément squamulé de flave à la base, lisse au sommet. Antennes insérées vers le milieu du rostre, grêles, éparsément pubescentes; scape modérément épaissi au sommet; funicule de 7 articles, les deux premiers allongés, le 1<sup>er</sup> le plus long, les 5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup>, courts subglobuleux, la massue ovale, courte. Tête convexe à ponctuation serrée, éparsément squamulée de flave; yeux ronds, assez convexes. Prothorax transversal, trapézoïdal, fortement rétréci en avant, le bord antérieur sinué et assez fortement relevé au milieu, les lobes oculaires faibles, la base légèrement bisinuée, du double de la largeur du bord antérieur, brièvement redressée contre celle des élytres et étroitement noire; disque convexe, canaliculé en son milieu, muni de chaque côté vers le tiers basal, d'un tubercule assez fort, à ponctuation assez serrée, peu profonde, revêtu de squamules flaves, éparses, plus serrées sur les bords latéraux et la ligne médiane, muni de soies brunes, beaucoup plus courtes que celles des élytres et dirigées en avant. Ecusson très petit, squamulé. Elytres vers la base de un tiers plus larges que le prothorax, un

peu plus longs que larges entre les épaules (celles-ci arrondies), légèrement arqués sur les bords, séparément arrondis au sommet; convexes, le calus apical assez marqué; stries médiocres, peu distinctement ponctuées; interstries convexes, assez brillants entre les soies, le sutural en tout ou en partie rembruni. Pattes assez courtes, faiblement squamulées; fémurs modérément et graduellement épaissis, inerimes; tibias droits, leurs corbeilles tarsales courtes; ongles simples. Dessous couvert de squamules appliquées, serrées, ovales, d'un flave cendré; canal rostral profond en avant des hanches antérieures, effacé en arrière de ces dernières.

Long. 1,7 millimètres.

Abyssinie (Schimper, 1850, Mus. de Paris).

*Observation.* — Un spécimen est d'un brun foncé, presque noir.

#### CEUTHORRHYNCHUS KOTONOUI n. sp.

Brièvement ovale, brun noir, les pattes d'un rouge ferrugineux, les antennes et le rostre d'un roux clair, couvert en dessous de squamules rondes, grises, peu serrées, en dessus de squamules grises et brunes, ces dernières en partie condensées en touffes.

Rostre mince, arqué, plus court que le prothorax, roux clair, lisse, brillant, sa base finement ponctuée et squamulée de cendré. Antennes grêles, submédianes d'un testacé clair; scape épaissi au sommet; funicule de 7 articles, le 1<sup>er</sup> à peine aussi long et plus épais que le 2<sup>e</sup>, la massue oblongue acuminée. Tête densément ponctuée, éparsément squamulée de brun. Prothorax transversal, fortement rétréci de la base en avant, les bords latéraux presque droits, brièvement rétrécis, arrondis à la base, celle-ci bisinuée et plus du double de la largeur du bord antérieur; disque très inégal, muni de 4 tubercules fasciculés bruns, deux antérieurs, deux médians beaucoup plus élevés, ces quatre tubercules placés sur deux lignes élevées, séparées par le profond et large sillon médian, à ponctuation serrée et squamules soulevées. Écusson petit et enfoncé. Elytres courts, pas plus longs que larges, les épaules brièvement arrondies, leur plus grande largeur un peu en arrière de ces dernières, assez fortement arqués sur leurs bords, largement et séparément arrondis au sommet; stries larges, profondes, bien ponctuées, subdénudées; interstries irréguliers, subplans,

munis chacun d'un rang de squamules grossières, soulevées, serrées, d'un gris sale et brunes, ces dernières condensées par places et formant quelques petites touffes en avant, sur les 3<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> interstries ; disque déprimé autour de l'écusson, transversalement impressionné derrière la base, celle-ci brièvement relevée contre celle du prothorax, le calus apical peu marqué. Pattes éparsément recouvertes de fines squamules cendrées, les tibias et tarses d'un roux plus clair ; fémurs épaissis presque dès la base, un peu comprimés, armés en dessous d'une petite dent, et sinués légèrement entre le genou et cette dent ; tibias légèrement arqués, leur corbeille tarsale courte ; tarses courts ; ongles petits et simples. Canal rostral atteignant le métasternum.

Long. 2,5 millimètres.

Dahomey : Kotonou (J. Decorse, 1904, Mus. de Paris).

Une douzaine de spécimens. Les touffes de squamules brunes sur les élytres varient en nombre et en épaisseur.