

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gén. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; *Trésorier* : M. F. RAVINET, 11, r. FranklinAbonnement
annuel } 10 francs.SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

2619 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.***Ont été admis à la séance du 8 novembre :*

MM. Courtois, Dissard, Widmann, Gavelle, Tallon, Odic.

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MM. les Membres du Conseil d'administration sont priés de bien vouloir se réunir, lundi 22 novembre, à 16 h. 30.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Lundi 22 Novembre 1926, à 17 heures1^o *Vote sur l'admission des candidats présentés à la séance du 8 novembre.*2^o *Présentation de :*

M. Monneret (Georges), 9, cours Tolstoï, Villeurbanne (Rhône). — M^{me} Loras (veuve), 9, cours Vitton, Lyon (6^e). — M. Dubouis (L.), négociant, rue Nationale, Charlieu (Loire), par M^{me} et M. Usuelli. — M. Coudeyras (Antoine), instituteur, Aix-la-Fayette, par Saint-Germain-l'Herm (Puy-de-Dôme), *Entomologie*, par MM. Dissard et Riel. — M. Chaudoir (Georges), 24, rue Dauphine, Paris (6^e), par MM. Riel et Nicod. — M. Bertheux (Auguste), 259, grande rue de la Guillotière, Lyon (7^e), par MM. Gabier et Riel. — M. Marquis (Henri), professeur au Lycée Ampère, 20, quai Fulchiron, Lyon (5^e), par MM. A. Laurent et Pouchet. — M. Suchel (A.), industriel, Thizy (Rhône), par MM. Cathelin et Pouchet.

« *Lepiota cinerascens* Quélet. Me paraît bien cette espèce qui n'a pas le pied bulbeux ou presque pas. » *in litt.* 9 octobre 1907. Pied long, grêle, très fragile, flexueux, comme n'ayant pas la force de soutenir le poids du champignon. Chapeau d'un joli gris clair subtilement rosé au centre qui est très légèrement squamuleux-pelucheux, blanchâtre au bord. La description de QUÉLET correspond bien, mais sa figure ne cadre pas du tout comme forme du pied qui est dans la figure de QUÉLET, plutôt massif que grêle et plutôt en massue renversée que cylindrique comme dans nos échantillons. L'habitat de QUÉLET : été, dans les forêts des environs de Marseille, ne concorde guère non plus. Il reste donc un certain doute. A remarquer que la détermination de BOUDIER n'a pas été faite d'une manière nettement affirmative. Si notre espèce n'est pas celle de QUÉLET, il s'agit vraisemblablement d'une espèce non dénommée.

Phallus roseus Quélet. *P. imperialis* Kalch. Roanne, dans la cour du Lycée, sous les cèdres, et sur la levée du rivage. Diffère de *P. impudicus* L. par la valve d'un rose pourpre. L'odeur serait aussi beaucoup moins accentuée.

Lycoperdon marginatum Vitt. Roanne. Déterminé par M. POUCHET. L'exoperidium est recouvert d'aiguillons serrés, connivents au sommet par une pointe recourbée. Les spores sont très légèrement verruculeuses et le capillitium est imperforé. Cette espèce ressemble à *L. pyriforme* Schaeff. qui en diffère par ses aiguillons non connivents, par ses spores absolument lisses, parce qu'il est le plus souvent cespiteux et par son habitat fréquemment lignicole. Elle ressemble aussi à *L. umbrinum* Pers. qui en diffère par ses aiguillons également non connivents et par ses spores échinulées-alvéolées.

Geaster fornicatus Huds. La Pirotte, à 1 kilomètre de l'Hôpital-sur-Rheins, leg. FLAMENS. Toujours reconnaissable à son orifice conique, aigu, cilié-fimbrié, nettement délimité par un pourtour orbiculaire et à son enveloppe extérieure se divisant le plus souvent en 4 lobes renversés soulevant le peridium qui se trouve ainsi supporté par une voûte (*fornix*).

SÉANCE GÉNÉRALE DU 8 NOVEMBRE

Petites contributions à la faune malacologique du Nord de la France

Par M. H. CARDOT.

Nous donnons ci-dessous l'indication de quelques stations nouvelles observées dans les départements des Ardennes, de la Seine-et-Oise et de la Seine-Inférieure.

Hyalinia helvetica (Blum). Cette espèce, de même que sa voisine, *H. alliaris* (Miller), a déjà été signalée dans le département de la Seine-Inférieure, à Veules-en-Caux, par COCKERELL en 1885. En raison de la discussion relative à la distinction de *H. helvetica* et des *H. glabra* (Stud.) et *subglabra* (Brgt.), et de la confusion qui subsiste encore, semble-t-il, à ce sujet, entre les auteurs anglais et continentaux, nous croyons utile de confirmer la présence de *H. helvetica* dans la région en question. Nous avons en effet retrouvé à Saint-Pierre-en-Port des représentants de cette espèce, entièrement conformes aux diagnoses données par J.-W. TAYLOR (*Monograph of the land and freshwater Mollusca of the British Isles*, III, 45-49, 1907). Dans cette localité, *H. helvetica* et *H. alliaris* vivent à très peu de distance l'une de l'autre, mais dans des stations ayant des caractères bien différents. *H. alliaris* est commune dans la mousse des pelouses gazonnées qui s'étalent au sommet des falaises

crétacées ; elle y vit en compagnie de *Vitrina pellucida*, de *Hyalinia nitidula* et *crystallina*. *H. helvetica* est localisée au contraire au pied même de la falaise, sous les débris rocheux qui s'accumulent en cet endroit, à quelques 20 ou 30 mètres de la laisse de haute mer. Elle y est accompagnée de *H. lucida*, de *Pyramidula rotundata* et de *Helix hispida*. Jamais nous n'avons constaté la présence simultanée des deux espèces, *H. helvetica* et *H. alliaria*, en un même point, non plus que des formes de passage entre l'une et l'autre, ou entre *H. helvetica* et *H. lucida*.

Pupilla cylindracea (Da Costa). Rochers du calcaire dévonien à Chooz (Ardennes). Cette espèce n'avait pas encore été signalée dans le département, mais elle était connue dans l'Ardenne belge, à Dinant et à Namur.

Lithoglyphus naticoides (Fér.). Canal de Chelles (latéral à la Marne), à Ville-Evrard (Seine-et-Oise). Jusqu'à présent, cette espèce a donc été signalée dans les départements suivants : Ardennes en 1909, Meuse en 1910 (*H. Carnot*, *Journ. Conch.*, LVIII et Faune malac. dép. des Ardennes, *Bull. Soc. Hist. nat. Ardennes*, XVI), Oise en 1923 (*Bull. Soc. Linn.*, 2^e année, p. 44), Meurthe-et-Moselle en 1924 (RÉMY, *Bull. Soc. Linn.*, 3^e année, p. 14). Peut-être n'est-il pas inutile d'ajouter que, cette année même, nous l'avons vainement recherchée à Tours dans le canal du Cher à la Loire ; il est probable qu'elle n'a pas encore atteint cette région.

Margaritana margaritifera (L.). Ruisseau de la Houille près de Landrichamps (arrondissement de Givet). Déjà signalée dans diverses rivières de l'Ardenne belge, cette espèce n'avait pas jusqu'ici été indiquée dans l'Ardenne française.

DON A LA BIBLIOTHÈQUE

De M^{lle} CUVIER, *la Culture du caoutchouc au Brésil*, par Labroy. Remerciements.

RÉPONSE

Quelques membres nous ont demandé de leur procurer la *Botanique élémentaire, descriptive et usuelle* par l'abbé CARIOT et le D^r SAINT-LAGER.

Nous les informons que trois volumes (8^e édition), reliés toile, sont vendus séparément, chez l'éditeur : Emmanuel VITTE, 3, place Bellecour, Lyon (2^e), aux prix suivants :

Tome I ^{er} (2 ^e partie). — Clefs analytiques, 282 p., 23 pl.	7 francs
Tome II. — Botanique descriptive, 1004 p.	17 —
Tome III. — Flore horticole et dictionnaire, 342 p.	14 —
Les trois volumes	35 —
Le tome I ^{er} (1 ^{re} partie). Botanique élémentaire, est épuisé.	

ÉCHANGES, OFFRES ET DEMANDES

J. CLERMONT, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, Paris (13), offre divers instr. de chasse aux insectes : 1^o tamis syst. Reitter (n^o 135 du Cat. Winkler) ; 2^o appareil à récolter les insectes remplaçant le parapluie syst. Winkler (n^o 131 du Cat.) ; 3^o divers ouvr. d'Entom. : *Annales, Bulletin Soc. Ent. de Fr.*, etc. ; 4^o d'excellents Coléoptères pal. et exot. Demande ouvrages d'histoire naturelle et de littérature, revues, romans, etc.

M. J. HERMANN, libraire, 6, rue de la Sorbonne, recherche à bon prix les volumes suivants du *Sylloge Fungorum* de SACCARDO (XIII, XV, XIX, XX, XXII), les *Icones* de FRIES et les *Icones Fungorum* de CORDA.

Le Gérant : O. THÉODORR.