

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Secrétaire général : M. P. Nicod, 122, rue Saint-Georges ; Trésorier : M. J. JACQUET, 8, rue Servient

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	}	France et Colonies Françaises	10 francs
		Etranger.. . . .	15 —
3.504 Membres		MULTA PAUCIS	Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Mardi 14 Février 1933, à 20 h. 30

1^o *Vote sur l'admission des candidats présentés le 10 janvier, auxquels sont ajoutés :*

M. Rodot (André), 10, rue du Port-Villiers, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), parrains MM. Aguetant et Riel. — M. Thomen (Edouard), 18, chemin de l'Eglise, Petit-Saonnex, Genève (Suisse), *Botanique*, parrains MM. Marquis et Nicod. — M. Mathias (Jean), notaire, Hiersac (Charente), parrains MM. Ravinet et Nicod. — M. Jurain (Henri), étudiant en pharmacie, 28, rue Jean-Jaurès, Roanne (Loire), parrains MM. Combet et P. Jurain.

2^o *Présentation de :*

M. Demure (Michel), étudiant en pharmacie, 10, rue du Four-à-Chaux, Lyon (5^e). — M. Lafont (Roger), étudiant en pharmacie, Aérogare de Bron (Rhône). — M. Richard (Marcel), étudiant en pharmacie, préparateur à la Faculté de Médecine, Ecole primaire supérieure, Montélimar (Drôme), par MM. Revol et Nétien. — M. Convert (Charles), 124, rue Sully, par MM. Faucheron et Grange. — M. Guillaud (Charles), ingénieur des Mines, 107, cours Lafayette, Lyon. — M. Grataloup (Jules), gérant d'immeubles, 90, rue Vendôme, Lyon, par MM. Pouzet et Nicod. — M. Verret (Pierre), pharmacien, 49, rue de Bourgogne, Vienne (Isère), par MM. Bouvet et Favot. — M. Régnier (Paul), 263, grande rue de la Guillotière, Lyon, par MM. Thomas et Jossierand.

3^o Compte rendu de la gestion de M. RAVINET, ancien trésorier.4^o Communications diverses.

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 14 Décembre 1932

A propos de « *Lobunaea pheax* »

Par M. H. TESTOUT

M. H. TESTOUT présente une femelle de *Lobunaea pheax* Jordan (Lépidoptères, Saturnides). Ce magnifique papillon, dont la taille est très considérable est rarissime. Le type décrit en 1910 par le D^r K. JORDAN était une femelle et provenait de la Côte d'Or anglaise. Depuis, M. le Professeur BOUVIER en a reçu trois mâles de la Guinée française, dont l'un a servi de modèle pour une des figures de son travail sur les Saturnides de l'Afrique tropicale française. L'individu présenté aujourd'hui est le cinquième connu et la deuxième femelle existant dans les collections européennes. Il provient de Bamako (Soudan français), en sorte que les diverses captures de *Lobunaea pheax* s'échelonnent sur des places de vol très éloignées les unes des autres.

SECTION MYCOLOGIQUE

Séance du 17 Octobre 1932

Présentation d'espèces

En dépit du mauvais temps de la veille, les apports furent si nombreux que la détermination des espèces, commencée à 16 heures, suspendue à 17 heures et reprise à 20 h. 30, se prolongea jusqu'à 22 heures.

Parmi celles que nous avons reconnues et dont la bousculade ne nous permit pas toujours de noter la provenance, nous citerons les suivantes :

Volvaria bombycina (M. THOMAS).

Cortinarius venetus Fr. (M. ESTELER). — Cette espèce, rare à Lyon, est un *Dermocybe* reconnaissable à son chapeau sec, vert-olivâtre, *entièrement papilleux* et à son pied jaune à la base. Nous la prenons dans le sens de KONRAD et MAUBLANC (*Ic. sel. fung.*) qui en donnent une bonne description et une bonne planche. Contrairement à l'avis des auteurs, cette espèce ne sent pas la rave ; elle a *rigoureusement* l'odeur du *persil*. Nous avons déjà observé ce fait sur les sujets que nous avons récoltés en compagnie de notre sympathique collègue P. KONRAD, dans les sapinières neuchâteloises ; parmi tous les « étalons » que les mycologues emploient pour tâcher de définir les odeurs (sucre brûlé, tonneau moisi, fleur de pêcher, etc.), il en est bien peu qui expriment une aussi exacte correspondance. Cette espèce est extrêmement proche de *C. cotoneus* (= *C. sublanatus* Sow. au sens de KONRAD et MAUBLANC).

Clitocybe trullaeformis Fr. — Egalement rare à Lyon ; nous reviendrons plus tard sur cette espèce connue de QUELET mais ignorée de la plupart des auteurs.

Cortinarius turmalis Fr. (M. JOSSEBRAND, sapinières de Chansaye). — Cette belle espèce de *Phlegmacium* à chapeau jaune-ocracé-fauvâtre chaud est proche de *claricolor* ; elle s'en distingue, outre quelques caractères physiologiques, par sa croissance en groupes de deux à quatre sujets agrégés qui soulèvent la terre autour d'eux au moment où ils en émergent. Les spores, qui sont étroitement fusoido-amygdaliformes et sublisses, achèvent de la distinguer de *claricolor*. En outre, nous avons constaté que la réaction par le phénol est positive, tandis que chez *claricolor* (sur lequel nous ne l'avons pas