

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gen. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; *Trésorier* : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	} France et Colonies fr ^{es}	10 fr.
		} Etranger

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)
--

3019 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.***Ont été admis à la séance du 23 octobre :*

MM. Richard, Bénière, Bertrand, Reed, Baconnier, Setchell, Coen.

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MM. les Membres du Conseil d'administration sont priés de bien vouloir se réunir mardi 13 novembre à 19 h. 30.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Mardi 13 Novembre 1928, à 20 heures.**1^o Vote sur l'admission des candidats présentés à la séance du 23 octobre auxquels sont ajoutés :**M. Eynard (D^r Victor), Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme). — M^{me} Laurent (Léon), Saint-Nazaire-en-Royans. — M. Romary (Joanny), industriel, Saint-Hilaire-du-Rosier (Isère). — M. Amant (Jean), 207, avenue de Saxe, Lyon. — M. Amant (Edmond), 207, avenue de Saxe, Lyon. — M. Lieury (Paul), industriel, Saint-Nazaire-en-Royans, parrains MM. G. Maulmond et Riel. — M. Breyer (Albert), président de la Société Entomologique Argen-

SECTION MYCOLOGIQUE

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance du Lundi 19 Novembre, à 20 heures

- 1^o M. F. BATAILLE. — *Russula insignis* Quélet.
 - 2^o M. POUCHET. — Compte rendu de l'Exposition de Voiron.
 - 3^o Propositions pour le renouvellement du Bureau et le changement de l'heure des séances.
 - 4^o Présentation de Champignons frais.
-

BANQUET DU 3.000^e MEMBRE

Nous invitons très cordialement nos collègues à assister au traditionnel banquet qui aura lieu dimanche 18 novembre, à 12 h. 30, chez le fin cuisinier qu'est notre collègue M. BLANCHET, 35 bis, avenue Berthelot.

MENU

JAMBON A LA GELÉE
BROCHET EN BELLE VUE
BOUCHÉE A LA REINE
POULARDE A LA BROCHE
FROMAGE
ENTREMETS
CORBEILLE DE FRUITS
CAFÉ, LIQUEUR
CHAMPAGNE

Prix du repas, vin compris, 20 francs.

Prière de se faire inscrire *avant jeudi 15 novembre*, chez le Trésorier, M. RA-VINET, 11, rue Franklin, Lyon (2^e).

EXONÉRATION

M. SETCHELL (William), s'est fait inscrire comme membre à vie.

PARTIE SCIENTIFIQUE

SECTION MYCOLOGIQUE

Séance du 21 Mai

Une nouvelle espèce de « Rhodocybe » R. Maire

Par M. R. KUHNER

Le genre *Rhodocybe* a été créé par R. MAIRE (*Bull. Soc. Myc. Fr.*, t. XL (1926), p. 298, pour le seul *Tricholoma caelatum* (Fr.) Q.

Voici la description détaillée d'une nouvelle espèce qui doit rentrer dans ce genre, le RHODOCYBE STRIATULA R. Kühner.

Dans les prés ou dans les lichens au bord des routes en Savoie, environs de Saint-Bon (août-septembre).

Chapeau (7-30 mm.) convexe étalé ou convexe plan avec le centre légèrement déprimé ou subombiliqué, tantôt légèrement *striolé* au bord, tantôt très longuement et très distinctement *strié*, à stries serrées, gris-brun-jaunâtre sale mais clair, unicolore (ombilic pas plus foncé que le reste).

Revêtement complètement glabre, même au centre, *luisant*.

Chair très mince, concolore d'odeur légère du *Melanoleuca grammopodium*.

Lames (longueur : 15-20 ; largeur : 3-7) subespacées, *blanches* ou même d'un beau blanc ne devenant pas roses sur le frais, mais rougeâtres en herbier, subhorizontales ou à peine uncinées subdécurrentes.

Stipe (hauteur : 2-5,5 cm. ; diamètre : 2 mm.) légèrement renflé en bas, d'un gris-brun blanchâtre ou d'une couleur très pâle de corne, *poli et glabre*, médullé creux.

Spores sensiblement incolores s. l. très régulièrement ellipsoïdes ou ovales elliptiques : 5,7 - 6,5 - (6,7) \times 4,2 - 4,7 μ , à membrane ferme finement mais densément spinuleuse (surtout sur le matériel sec), non amyloïde.

Basides claviformes, tétrasporiques : 23 - 29 \times 5,7 - 6,5 - (6,7) μ .

Cystides présentes sur les faces, assez nombreuses sur l'arête, *cyllindracées* dans leur partie supérieure, atténuées à la base, à sommet arrondi obtus : 50-72 \times 9-11 μ ; leur membrane mince n'est jamais incrustée même au sommet où l'on trouve simplement quelques spores agglutinées ; leur contenu n'est que très faiblement et éparsément granuleux sur le matériel d'herbier.

Arête des males homomorphe ; trame très régulière à hyphes cylindriques allongées, bouclées, de 6-10 μ de diamètre ; sous-hyménium très mince. Revêtement du chapeau formé d'hyphes couchées radialement, exactement cylindriques, bouclées, un peu plus étroites que les hyphes sous-jacentes (4-6 μ de diamètre) ; elles sont à peine teintées de brunâtre et leur membrane souvent à peu près lisse est quelquefois légèrement rugueuse.

Espèce certainement très analogue à *Rhodocybe cœlata* (Fr.) R. Maire mais différente par son chapeau plus ou moins strié, non crevassé, ses lames blanches, son stipe glabre et médullé creux.

Microscopiquement elle s'en distingue par ses spores un peu plus petites, ses cystides moins nombreuses sur l'arête qui n'est pas subhétéromorphe, et ses hyphes cuticulaires un peu plus grosses non sensiblement incrustées.

Macroscopiquement elle est semblable à plusieurs espèces de *Leptonia*, ce qui doit facilement la faire passer inaperçue.

Présentation de champignons

Parmi les 18 sp. présentées, nous citerons :

TRICHOLOMA INFUMATUM = *Clitocybe infumata* Bres. (forêts de conifères près d'Amplepuis, par M. LAPOUTÉ) :

COLLYBIA DRYOPHILA Bull. sub. sp. FUNICULARIS Fr. Cette sous-espèce d'un champignon très commun est beaucoup plus rare que le type dont elle se distingue au premier coup d'œil par ses lames jaune vif. Il a été donné une étude de ce champignon dans le *Bull. de la Soc. Mic. de France* (t. XLIII, 1927, F. 2, p. 176), par M. KONRAD, qui en a fait précéder la description de considérations synonymiques : *Coll. dryophila* v. *junicularis* Fr. = *C. exsculpta* Fr. = *C. luteifolia* Gillet, etc.