

**BULLETIN BI-MENSUEL**

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

ET DES

**SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON**

RÉUNIES

Secrétaire gen. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. E. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	} France et Colonies fr <sup>es</sup>	10 fr.
		} Etranger . . . . .

**SIÈGE SOCIAL A LYON :**  
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

3072 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux  
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.***Ont été admis à la séance du 27 novembre :*

MM. Pleynet, Boissière, Viviant, Picard, Kennedy, Zweifel, Mouillère, Chavoz, Billiet, Poulette, Jupiter, Châtre, M<sup>mes</sup> Seidel, Chauvinet, MM. Lefèvre, Faure, Durantet, Ravinet, Chavand, Baume, Aufranc, Chevalier, Berthelon, Perret, Richard, Montmayeur, Franc, M<sup>lle</sup> Vacher, M<sup>me</sup> Thomas, M. Goux, M<sup>me</sup> Steeg, MM. Servage, Bardin, Barrillon.

**ORDRE DU JOUR**

DE LA

**Séance générale du Mardi 11 Décembre 1928, à 20 heures.****(ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE)**<sup>10</sup> *Vote sur l'admission des candidats présentés à la séance du 27 novembre, auxquels sont ajoutés :*

M. Gauthier (Roger), étudiant en médecine, Maison des Etudiants, 8, rue Jeanne-Kœler, Lyon, parrains MM. Thiébaut et Guinochet. — M. Boutté, chef d'escadron, 405<sup>e</sup> R. A., rue Berthelot, Caluire (Rhône), parrains MM. Ravinet et Nicod. — M. Lyonnet (Maurice), préparateur en pharmacie, 8, rue Notre-Dame, Lyon, parrains MM. Pichet et Pouchet. — M. Brunon (André), ingénieur-chimiste, les Cazardes, Grigny (Rhône), parrains MM. Cl. Roux

Depuis plusieurs années je me propose d'aller rechercher le chêne vert à grappes des forêts de Laverne pour le mieux étudier. Mais craignant de ne pouvoir faire encore cette année cette excursion, j'ai pensé qu'il serait bon de signaler aux jeunes botanistes l'intérêt que présenterait l'étude plus complète de cette curieuse espèce ou variété du *Quercus Ilex*.

### Présentation de plantes fraîches.

*Cerydallis latea*, Belley (Ain); *Digitalis furfurescens*, Châteauevieux (Rhône); *Carum verticillatum* (ibid), etc.

## GROUPE DE VOIRON

### Exposition mycologique des 14 et 15 Octobre

Chaque année, depuis sa fondation, le groupe de Voiron organise en automne une exposition de champignons.

Celle de 1928 fut particulièrement intéressante. En dehors des 257 espèces différentes figurant à l'exposition, il convient de citer une innovation qui fut très goûtée du public. Sur une table spéciale furent placés en évidence, les champignons les plus dangereux (*Amanita phalloides*, *Amanita virosa*, etc.), ainsi que les espèces comestibles, communes dans la région.

Nous adressons nos félicitations à MM. VIBERT, H. RÉVEILLET, MORELLET, A. BONNAT, APPERCEL, PION-ROUX, membres du Bureau, ainsi qu'à tous nos collègues qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour contribuer au succès de l'exposition.

Voici quelques renseignements sur les champignons rares ou critiques qui y furent exposés.

*Armillaria imperialis* Fr. — Cette espèce est souvent confondue et désignée, dans la région de Grenoble, sous le nom de *Armillaria robusta* A. et S. Elle diffère de cette dernière par plusieurs caractères importants, notamment par ses feuillets décurrents et par la présence d'un double anneau sur le pied. Voici la diagnose de cette espèce d'après les spécimens récoltés à Saint-Pierre-d'Entremont (Isère), par M. Henri RÉVEILLET.

*Chapeau* 90-120-(135) mm., d'abord globuleux, puis convexe étendu, enfin évasé; non mamelonné, ferme, compact, très épais, non hygrophane, sec, brun fauve tendant parfois au brun cuivré; glabre, sauf à la marge, mais semblant pelucheux par tessellation, entièrement crevassé-craquelé, non zoné. — *Marge* d'abord involutée, longtemps enroulée, toujours arrondie, même à la fin quand le chapeau est évasé; non striée, vergetée par cutifraction, tomenteuse au bord.

*Cuticule* assez résistante, très séparable.

*Chair* très épaisse, ferme, dure sous la dent, blanc pur de partout, immuable.

*Lamelles* pas très serrées, égales (lamellules très rares) mais fourchues à tous les niveaux; étroites, épaisses, arquées, longuement décurrentes, très séparables, blanches puis paille ocré. Arête entière, un peu obtuse, concolore.

*Pied* : 60-100 × 20-40 mm., dur, très plein, un peu ventru au milieu et pointu-pénétrant à la base; d'ailleurs variable; brun ocre, brun fauvâtre, un peu plus pâle que le chapeau et, comme lui, pseudo-squameux par éclatement du revêtement; sec.

*Anneau double*. Le premier, interne, laisse peu de traces; le deuxième, externe, est persistant, ample et membraneux; en dessus, il est isabelle et strié; en dessous, il est brun chocolat.

Odeur et saveur de farine très prononcées, un peu nauséuses.

Spores blanches en masse ;  $13-15,5 \times 5-6 \mu$ , assez longuement elliptiques ; soit guttulées, soit granuleuses intérieurement.

Basides 4. Sporiques. — *Cystides faciales* nulles. — *Cystides marginales* nulles.

Réactions. — Aucune réaction sur la cuticule ou sur la chair du chapeau avec les produits suivants : KOH,  $SO^4H^2$ ,  $NO^3H$ ,  $SO^4Fe$ ,  $Fe^2 Cl^6$ , acide picrique, eau iodée, eau anilinée.

TRICHOLOMA CARTILAGINEUM Bull. — Nous avons constaté la présence de filaments stériles, irrégulièrement répartis sur l'arête des lamelles. Droits ou flexueux, ces filaments présentent les formes les plus diverses, on en trouve même parfois qui sont fourchus à la base, ils émergent de l'hyménium de 10 à 45  $\mu$  environ ; largeur :  $1-1 \frac{3}{4} \mu$ .

Si ce caractère est constant (nous l'avons contrôlé sur des échantillons provenant de douze stations différentes), il permettra de distinguer cette espèce de certaines formes du *Tricholoma aggregatum* Schœf., et du *Tricholoma decastes* Fr. — Ces deux espèces quoique affines au *Tr. cartilagineum*, sont dépourvues de filaments marginaux.

TRICHOLOMA MURINACEUM Bull. — Nous avons rapporté au *Tr. murinaceum*, un lot de champignons dont les caractères correspondaient à la description de BRESADOLA. Voici une diagnose sommaire prise sur le frais.

Chapeau convexe, souvent gibbeux, 7-11 cm. diam., assez charnu, d'abord tomenteux, fibrilleux, puis couvert sur toute sa surface de fines mouchetures plus foncées. — Lamelles cendrées, assez distantes, épaisses, très larges, profondément sinuées, souvent ponctuées de noir sur l'arête. — Pied épais, 1-2 cm. diam., farci, puis creux, gris, recouvert de squamules plus foncées. — Chair grise. — Odeur à peine sensible. — Saveur âcre-piquante, surtout sur les jeunes sujets.

Spores obovales  $6 \frac{1}{2}-8 \times 5 \frac{1}{2}-6 \mu$ .

En outre, nous avons remarqué sur l'arête des lamelles, la présence de cellules marginales assez nombreuses, cylindriques, arquées ou légèrement capitées, émergeant de l'hyménium de 20 à 35  $\mu$ , largeur : 5-7  $\mu$ . *Cystides faciales* nulles.

Cette espèce à l'aspect d'un *Tricholoma terreum* luxuriant, elle s'en distingue par le pied squamuleux, par la saveur âcre, ainsi que par la présence de cellules marginales. Ces deux derniers caractères rapprochent *Tr. murinaceum* de *Tr. virgatum* Fr., espèce voisine, mais bien distincte par son chapeau conico-campanulé restant toujours mamelonné, par son pied fibrilleux-furfuracé, non squamuleux et par sa chair blanchâtre.

COLLYBIA MACULATA A. et S. var. IMMACULATA Cooke. — Diffère du type par la couleur immuable du chapeau et des lamelles. Le chapeau est blanc hyalin étant humide, puis devient blanc de neige en séchant.

COLLYBIA BUTYRACEA Bull. — La sporée de ce champignon est rose ; la coloration en est plus ou moins accusée suivant que la chute plus ou moins abondante a accumulé une couche de spores plus ou moins épaisse.

Il en est de même pour les espèces suivantes : *Tricholoma irinum* Fr. — *Clitocybe viridis* Scop (= *Clit. odora* Bull.). — *Clitocybe suaveolens* Schum. — *Clitocybe diatreta* Fr. — *Clitocybe cerussata* Fr. et ses variétés *tornata* Fr., *phyllophila* Fr., *pithyophila* Sec. — *Schizophyllum commune* Fr.

RUSSULA DRIMEIA Cooke = *RUS. EXPALENS* Gillet = *RUS. SARDONIA* Fr., non Bres. — Cette Russule est souvent confondue avec *Rus. Queletii* Fr. — Nous rappelons les principaux caractères distinctifs de ces deux espèces qui, par l'aspect général, ont entre elles une certaine ressemblance.

*Russula drimeia* Cooke.

Chapeau épais, ferme.

Lamelles jaune citrin, puis jaune sulfurin, se tachant de jaune doré par le froissement ou par la dessiccation.

Chair citrin pâle, prenant une teinte purpurine au contact de l'ammoniaque<sup>1</sup>.

*Russula Queletii* Fr.

Chapeau peu charnu, fragile.

Lamelles blanc de cire, puis crème, se tachant de gris-verdâtre ou de bleu-cendré par le froissement ou par la dessiccation.

Chair blanchâtre, ne donnant aucune réaction au contact de l'ammoniaque<sup>1</sup>.

Dans la région lyonnaise et même dans tout le Sud-Est, on trouve communément *Rus. drimeia* dans les bois de Pins, tandis que *Rus. Queletii*, qui doit y être très rare, affectionnerait les bois de sapins.

A. POUCHET.

---

**DON A LA BIBLIOTHÈQUE**

M. P. DE RIENCOURT de Longpré : *Notes coordonnées d'Histoire Naturelle* (2 vol.).

M. SHARIF : A Revision of the Indian Ixodidae with special reference to the Collection in the Indian Museum.

M. F. LATASTE : Etudes de Tératologie.

M. M. PIC : Supplément à l'étude des *Bagous* Schon.

Tous nos remerciements.

---

**ÉCHANGES, OFFRES ET DEMANDES**

M. PERRIN (H.), pharmacien à l'hôpital de l'Antiquaille, Lyon, désirerait entrer en relation avec collègues s'occupant des plantes galactogènes.

M. ARBOST, 4, rue Dante, Nice (Alpes-Maritimes), offre : 1<sup>o</sup> collection complète de l'origine (1880) à 1912 du *Botanisches Centralblatt*, les cent premiers vol, reliés deux à deux, mi-toile grenat, de 1906 à 1912, en fascicules, plus Tables générales de 1 à 40 ; 2<sup>o</sup> *Bulletin et Mémoires de l'Herbier Boissier*, 16 volumes, gr. in-8<sup>o</sup>, mi-reliure maroquin, avec suppl. Card-Index ; 3<sup>o</sup> GAERTNER (J.), *De Fructibus et seminibus plantarum, stuttgartiae*, 1788, 3 vol. in-4<sup>o</sup>, reliés, avec 180 planches. Faire offres.

M. MERLE (Cl.), « Les Cerisiers », Antibes, serait reconnaissant à sociétaire pouvant lui confier quelques jours, pour notes à prendre sur *Vertébrés sauvages du département de l'Indre*, de M. ROLLINAT. Ports aller et retour poste recommandée remboursés. Serait acheteur à l'occasion.

(1) V. MELZER, Un trio de Russules, *Amateur de Champignons*, Vol. X, n<sup>o</sup> 1, p. 10.

---

Le Gérant : O. THÉOBORS.