

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Secrétaire général : M. le D^r BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	{	France et Colonies Françaises	15 francs
		Etranger.. . . .	20 —

2.325 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 12 Mai, à 20 h. 30

1^o Vote sur l'admission des candidats présentés en avril et de :

M. Vergiat (Antonin), Villemontais (Loire), parrains MM. Larue et Bertrand. — M. Audras, pharmacien, 112, rue de Gerland (réintégration). — M. Bulet (Louis), 4, rue des Fantasques, Lyon (réintégration). — M. Champremier (Hervé), 89, rue Ney, Lyon (6^e). — M. Ebely (Louis), Parc de la Tête-d'Or, parrains MM. Perra et Mérit. — M. Couillet (André), 139, rue Victor-Hugo, Roubaix (Nord). *Entomologie générale, Coléoptères.* — M. Erb (J.), ingénieur, 37, rue Claire-Pauillac, Toulouse (Haute-Garonne). *Coléoptères, Scarabéides et Buprestides gallo-ibériques*, parrains MM. le D^r Riel et Guillemoz. — M^{me} Coutheron (Suzanne), 4, rue Jean-Claude-Vivant, Villeurbanne, parrains MM. Comman et Duroussay. — M. Golcombet, Chasse-sur-Rhône (Isère), parrains MM. Claret et Duroussay.

2^o Questions diverses.

SECTION D'ANTHROPOLOGIE, DE BIOLOGIE ET D'HISTOIRE NATURELLE GÉNÉRALE

Séance du Samedi 9 Mai, à 17 heures

1^o M. VERGIAT (de Roanne), — Notes de Folklore colonial : de l'emploi médicinal par les indigènes de quelques plantes de l'Oubanghi-Chari (Afrique équatoriale française).

pignons ligneux et sous les écorces des vieilles souches de chêne ou de saule en voie de décomposition.

Un exemplaire vient d'en être capturé récemment à Charbonnières (Rhône), par M. DEFAÏSSE, l'un de nos jeunes collègues qui m'a demandé d'étudier son insecte. J'ai voulu après identification rechercher et connaître les captures effectuées dans notre région.

M. PIC, le maître toujours obligeant des Guerreaux, a bien voulu me communiquer les renseignements que lui a fournis l'examen des importantes collections de son musée. Le D^r E. ROMAN a bien voulu me communiquer également ses notes personnelles.

Voici les captures relevées pour la région lyonnaise : Lyon, sans précision, ex-coll. Croissandeau (coll. Pic), Charbonnières (D^r ROBERT, M. DEFAÏSSE), Dardilly, bois de Serres (D^r E. ROMAN), Limonest (D^r E. ROMAN), Les Echets (Ain), près de Lyon (D^r JACQUET, coll. Pic).

La collection Perroud¹, entomologiste lyonnais, comporte quelques exemplaires sans étiquettes de localité, mais de provenance des environs de Lyon très probablement.

FOUDRAS signale cette espèce de Tassin et de Bron (Rhône) et de la Pape (Ain), près de Lyon. Ces captures ont été effectuées de la mi-octobre au 1^{er} janvier.

Pour les départements voisins on cite : Le Plantay (Ain) (GUILLEBEAU), Les Guerreaux (Saône-et-Loire) (PIC, sous écorce de chêne abattu), Saint-Agnan, (Saône-et-Loire) (abbé VITURAT, au vol).

Est-ce à ses mœurs lucifuges que l'on doit la rareté des captures de cette espèce ? Il serait intéressant de récolter les champignons ligneux des vieux arbres et d'observer si l'on n'obtiendrait pas de cette façon l'insecte parfait dont on ne connaît encore presque rien de son évolution.

Je remercie bien sincèrement M. PIC et le D^r E. ROMAN des renseignements qu'ils m'ont obligeamment fournis.

Capture de « *Hypera velutina* » Boh. (Col. Curculionide), nouvelle espèce française

PAR M. G. AUDRAS

Cette espèce particulière à l'Europe Orientale, et citée de Suisse, par CAPIOMONT, n'a pas encore été rencontrée en France. J'en ai recueilli un exemplaire en 1932 au col de la Faucille.

Je l'avais tout d'abord placée avec les *Hypera ovalis* Boh., mais grâce à l'ouvrage de M. HUSTACHE j'ai pu en faire la détermination exacte que M. HUSTACHE lui-même a bien voulu me confirmer en me disant que c'était le premier exemplaire français qu'il voyait.

Cette espèce se distingue des autres *Hypera* par les élytres déhiscents au sommet et les premiers interstries gibbeux.

Lépidoptères intéressants de la Région lyonnaise

PAR M. V. BATTETTA

Cuculia absinthii L. ♀. — Espèce capturée à la lampe, à Bron (Rhône), le 18 juillet 1924. Répandue largement en France, nouvelle pour Lyon.

Trachea anceps Schiff. (*sordida* B. R. H.) ♀♀. — Espèce peu connue à

¹ Cette importante collection a été acquise par M. PIC.

Lyon, prise à la lampe à Bron, le 6 juin 1924. M. le Dr E. ROMAN a capturé : une ♀ à la lumière, le 11 juin 1926, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône) ; une ♀ à la miellée, le 5 juin 1927, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône) ; un ♂ le 8 juin 1932, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

M. le Dr ROMAN signale à propos du ♂ que pendant le séchage sur l'étaioir, celui-ci fut attaqué par une larve de *Ptinus sexpunctatus* Panz. (coléoptère), laquelle construisit sa coque entre le bois et le parvi ventrale du papillon, le 15 juillet 1932. La larve avait pris pour la construction de sa coque des fragments végétaux : moelle de sureau (?) et de la sécrétion salivaire. L'éclosion de l'insecte parfait eut lieu le 3 novembre 1932. J'ai trouvé également cet insecte ainsi que sa larve, dans les vieux cocons de *Saturnia pyri*, *pavonia*, *Aretia caja*, etc., à Bron.

Je tiens à remercier M. R. MOUTERDE et M. le Dr E. ROMAN pour tous les renseignements qu'ils m'ont fournis.

Sur deux *Aphidius* nouveaux du pin (« Hym. braconidae »)

Par les D^s Cl. GAUTIER et S. BONNAMOUR

T.-A. MARSHALL, qui dans le *Species des Hyménoptères* d'André a décrit plusieurs *Aphidius* des Pins, savait aussi qu'il en existait d'autres encore inconnus (voir note à la suite de la description d'*Aphidius pictus* Hal., p. 563, t. V).

Nous avons observé, dans la région lyonnaise, deux et probablement trois espèces de ces Braconides, obtenus par éclosion de petits Pucerons des pins. En les nommant nous avons cherché à honorer les précisions de MARSHALL.

APHIDIUS EXSPECTATUS Gautier et Bonnamour ♀ — TÊTE noire, antennes de 16 articles, ceux de la base du funicule plus grêles, brun-noirâtre.

THORAX noir. — Pas de sillons visibles du mésonotum qui est lisse et luisant. Radicules, écaillottes d'un jaune légèrement bruni. Scutellum noir, lisse, luisant. Segment médiaire noir avec une crête transversale.

ABDOMEN. — Premier segment plus de trois fois aussi long que sa largeur au milieu, noirâtre, condyle un peu évasé, jaunâtre à l'extrémité postérieure. Deux tubercules bien visibles situés à peu près au milieu. Les autres segments abdominaux brun-noirâtres en dessus, avec une bande jaunâtre à la jonction des 2^e et 3^e segments. Tarière assez courte, noire, épaisse.

PATTE ANTÉRIEURE, trochanter jaunâtre, fémur jaunâtre, très légèrement bruni en dessus, tibia jaune, légèrement bruni en dessus, tarse jaune bruni.

PATTE MOYENNE, trochanter en partie brun-noirâtre, fémur beaucoup plus bruni que l'antérieur en dessus, de même le tibia et le tarse.

PATTE POSTÉRIEURE, trochanter noirâtre, fémur brun-jaunâtre, sauf tout à fait à la base, jaunâtre, tibia et tarse plus brunis encore qu'à la patte moyenne.

AILES hyalines, nervures très simples, radiale courte, courbée. Pas de nervure cubitale.

APHIDIUS PRAEVISUS Gaut. et Bonn.— TÊTE, vertex noir ou brun-noir, face brune ou brun-noirâtre, clypeus et région des mandibules d'un jaune ou moins bruni. Antennes de 16 articles chez les petits exemplaires.

THORAX. — Mésonotum et scutellum noirs, luisants. Chez les gros exemplaires les sillons sont bien marqués, entre eux le mésonotum peut présenter quelques faibles granulations. Métanotum et segment médiaire d'un brun-