

**Tome 66**

**fascicule 2**

**Février 1997**

---

Abonnement 170 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

**BULLETIN MENSUEL**  
**DE LA**  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

**Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON**

Rédaction : P. BERTHET

---

## MYCOLOGIE :

### COMPTE RENDU DE L'EXPOSITION DE LYON 1996

Notre 70<sup>e</sup> exposition, cru 1996, s'est tenue dans la grande salle de réception aimablement mise à notre disposition par la Mairie du 8<sup>e</sup> arrondissement de Lyon, les 19-20 et 21 octobre.

Monsieur le Maire du 8<sup>e</sup> nous a fait l'honneur de présider à son ouverture. Dans son discours de bienvenue, Monsieur le Maire nous a confirmé tout l'intérêt qu'il portait à ce genre de manifestation, à la fois culturelle et pédagogique. Il nous a confirmé que le même local nous était réservé pour l'année prochaine et ceci nous a grandement réjouis.

Les conditions météorologiques particulièrement défavorables cette année dans la région lyonnaise (sécheresse, froid et vent), n'ont pas facilité la préparation du stand de mycologie. Cependant, chacun a fait l'effort de rouler et de chercher un peu pour que finalement puisse être proposé un nombre tout à fait honorable de champignons aux regards des visiteurs. La quantité de ceux-ci est directement fonction de la poussée fongique. De ce fait, les entrées ont été limitées cette année.

Bien que les espèces courantes ne fussent pas au rendez-vous, l'obligation de pousser nos recherches a permis de présenter bon nombre d'espèce peu courantes ou rares. Il est fait état ci-après de certaines qu'il n'est pas habituel de voir.

Que tous ceux, et leur grand nombre empêche d'en dresser la liste, qui ont participé à la réussite de cette 70<sup>e</sup> exposition soient remerciés.

Bernard RIVOIRE, président de section de Mycologie.

#### QUELQUES ESPÈCES RARES OU MÉCONNUES PARMIS LES CHAMPIGNONS EXPOSÉS :

*Hydropus trichoderma* (Joss. ap. Kühner) Sing.

Rare et très remarquable espèce à silhouette de mycène ou de *Pluteus*, autrefois rangé dans les mycènes. Chapeau brun noirâtre, ridé, plissé radialement au vieillissement par la présence d'un revêtement celluleux. Lames blanches puis grisâtres. Stipe présentant de fines punctuations bistres sous la loupe. Sur aiguilles de conifères. Don de nos amis mycologues suisses qui nous ont rendu visite.

*Xeromphalina caudicinalis* (With.) Kühner et Maire

Espèce grêle à chapeau convexe présentant un ombilic net à cutis faiblement strié jaune ocre, fauve. Stipe concolore à presque noir, rigide, lisse ou plus ou moins fibrilleux (loupe). La base agglomère les aiguilles par la présence abondante de rhizomorphes. Dans les aiguilles de mélèzes. Leg. A. BIDAUD.

*Trochila ilicina* (Ness ex Fr.) Greehalgh et Morgan-Jones

Configuration totalement différente de celle des espèces courantes. Ce discomycète inoperculé se développe sur feuilles mortes de houx, à terre ou en place. Toute la feuille est régulièrement couverte de petites apothécies incluses dans l'épiderme qui, à maturité, deviennent brun noirâtre en libérant l'hyménium. Leg. M. RAILLÈRE.

*Ceriporia camaresiana* (Bourd. et Galz.) Boud. et Singer ex Boud.

Carpophore résupiné se répandant seulement sur quelques centimètres carrés, mince, jusqu'à 1 mm d'épaisseur, blanc et rapidement crème ocracé, ensuite prenant une coloration gris pourpré. Hyménium présentant des pores arrondis à anguleux de 0,4 à 0,6 mm, sur feuillus. Leg. B. RIVOIRE.

*Inocybe haemacta* (Bk. et Cke) Sacc.

Quelques exemplaires de cet inocybe léiosporé cystidié à chair rosissante ont été présentés. Chapeau couvert de fibrilles gris verdâtre avec des tons fuligineux. Stipe à reflets glauques se colorant à la manipulation en rosâtre. Chair à odeur toute particulière : les exemplaires en notre possession dégagent une odeur peu agréable dite « d'écurie ». Sous feuillus, taillis. Leg. A. BIDAUD.