

Abonnement 30 F

Le numéro 6 F

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937  
 des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
 REUNIES  
 et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>e</sup>)

**TRESORERIE :**

	1973
Abonnement France .....	30 F
Membre actif France .....	25 F
Membre actif Etranger .....	28 F
Membre scolaire .....	13 F
Abonnement Etranger .....	33 F
Changement d'adresse, inscription ou réintégration en sus .....	5 F

**N.B.** — Les virements à notre C.C.P. **LYON 101-98** doivent être rédigés au nom de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON.

**SOMMAIRE**

LEBRETON Ph. — Compte rendu ornithologique annuel, de l'automne 1970 à l'été 1971, dans la région Rhône-Alpes. (Suite) .....	133
VIETTE P. — <i>Lepidoptera Geometridae</i> de Madagascar, nouveaux ou peu connus .....	147

## PARTIE SCIENTIFIQUE

### COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE ANNUEL DE L'AUTOMNE 1970 A L'ETE 1971 DANS LA REGION RHONE-ALPES (suite)

— Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* : dernières le 11 novembre à Soyons (07) (SM), premières dès le 14 février à St-Jorioz, lac d'Annecy (CORA). Deux oiseaux en juin à Champfromier (01) (PRo). Certainement nicheuse dans le val du Fier (74) (BC) ; deux le 11 avril à Chamonix (RLk). Notée le 31 juillet à la Thuile, Tarentaise (PL) ; nidificatrice à Chaudieu (73) (PC). Notée le 9 mai à Trièves, col de Fau-Roissard (38) (MBv), le 16 avril à La Grave (05) (YT). Commune dans les gorges de l'Ardèche (YT, JL, PL, JDb, JF) et une quinzaine le 16 mai à Tuheits (FA). Quelques-une en mai-juillet au barrage de Grangent (42) (CB).

— Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* : dernières le 25 octobre à Messimy (69) (BCo), le 1<sup>er</sup> et le 11 novembre (une isolée, fatiguée) en Dombes (PR, MC). Premières le 17 mars à St-Laurent-du-Pape (07) (SM), puis le 18 en Dombes (GG), le 25 à Miribel (01) et en Dombes, plusieurs (FA, MC), plutôt tardive.

— Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* : dernières le 11 octobre aux Echets (JL), le 12 à Lompnaz, Bas-Bugey (PC), le 31 au lac Laffrey (38) (FB). En juillet, colonie de 15 couples environ sur la rive N.W. du lac de Roselend (73) (PL).

#### MOTACILLIDÉS.

— Pipit rousseline *Anthus campestris* : noté à Valence les 23 et 29 avril (SM).

— Pipit des arbres *A. trivialis* : derniers le 11 octobre aux Echets (JL). Premiers le 12 avril dans le Pilat (CB) ; présent le 4 juillet aux Monts d'Uzore, Forez (JL, PL). Trois migrants d'automne portaient des bagues de Belgique et des deux Allemagnes.

— Pipit farlouse *A. pratensis* : premiers migrants le 9 octobre aux Echets (JL) ; plusieurs centaines en vol vers le Sud le 29 décembre à Valence (SM) ; un le 31 décembre à St-Etienne (42) (JL) ; derniers le 1<sup>er</sup> avril dans le Pilat (CB). Un oiseau tué le 15 novembre à St-Didier (07) était originaire de Finlande.

— Pipit spioncelle *A. spinoletta*.

— Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : première le 29 mars à Ordonnaz, Bas-Bugey (PC). Notée le 22 mai à Martnaz, près Leyment (01) (MBb).

— Bergeronnette des ruisseaux *M. cinerea* : à la fin-décembre notée à Beynost (01) (PL), St-Chamond (42) (CB), Montrond, Forez (JL), Roussillon (38) (GF), Valence (26) et Alissas (07) (SM). Notée le 9 mai à St-Jean-d'Hérans, sur le Drac (38) (MBv), le 20 mai au marais de Boulieu, Ile Crémieu (BC), le 20 juin à St-Paul-de-Varax, Dombes (HT), le 18 juin à Marclopt-s.-Loire, Forez (CB). Un oiseau bague en juin 1970 dans le canton de Fribourg a été trouvé mort le 7 janvier à Roanne (42).

— Bergeronnette grise *M. alba* : passage le 12 octobre à St-Chamond (42) (HB). Plusieurs cas d'hivernage à Pizançon (26) (RL), Valence (SM), Beynost (01) (MC, PL), Seyssel-s.-Rhône (01) (BC). Notée en juin-juillet dans les gorges de l'Ardèche (PL, JL). Un oiseau recueilli le 5 janvier à Bourgoin (38) avait été bague en juin 1970 au Danemark.

#### PIE-GRIÈCHES.

— Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : premières, assez tardives, le 9 mai à Trièves (38) (MBv), le 10 en Valbonne (FA), le 11 à Messimy (69) (BCo).

— Pie-grièche à tête rousse *L. senator* : dans la Loire, le 9 mai à Trèves (42) (YT), en juillet à Maclas (CB), en Forez (HB) et à Rochella-Molière (GT). En Ardèche, le 8 mai à La Pérouse, le 18 mai à St-Romain-de-Lerps (SM), en juillet à Vallon-Pont-d'Arc (JL, JF).

— Pie-grièche à poitrine rose *L. minor* : un individu le 9 mai à St-Maurice-en-Gourgois (42) (GT).

— Pie-grièche grise *L. excubitor* : en hivernage (novembre-février), seulement 6 notations régionales (DA, JL, HB, FA). Notée, assez commune, en juin-juillet en Forez (CB, JL, HB) ; dans l'Ain, en mai à Ccrlrier, en juin au marais de Lavours (FC), le 30 avril et le 4 juillet en Dombes (MC, RL), le 22 mai à l'embouchure de l'Ain (MBb).

#### JASEUR.

— Jaseur de Bohême *Bombycilla garrulus* : petite « invasion », du 28 décembre au 2 janvier à Châtel-d'Abondance (74) (SH), le 10 janvier à Grenoble (JL), une trentaine à Bessans, Maurienne, du 20 au 27 janvier, le 3 février à Chateau-Bernard, Vercors (MBb), « en hiver » à Lhuis, Bas-Bugey (PC), le 7 avril à St-Girod (73) (PC).

#### CINCLE,

— Cincle plongeur *C. cinclus* : hivernants le 14 janvier à Vaulx-en-Velin (69) (GPC), le 14 février au lac d'Annecy (CORA). Nicheur dans le Pilat (JL, HB, CB, YT, JDb), sur le Séran à Belmont et Luthézieu-en-Valromey (HR) ; noté le 11 avril sur l'Arve à Servoz (74) (RLk) ; commun en Tarentaise en juillet (PL) ; dans l'Isère, le 31 octobre 1970 au Lac Laffrey (JC, MBv) ; dans les Htes-Alpes, le 15 novembre à l'Alpe du Lauzet (FB), le 15 mai sur le Guil à Château-Queyras (MBv), le 24 juillet à Lavey, Pelvoux (FB). En juin dans les gorges de l'Ardèche (PL).

#### TROGLODYTE.

— Troglodyte *T. troglodytes*.

#### ACCENTEURS.

— Accenteur alpin *Prunella collaris* : le 4 août au col de Bossetan, Samoëns (74) (BCo) ; plusieurs entre 2 250 et 2 800 m en Tarentaise en juillet (PL) ; au moins 7 le 22 novembre 1970 à St-Martin-le-Vinoux (38) (JC). Nombreuses citations d'été dans les Htes-Alpes : Galibier, Vars, Vallon Lauzier, Névache, Alpe du Din, Lavey, vallon de la Selle (MBv, JDb, FB). Le 15 avril, observation insolite de deux individus dans le Pilat, à Graix, 1 200 m (CB).

— Accenteur mouchet *P. modularis* : premier en plaine le 8 octobre (HB), dernier le 30 mars (CB). Chanteur le 9 avril au Pertuiset, gorges de la Loire (42) (JL) ; présent en mai-juin à la Grangette (07) et au col du Tourniol (26) (SM). Reprise le 30 décembre à St-Priest (69) d'un oiseau bagué en avril 1970 en Suède ; reprise le 5 janvier à Bourg-lès-Valence (26) d'un oiseau bagué en migration d'automne en Saxe inférieure, Allemagne de l'Est.

#### MUSCICAPIDÉS.

##### Turdinés.

— Traquet tarier *Saxicola rubetra* : dernier le 10 octobre à Messimy (69) (BCo). Premiers le 17 avril à Grimone (26) (MBv), le 19 à Bourgoin (38) (SH), le 20 au marais de Lavours (PC). 2 adultes et un immature à fin-juillet début-août à Montrond, Forez, relèvent-ils d'un cas de nidification ? (YT).

— Traquet pâtre *S. torquata* : quelques attardés, le 2 novembre en Forez (HB), le 3 à Pélussin (42) (CB), le 22 en Dombes (DA), le 23 à Valence (SM), le 5 décembre à Bonzieu (42) (CB). Au printemps, arrivée tardive, le 13 mars à l'embouchure de l'Ain (MC), le 21 à St-Chamond (42) et en Forez (HB), le 24 à Rive-de-Gier (42) (YT), le 29 en Bas-Bugey (PC).

— Traquet motteux *Oe. oenanthe* : dernier le 12 octobre à Heyrieux (38) (PL), le 28 à Roussillon (38) (GF). Premiers le 11 avril à Chichiliane, Vercors (MBv), le 13 en Forez (CB), le 14 au Gd-Abergement-en-Valromey (HR), le 16 à la Rosière (73) (MBv).

— Traquet oreillard *Oe. hispanica* : un mâle le 1<sup>er</sup> mai en Valbonne (MBb).

— Merle de roches *Monticola saxatilis* : quelques mentions à Val-d'Isère et à Bessans, Vanoise (PL, FA) ; en Isère le 6 juin au col de la Bataille, Vercors (PL), le 6 juillet au col du Glandon (YT), le 9 octobre 1971 à St-Christophe-en-Oisans (MBv) ; deux mâles le 3 juillet au col de la Coulette, Vars (05) (MBb).

— Merle bleu *M. solitarius* : un mâle le 14 juillet dans les gorges de l'Ardèche (JF).

— Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* : dernier le 9 novembre à Balan (01) (JC) et un seul cas d'hivernage, le 21 décembre à Lompnas, Bas-Bugey (PC). Au printemps, premiers chanteurs le 12 mars à St-Martin-d'Hères (38) (JL) et à St-Chamond (42) (HB), le 19 à Roussillon (38) (GF), le 21 à Rive-de-Gier (42) (YT) et à St-Eusèbe (74) (BC), le 22 à Beynost (01) (PL).

— Rougequeue à front blanc *Ph. phoenicurus* : derniers le 10 octobre à Mâcon (FN) et à Messimy (69) (BCo), le 11 aux Echets (JL). Premiers le 3 avril en Dombes (MBv), le 6 à Mâcon (FN), le 12 dans le Pilat (CB) et à Mantaille (26) (RE), tardif.

— Rougegorge *Erithacus rubecula* : un oiseau repris le 25 octobre à St-André-de-Rosans (05) avait été bagué 17 jours auparavant à Varèse, Italie ; un autre, repris le 23 novembre en Isère avait été bagué 1 mois et demi plus tôt en Allemagne de l'Est ; 5 oiseaux repris de septembre à décembre dans la région Rhône-Alpes avaient été bagués à la belle saison en Scandinavie (2 Finlande, 1 Suède, 1 Norvège, 1 Danemark).

— Rossignol *Luscinia megarhynchos* : après un précoce le 4 avril en Forez (JL), arrivée le 12 avril à Roussillon (38) (GF), à Die (26) (MBv) et dans le Bas-Bugey (PC), le 14 à l'embouchure de l'Ain (MBv), le 15 à Valence (SM), en Dombes (MC) et en Forez (GT).

— Gorgebleue *L. svecica* : le 13 avril en Dombes (MC), le 14 avril à l'embouchure de l'Ain (MBb).

— Grive litorne *Turdus pilaris* : hivernage régional notable, dates extrêmes 3 octobre (Embouchure de l'Ain) et 10 avril (Pilat) ; effectifs faibles jusqu'à la mi-décembre et plus gros effectifs de la mi-février au 25 mars (CORA).

Sur 20 reprises (toute la région, mais surtout 26, 05 et 07), 11 sont concentrées du 10 au 20 décembre, la plus précoce étant du 4 octobre dans l'Ain : 9 pays d'origine : Suisse (5), Finlande (4), Suède, Allemagne de l'Est, Belgique et Italie (2)...

Plusieurs observations du 23 au 28 juin à Taninges et Samoëns (74) (JDM) ; 3 individus le 10 juillet au marais d'Albens (73) (BC) ; au plateau de Retord, Valromey (01), un individu le 23 mai et des jeunes le 13 juin (HR, SH).

— Merle à plastron *T. torquatus* : premiers le 14 mars à Chaillol (05) (MBv) et passage dans le Pilat le 21 mars et les 1<sup>er</sup> et 10 avril (JDb, CB) ; plusieurs le 7 avril à Yzeron (69) (BCo). Nicheur au plateau de Retord, Valmorey (HR).

— Merle noir *T. merula* : deux oiseaux tués à la mi-octobre dans la Loire et l'Ardèche avaient été bagués en Allemagne de l'Ouest : deux oiseaux tués en novembre et décembre dans l'Isère et dans la Loire avaient été bagués en Pologne. Premiers chants le 12 février à Roussillon (38) (GF), le 21 à Valence (SM), le 23 au marais de Lavours (PC) ; jeunes volant dès le 5 avril à Rive-de-Gier (42) (YT).

— Grive mauvis *T. iliacus* : une vingtaine de citations, dates extrêmes 16 octobre et 21 mars, avec « poussées » à la mi-novembre et fin-décembre et creux en janvier (CORA) ; 7 reprises de bagues (octobre-décembre : Isère et Drôme) concernaient la Finlande (5), la Suède (1) et l'Allemagne de l'Ouest (1 baguée en octobre, au passage).

— Grive musicienne *T. philomelos* : passage net à la mi-octobre (CORA) et dans les premiers jours de mars ; quelques cas d'hivernage : à la fin-décembre à Valence (SM), à Vallières (74) (BC) et dans la Loire (JL), le 11 janvier à Châtillon (73) (PC), le 8 février à Crépieux (69) (FA), le 14 en Forez (HB).

Sur 7 bagues (4 en octobre, 2 en novembre, 1 le 19 décembre), 2 provenaient du Danemark, 2 d'Allemagne de l'Ouest, 1 de Pologne, Italie et Suisse.

— Grive draine *T. viscivorus* : un oiseau tué le 17 octobre à Lucinges (74) avait été bagué 9 jours auparavant dans le canton de Soleure, Suisse.

Sylviinés.

— Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : 2 oiseaux le 16 novembre au Gd-Glareins, Dombes, première citation locale (SH).

— Locustelle luscinoïde *Locustella luscinioides* : premières le 15 avril en Dombes (MC), le 18 dans l'île Crémieu (MBb), le 20 au marais de Lavours (PC), tardives.

— Locustelle tachetée *L. naevia* : notée le 4 avril en Valbonne (MBv), le 19 à Serrières-de-Briord, Bas-Bugey, le 20 à Lavours (PC), le 29 avril et le 3 juillet en Dombes (BCo) ; niche au marais d'Albens (73) (BC).

— Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : peu de citations cette année, premier le 18 avril en Dombes (PL) ; vols nuptiaux le 20 avril au marais de Lavours (PC) ; noté de mai à juillet à l'embouchure de l'Ain (MBb).

— Rousserolle verderolle *A. palustris* : notée en Tarentaise dans les Aulnaies vertes et les prairies grasses (PL).

— Rousserolle effarvatte *A. scirpaceus* : un oiseau repris fin-septembre à St-Denis-en-Bugey avait été bagué 8 jours auparavant en Suède ; dernières le 10 octobre aux Echets, le 14 à St-Chamond (42) (HB). Premières le 13 avril en Dombes (MC), le 15 en Forez (GT), le 18 dans l'île Crémieu (MBb), le 20 au marais de Lavours (PC).

— Rousserolle turdoïde *A. arundinaceus* : premières le 20 avril en Dombes (RL), le 24 au marais de Lavours (HR), le 26 à Colomieu, Bas-Bugey, où elle niche (PC).

— Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* : plusieurs observations du Forez (HB, YT, JL, JDb, CB) ; commun à Rive-de-Gier (42) (YT) ; noté à Clonas, Auberives-s.-Varèze et Chambalud (38) (GF) ; dans l'île Crémieu, le 8 mai à Soleymieu (BC) et le 16 à Siccieu (PL).

— Fauvette orphée *Sylvia hortensis* : dans l'Ain, 2 captures de mâles les 21 juin et 14 juillet au Mollard-de-Don, Bas-Bugey (PC) ; dans la Loire, chanteurs en mai-juin à St-Martin-la-Plaine, Rive-de-Gier et Ste-Croix-en-Jarez (YT) ; dans les gorges de l'Ardèche, mâle avec becquée le 6 juillet (JL).

— Fauvette des jardins *S. borin* : premières le 15 avril à Valence (SM), le 20 à Vercra, Bas-Bugey (PC), le 25 à l'embouchure de l'Ain (CORA), le 1<sup>er</sup> mai à Mâcon (FN) et en Dombes (DDv).

— Fauvette à tête noire *S. atricapilla* : nombreux cas d'hivernage, du 12 décembre au 3 janvier à St-Chamond (42) (CB, HB), le 27 décembre à St-Etienne (42) (JL), les 6 et 19 décembre à Valence (SM), le 25 décembre à St-Innocent (73) (PC), du 25 décembre au 16 janvier à Mâcon (FN), le 18 janvier à Roussillon (38) (GF), tout janvier-février à St-Martin-de-Vernoux (FS). Premiers chanteurs tardifs, le 21 mars à Rive-de-Gier (42) (YT), le 30 à Lavours (PC).

— Fauvette babillarde *S. curruca* : au passage de printemps, notée le 17 avril en Dombes (PL), le 25 à l'embouchure de l'Ain (CORA), le 9 mai à Crépieux (69) (FA), le 11 à Messimy (69) (BCo). A la belle saison, notée en Dombes et Tarentaise (PL), à Samoëns (74) (JDm), à Névache et Vallouise (05) (JDb, MBv).

— Fauvette grisette *S. communis* : premières, tardives, le 12 avril à l'embouchure de l'Ain (MBb) et à Ménéé et Chatillon-en-Diois (26) (MBv), le 16 à Messimy (69) (BCo).

— Fauvette passerinette *S. cantillans* : chanteur le 6 juillet dans les gorges de l'Ardèche (JL).

— Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : un oiseau repris à la fin-septembre à Caluire (69) avait été bagué à la mi-août en Suède. Premier le 1<sup>er</sup> avril en Dombes (GG), le 4 en Forez (JL) et en Valbonne (PL),

le 5 à St-Innocent (73) (PC). Noté le 22 mai à l'embouchure de l'Ain (MBb), en Forez les 23 et 29 mai, et 20 juin (CB, HB, YT) ; nicheur à Messimy (69) (BCo).

— Pouillot véloce *Ph. collybita* : quelques tentatives d'hivernage, le 4 décembre à Oullins (69) (RL), le 16 à Mâcon (FN), le 25 au lac du Bourget (PC). Tardif au printemps, premier chanteur le 28 février à Messimy (69) (BCo), puis seulement le 13 mars à l'embouchure de l'Ain (MBb), le 16 à Crépieux (69) (CBr), le 25 à Rive-de-Gier (42) (YT) et à Roussillon (38) (GF).

— Pouillot de Bonelli *Ph. bonelli* : premiers le 20 avril dans le Bas-Bugey (PC), le 22 à Montélier (26) (SM) et à Rive-de-Gier (42) (YT), le 26 dans l'île Crémieu (SH). Présent le 19 juin à Champfromier (01) (BC) et le 1<sup>er</sup> juillet à Chambalud (38) (GF).

— Pouillot siffleur *Ph. sibilatrix* : premier le 5 avril dans le Bas-Bugey (où il niche) (PC), puis le 16 à Vaulx (74) (BC), le 1<sup>er</sup> mai à St-Béron et le 2 à Bessans (73) (PL), le 9 à Monestier-de-Clermont (38) (MBv), le 11 à Messimy (où il niche) (69) (BCo), le 16 à Siccieu, Ile Crémieu (PL), le 22 à Chateauneuf (YT), le 2 juin à Clonas-s.-Varèze (38) (GF), le 19 à Champfromier (01) (BC), le 31 juillet à Mâcon (FN).

#### Régulins.

— Roitelet huppé *R. regulus* : présent en mai-juin à la Grangette et St-Romain-de-Lerps (07) (SM).

— Roitelet triple-bandeau *R. ignicapillus* : derniers les 8 et 18 novembre (Messimy (69), Prélénfrey (38) (BCo, MBv) ; premiers les 13 et 23 février [La Valla-en-Gier (42), Messimy (69)] (CB, BCo).

#### Muscicapinés.

— Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* : passage d'automne du 15 août au 17 septembre ; passage de printemps du 18 avril au 7 mai, avec maximum autour du 20-25 avril (CORA). Un chanteur le 27 mai au col de l'Arzelier près Vif (38) (JDM) ; chanteurs en mai-juin à la Grangette et St-Romain-de-Lerps (07) (SM).

— Gobemouche gris *Muscicapa striata* : le 28 avril à Valence (SM), le 18 mai à St-Benoit, Bas-Bugey (PC), le 23 mai en Tarentaise (PL). Observations de juin-début juillet impliquant nidification : Clonas et Auberives-s.-Varèze (38) (GF) ; Rive-de-Gier, St-Chamond-Izieux, la Valla et Pianfoy, Pilat (42) (YT, HB, CB, JL) ; Pollet, Basse-Vallée de l'Ain (MC) ; Samoëns (74) (JDM).

#### MÉSANGES.

— Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*.

— Mésange nonnette *Parus palustris*.

— Mésange boréale *P. montanus* : dans l'Ain, en février à Cormoranche-s.-Saône (FN) et en septembre 1971 à la lône de la Valbonne (MC) ; en Forez, en novembre et en fin-juillet/début-août en bords de Loire à Chambéon (42) (CORA, HB) ; un individu le 1<sup>er</sup> décembre à Valence (SM) ; dans l'Isère, une le 31 octobre aux lacs Laffrey, en février à Château-Bernard et Prélénfrey (MBv) ; à la mi-mars à Chailol (05) (MBv).

— Mésange huppée *P. cristatus* : nicheur à Messimy (69) (BCo), à Vaulx (74) à 500-600 m d'altitude (BC), à la Grangette (07) (SM).

— Mésange noire *P. ater* : nicheur abondant à la Grangette (07) (SM).

— Mésange bleue *P. caeruleus* : un oiseau contrôlé le 18 novembre à St-Gervais (74) avait été bagué le 6 septembre dans le canton de Fribourg, Suisse.

— Mésange charbonnière *P. major*.

#### SITTIDÉS.

— Sittelle torchepot *Sitta europaea*.

— Tichodrome *Tichodroma muraria* : un le 20 octobre 1970 à Bénonces, Bas-Bugey (PC) ; un le 27 décembre dans le val de Fier (74) (BC) ; à Arcalod, Réserve des Bauges (73), rassemblement de pas moins de 70 oiseaux (en deux troupes) le 11 novembre (MBv). Le 4 août 1971, 3 individus aux Dents-Blanches, Samoëns (74) (BCo) ; un le 20 septembre 1971 à Rognoux, Beaufortin (73) (FB). Plusieurs observations de Tarentaise en juillet (PL).

Dans le Vercors, 2 le 11 novembre à Charmeil (JC) et un le 9 août au col de la Machine (YT) ; en Chartreuse, un le 22 novembre à St-Martin-le-Vinoux (JC) et 2 + 1 le 16 octobre à la Combe du Rif et au Charmant Som (MBv).

Un le 12 août 1971 au Bourg-d'Oisans (38) (FB) et le 19 août au dessus d'Oules (38) (RL) ; dans le Pelvoux, 2 le 27 septembre 1971 à Lavey-Géviein (FB).

#### GRIMPEREAUX.

— Grimpereau des bois *Certhia familiaris* : en août à la Golèze, Samoëns (74) (BCo) ; en avril à la Rosière (MBb) et en mai et juillet à Nancroix et Peisey (PL), Tarentaise ; en juillet à Vars-l'Escreins et à Boscodon (05) (MBv) ; en mai à la Grangette et au col des Fans (07) (SM).

— Grimpereau des jardins *C. brachydactyla*.

#### BRUANTS.

— Bruant proyer *Emberiza calandra* : dernier le 10 octobre à Messimy (69) (BCo) et premier le 9 mars à Rive-de-Gier (42) (YT), mais l'espèce est notée l'hiver à Valence (SM).

— Bruant jaune *E. citrinella* : quelques hivernants, le 27 décembre à Valence (SM), le 29 en Forez (JL), le 31 à Belleroche (42), le 10 janvier en Dombes (PL), le 13 à Chaillol (05) (MBv), le 16 en Forez (JL).

— Bruant zizi *E. circlus* : quelques hivernants (décembre-janvier) en Dombes (PL), Forez (GT, JL), Messimy (69) (BCo), St-Chamond (42) (CB), Valence (SM), Puy-St-Eusèbe et Puy-Sanières (05) (MBv).

En belle saison, 2 citations de la plaine du Forez (JL, HB) ; un le 26 avril à St-Romain-de-Lerps (07) (AR) ; en avril à Chichiliane, Treschenu et Menée, bordure Est du Vercors (38), ainsi qu'à Grimone et Glandage (26) ; en mai à Trièves (38) et à Largentière-la-Bessée (05) (MBv).

— Bruant ortolan *E. hortulana* : chanteurs en juin près de Rive-de-Gier (42) (YT), et, dans le Pilat, à Ste-Croix et à St-Julien-Molin-Molette (CB, JDb) ; nicheur à la Grangette (07) (SM) ; à fin-avril/début-mai à Roussillon (38), passage ? (GF) ; vers 2 000 mètres à Vars (05) en juillet (MBv).

— Bruant fou *E. cia* : quelques hivernants, le 27 décembre à Rousillon (38) (GF) et à Vallières (74) (BC), les 2 et 3 janvier à Jonage (DA) ; un le 26 avril à Beynost (01) (MC) ; nicheur au Mollard-de-Don, Bas-Bugey (PC) ; à la belle saison à la Rosière, au Miroir et à Peisey, Tarentaise (MBb, PL), à Huez (38) (RL), à Treschenu et Mensac, Vercors Est (MBv), à Vars et St-Véran (05) (MBv).

— Bruant des roseaux *E. schoeniclus* : trois oiseaux repris en décembre, janvier et mars en Drôme et Isère, provenaient de Suisse et des 2 Allemagnes. Quelques hivernants en Forez (JL, HB). Premiers le 9 mars à Lavours (PC). Nicheur à l'embouchure de l'Ain (MBb).

#### FRINGILLES.

— Pinson des arbres *Fringilla coelebs* : premier chant le 16 février à Lyon (Pierre GIULANI). 2 femelles reprises à fin-décembre/début-janvier à Joux (69) et Chavanod (74) avaient été baguées respectivement en octobre 1969 au col de Bretolet, frontière franco-suisse, et en mars 1968 en Belgique.

— Pinson du Nord *F. montifringilla* : hivernage relativement modeste, dates extrêmes 17 octobre [Menthières, col du Sac (01)] (PRO) et 12 avril (Pilat) (CB). Effectifs moyens en novembre, assez abondant de la mi-décembre au 20 janvier, suivi d'un creux jusqu'à la mi-mars, avec passage accusé dans la seconde quinzaine de ce mois (CORA) : un oiseau contrôlé le 6 janvier à St-Chamond (42) avait été bagué le 31 décembre 1968 au Danemark.

— Verdier *Carduelis chloris* : hivernage très généralement qualifié d'abondant, à Valence (SM), St-Innocent (73) (PC) ; près de 700 bagues posées à Mâcon (FN) ; à St-Chamond, où le baguage a été pourtant interrompu du 26 janvier au 19 mars, 175 captures, avec un sexe-ratio mâles/femelles égal à 1,63. Un oiseau recueilli le 4 janvier à St-Uze (26) avait été bagué le 26 décembre 1969 dans le canton de Fribourg, Suisse.

— Chardonneret *C. carduelis* : quelques hivernants en Forez (JL), Dombes (RL), Beynost (MC), Jonage (RL). Trois oiseaux trouvés morts (07, 26, 38) au début de janvier avaient été bagués en automne 1969 et 1970 en Suisse et en Allemagne de l'Est.

— Tarin *C. spinus* : bon hivernage, dates extrêmes 19 octobre [lac Laffrey (37) (JC) et 4 avril (Forez) (JL)]. Peu commun jusqu'à la mi-février, à partir de quoi et jusqu'aux derniers jours de mars les effectifs ont été soutenus un peu partout (CORA).

— Linotte *C. cannabina* : peu d'observations en janvier (Valence (SM) et février (Romans (26) (RL)). En juin, 2 citations de la plaine du Forez (JL).

— Sizerin *C. flammea* : en Isère, quelques-uns le 31 octobre à Laffrey et à Pétichet, le 18 novembre à Prélénfrev (MBv) ; petit passage en novembre à Mâcon (FN) ; noté le 23 février et le 30 mars au marais de Lavours ; une cinquantaine le 1<sup>er</sup> mars à Ordonnaz, Bas-Bugey (PC) ; quelques-uns à la mi-février à Villars-lès-Dombes (RDb).

Le 13 mars à Molines-en-Champsaur (05) : petite population en été au Val d'Escreins, Vars (05) (MBv) ; présent en juillet en Tarentaise et au lac de Roselend, Beaufortin (73) (PL).

— Venturon *C. citrinella* : notations d'octobre-décembre en Vercors-Sud (JC), au col d'Orgeval, Bauges (73) (MBv), à St-Martin-en-Coailleux

(42) (CB), dans les gorges de la Loire (42) (JL). Deux mâles immatures bagués à la mi-octobre en Suisse ont été repris le 3 janvier dans l'Ardèche et le 7 mars dans la Drôme. En belle saison, noté dans les Hautes-Alpes (Val d'Escreins, Izoard) (MBv, JDb), en Isère (Chamrousse) (CB), en Savoie (Tarentaise, Beaufortin) (MBb, PL), en Haute-Savoie (Bauges) (CORA), et dans la Loire (Pilat) (CB, JDb).

— Serin cini *C. serinus* : rares hivernants, le 15 décembre à Valence (SM), le 30 décembre à St-Just-sur-Loire (42) (JL), le 8 janvier à Jonage (PL), le 21 février à Rive-de-Gier (42) (YT). Premiers chanteurs le 13 mars à Villeurbanne (69) (JL), le 15 à Valence (SM), le 25 à St-Chamond (42) (HB). En juillet, chanteur au Val d'Escreins à 1 600 m (05) (MBv).

— Bec croisé *Loxia curvirostra* : rares observations d'automne en Chartreuse, Vercors et Bauges (DA, JC, MBv) ; en février au col de la Madeleine, Vanoise (PC) et à la belle saison à St-Véran et à Vars (05) (MBv). Noté en avril à Yzeron (69) (BCo) et en mai à Embroye (07) (MBb).

— Bouvreuil *P. pyrrhula* : hivernage modeste en basse altitude (CORA).

— Grosbec *C. coccothraustes* : hivernage très modeste, contrairement à l'année précédente : un le 3 novembre à Messimy (69) (BCo), quelques-uns le 28 décembre à St-Chamond (42) (HB), un le 14 février à Talloires (74) (CORA), les 16 et 22 février dans le Bas-Bugey (PC).

Noté le 27 mars à Bessans, Hte-Maurienne (PL), le 10 avril à Vaulx (74) (BC), de mai à août (nicheur) à Belmont-en-Valromey (HR).

#### MOINEAUX.

— Moineau domestique *Passer domesticus* : 3 nids arboricoles en juin à St-Marcel-en-Dombes (DA). A Val-Claret, Hte-Tarentaise, altitude record de nidification à 2 100 m (PL).

— Moineau friquet *P. montanus*.

— Moineau soulcie *P. petronia* : en belle saison, dans les Hautes-Alpes à St-Véran, Molines-en-Queyras (MBv) et à Mont-Dauphin (JDb).

— Niverolle *Fringilla montifringilla* : quelques citations d'Isère (Pelvoux) (MBv), Savoie (Tarentaise et Maurienne) (DA, PL), et Hautes-Alpes (Galibier, Escreins) (MBv).

#### ETOURNEAU.

— Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* : à Lyon, dortoirs de milliers d'oiseaux en janvier rue Pasteur (PL) ; reprise le 24 octobre en Haute-Savoie d'un oiseau bagué une semaine avant dans le canton de Berne, Suisse ; reprise le 26 décembre dans la Loire d'un oiseau né près de Berne en 1970. En Dombes, gros vols (milliers) du début de février à la mi-mars (MC, RL, SH).

#### LORIOT.

— Lorient *O. oriolus* : premiers le 22 avril en Dombes (GG), puis le 24 à St-Innocent (74) (PC), le 28 à St-Martin-d'Hères (38) (JL), le 1<sup>er</sup> mai en Dombes (DDv), le 4 mai à Craponne (69) (BCo).

CORVIDÉS.

— Geai *Garrulus glandarius* : hivernage localement abondant (Monts du Lyonnais, Bas-Bugey...) (BCo, PC).

— Pie *P. pica*.

— Cassenoix *Nucifraga caryocatactes* : dans l'Ain, en octobre au col du Sac, Crêt de la Neige (PRo) et en mai et août au plateau de Retord (HR) ; en Haute-Savoie, dans les Bauges au Sambuy le 22 mai (CORA) et en août à la Golèze, Samoëns (BCo) ; en Savoie, quelques citations d'avril-juillet en Tarentaise (PL, MBb) ; dans les Hautes-Alpes, en été au Val d'Escreins, Vars (MBv). Intéressante citation les 21 et 30 mai à la Grangette (07) (SM).

— Crave *P. pyrrhocorax* : le 1<sup>er</sup> novembre au Glaizil, Champsaur (05) (MBv) ; quelques observations en Haute-Tarentaise en juillet (PL).

— Chocard *P. graculus* : noté dans les Bauges, en Vanoise, en Chartreuse, en Vercors, en Oisans, Belledonne et Queyras (DA, CB, MBv, RL, PL, FB).

— Choucas *Corvus monedula* : 2 000 le 31 décembre au Sud de Valence (SM).

— Corbeau freux *C. frugilegus* : plus gros effectifs (troupes supérieures à 1 000 individus) durant tout février en Dombes et vallée du Rhône (MC, RL, SM, GF, AR). Le 18 mars, colonie d'au moins 230 nids à Charvieu près Pont-de-Chéruy (38) (DA) ; le 8 mars, colonie d'une dizaine de nids au pont de Chavannay, 15 km au Sud de Vienne (38) (Raymond FAURE) ; il s'agit de la colonie la plus méridionale de notre région.

— Corneille noire *Corvus corone* : en juillet, notée en Vanoise à 2 200 m sur la route de l'Iseran (PL) et aux cols du Galibier et du Lautaret (MBv).

— Corenille mantelée *C. corone cornix* : une tuée le 9 janvier à Ville-sous-Anjou (38) (GF) ; une le 5 février à Châlon-sur-Saône (71) (SM).

— Grand Corbeau *C. corax* : dans l'Ain, assez commun dans les vallées de la Valserine et de la Sémine (PRo) ; noté en hiver à la Montagne de la Raie et le 14 juillet à Ordonnaz, Bas-Bugey (PC) ; régulier en belle saison à Belmont-en-Valromey (HR).

En Haute-Savoie, noté en décembre à Châtel-d'Abondance (SH) et au plateau des Glières (GPC), à la belle saison dans le val du Fier (BC), à la Sambuy, Bauges (CORA), à la Golèze, Samoëns (BCo, JDm), à Servoz (RLk). En Savoie, présent à la Balme près Yenne (CORA), à Chaudieu (PC) et en Tarentaise (PL, MBb). En Isère, le 27 mars dans la falaise de Hyères-sur-Amby, Ile Crémieu (MBb), en Chartreuse (DA), Belledonne (RL, JDm), Oisans (CB), vallée du Drac (MBv), Pelvoux (FB). Dans les Hautes-Alpes, au Galibier, Val d'Escreins, Vars, Puysanières, Chaillol, Aspres-les-Corps, Rosans (MBv, MBb). Dans la Drôme au cirque d'Archiane, Vercors (JC), et à Glandage (MBv). Dans l'Ardèche, en décembre aux Fonts-du-Pouzin, en mai à la Grangette et en août à St-Romain-de-Lerps (SM, AR).