

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDEE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIETES BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, 69006 Lyon

TRESORERIE :

	1974
Membre actif France avec Service du Bulletin	30 F
Abonnement France	30 F
Membre scolaire avec Service du Bulletin	15 F
Abonnement Etranger	33 F
Changement d'adresse, inscription ou réintégration en sus	5 F

N.B. — Les virements à notre C.C.P. LYON 101-98 doivent être rédigés au nom de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON.

SOMMAIRE

NICOLAS Jean-P. — <i>Eusphalerum (Abinothum) Coiffaiti</i> , espèce nouvelle des Pyrénées françaises (Col. Staph.)	71
BALAZUC J. — Laboulbéniales de France (suite)	73
LEBRETON Ph. — Compte rendu ornithologique annuel de l'automne 1971 à l'été 1972 dans la région Rhône-Alpes (suite)	79
PÉRICART J. — Croissance industrielle, énergie nucléaire et nature : libre propos. (Supplément au bulletin mensuel)	XVII

Angles, en face d'Avignon (coll. J. B.). Egalement sur un Carabique indéterminé des Pyrénées : « Montlony » (*sic, lege* Montlouis) (COLLA). Nos exemplaires recueillis sur *D. germanus* sont tout à fait conformes à la description ; nous en possédons également du Maroc (Larache) et d'Asie Mineure (massif du Taurus).

(à suivre)

COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE ANNUEL DE L'AUTOMNE 1971 A L'ETE 1972

(suite)

— Bécassine des marais *Capella gallinago* : hivernantes le 12 décembre au marais de Pont-Naveys (01) (HR) et à Rive-de-Gier (42) (YT), le 9 dans l'île Crémieu (MBb), entre les 26 décembre et 16 janvier en Forez (YT, JDb, CB, HB, RF, PG), le 22 janvier au marais de Lavours et au lac du Bourget (HR), le 23 en Dombes (HB). Un individu tué le 24 novembre à Chaponnay (38) avait été bagué en septembre 1970 en Autriche.

Notée le 5 février à Belmont-en-Valromey (HR), le 7 en Forez (RF), le 26 à Assieu (38) (GF), les 29 mars et 14 avril à l'embouchure de l'Ain (MC), le 23 avril dans l'île Crémieu (MBb), le 6 mai au marais d'Albens (73) (BC) ; dernière en Dombes le 7 mai (GPC).

— Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus* : une le 13 février en Dombes (HR) ; en Forez les 31 octobre, 27 février et 12 mars (PG).

— Bécasse *Scolopax rusticola* : à Belmont-en-Valromey (01), du 9 octobre au 14 novembre, puis quelques-unes du 27 décembre au 23 janvier (HR) ; du 20 au 30 octobre à Vaulx (74) (BC) ; du 5 au 11 novembre en Forez (RF) ; une le 19 novembre à Balan et une le 31 décembre à Beynost (01) (FA, MC). Un individu tué le 14 novembre à St-Jean-en-Royans (26) avait été bagué le 3 novembre 1967 à Helgoland (Allemagne de l'Ouest). Une le 7 juillet à Malatra, Vercors (MBb).

— Courlis cendré *Numenius arquata* : derniers en novembre en Dombes (PR), premiers le 4 mars en Forez (RF, YT), le 19 au marais du Gros Pré, Crolles (38) (MBv), le 20 en Valbonne (FA). Nidification habituelle en Valbonne, île Crémieu, val de Saône, marais de Lavours, Forez (CORA).

— Barge à queue noire *L. limosa* : quelques-unes du 19 juillet à début-août en Forez (YT, CB), dernières le 23 septembre en Dombes (GPC). Une précoce le 7 février en Forez (RF, JL), puis 200 le 4 mars en Dombes (où 4 couples au moins ont niché) (DA, MC, UG, PL) ; du 11 mars au 7 mai en Forez (HC, JL, RF, PG) ; du 20 mars au 9 avril à Assieu (38) (GF, DM, JG, JB) ; le 18 avril à Jonage (GPC).

— Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : dès le 14 juillet 1971 en Dombes (RL) où un passage exceptionnel est noté à Birieux, avec 350 oiseaux du 7 au 11 octobre (MC) ; derniers le 27 octobre (PL, PC, MC). Au printemps, dates extrêmes 16 avril (Forez) et 21 juin (Dombes) (BB, HC, DA, MC).

— Chevalier gambette *Tr. totanus* : 6 citations d'automne, du 19 juillet (Forez) au 26 octobre (Dombes) (CB, RDb, MC, RL, PL, YT) ; un individu tué le 6 septembre au Bourget-du-Lac était né 3 mois avant en Finlande. Au printemps, du 15 mars au 21 juin en Dombes ; du 26 mars au 7 mai au confluent de l'Ain ; du 30 mars au 20 mai en Forez ; les 5 et 6 mai à Vernaison (69), les 6 mai et 3 juin aux sources du Dolon (38), les 28 et 31 mai à Miribel (01) (CORA).

— Chevalier aboyeur *Tr. nebularia* : du 7 août au 2 octobre en Forez et du 12 août au 27 octobre en Dombes. Au printemps, du 15 mars au 6 mai en Dombes ; du 29 mars au 8 mai au confluent de l'Ain ; les 7 mai et 13 juin en Forez ; le 6 mai aux sources du Dolon (38) et le 31 mai à Thil (01) (CORA).

— Chevalier culblanc *Tr. ochropus* : nombreuses observations en Forez du 1^{er} juillet 1971 au 4 septembre ; 4 observations en Dombes du 8 août au 25 octobre ; du 18 juillet au 29 août au confluent de l'Ain (CORA). Hivernants le 19 décembre au confluent de l'Ain (MBb) et du 12 décembre au 7 janvier à Rive-de-Gier (42) (YT).

Au printemps, du 11 mars au 27 juin au confluent de l'Ain, du 16 mars au 31 juin en Forez, du 5 avril au 14 juin en Dombes, le 24 mars dans l'Ile Crémieu, le 8 avril à Assieu (38) (CORA).

— Chevalier sylvain *Tr. glareola* : le 15 juillet à l'embouchure de l'Ain, puis passage important en Dombes du 8 août au 29 septembre ; de même en Forez de la mi-juillet au début-septembre. Au printemps, un le 22 avril à Rumilly (74), du 29 avril au 20 mai en Forez, le 10 mai à St-Martin-d'Hères (38) (JDM).

— Chevalier guignette *Tr. hypoleucos* : à l'automne, passage important du 19 juillet au 30 août en Forez, où 2 oiseaux contrôlés les 31 juillet et 8 août à St-Laurent-la-Conche avaient été bagués une dizaine de jours avant en Suède. En août en Dombes ; le 30 août au lac de Morgnieu, Belley (01) (HR).


Au printemps, des précoces le 1^{er} mars à Assieu (38) (DM) et le 5 en Forez, mais fort passage au début de mai : jusqu'au 14 mai en Forez, même date à l'embouchure de l'Ain, jusqu'au 20 mai en Dombes, autour de Lyon du 2 au 24 mai (Jonage, ...), le 4 mai aux Roches-de-Condrieu (38) (DM), le 14 mai à La Salle (71) (PN), le 21 mai à la Digue de Pinay (42)(RF) ; les 6 mai et 3 juin aux sources du Dolon (38) (DM), le 27 mai 5 oiseaux au Grand Mèpieu, Ile Crémieu ; le 3 juillet un aux carrières de Rumilly (74) et un au bord du Chéran à Rumilly (BC) ; le 14 juillet au confluent de l'Ance vers Bas-en-Basset (43) (GPC), le 15 juillet à Névache (05) (CORA). Un oiseau contrôlé le 8 mai à l'embouchure de l'Ain avait été bagué le 19 juillet 1969 en Westphalie (Allemagne de l'Ouest).

— Bécasseau maubèche *C. canutus* : 6 le 13 mai en Forez (BB).

— Bécasseau minute *Calidris minuta* : 3 le 7 août en Forez (YT, JDb, HB) ; 2 du 7 au 11 octobre en Dombes (MC). 3 le 5 avril aux Roches-de-Condrieu (38) (DM).

— Bécasseau variable *C. alpina* : à l'embouchure de l'Ain, les 18 juillet et 4 septembre (MBb) ; en Dombes, les 8-12 août et 7-11 octobre (PL, MC). 3 le 22 avril au confluent de l'Ain (MBb).

— Bécasseau cocorli *C. ferruginea* : 2 en Forez le 7 août (YT, JDb, HB) et 4 en Dombes le lendemain (PL).



Goéland sénateur (= Mouette ivoire). 4^{me} citation française de cette espèce nichant au Spitzberg.

Photo J.-F. GONNET (Jonage, 13 février 72)

— Bécasseau sanderling *C. alba* : un individu (aile cassée), capturé le 3 juin 1972 à Balancet, Dombes (MC, DA, PC).

— Chevalier combattant *Philomachus pugnax* : en Dombes, jusqu'au 21 novembre ; dès le 19 juillet et jusqu'au 27 novembre en Forez. Au printemps, premiers, précoces, les 5 et 6 février en Dombes, puis plus nombreux à partir du 2 mars ; en Forez, 13 citations du 11 mars au 14 mai ; 4 individus le 27 mai au Grand Mérieux, Ile Crémieu (CORA).

— Echasse blanche *H. himantopus* : en Dombes, seulement une observation en avril et une en mai, (MC, PR).

OEDICNÈME.

— Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* : une centaine le 6 septembre à Ozolles (71) (FN) ; premier le 18 mars en Forez (BB).

GLARÉOLE.

— Glaréole à collier *Glareola pratincola* : 2 le 29 mai 1972 à Guillemoz (01) (PR).

LARIDÉS.

— Grand Labbe *Stercorarius skua* : un individu bagué trouvé mort le 1^{er} février à La Tour-du-Pin (38) était né l'année précédente dans les Shetland (Ecosse).

— Goéland sénateur *Pagophila eburnea* : première citation régionale (et 4^{me} citation française) de cette espèce arctique, du 28 janvier au 13 février au moins au bassin de Jonage (CORA) ; d'autant plus insolite vu l'hiver clément.

— Goéland brun *Larus fuscus* : un à Excenevex, Léman, le 16 janvier (MC) ; un à Jonage le 15 mars (GPC).

— Goéland argenté *L. argentatus* : de novembre à avril à Jonage, maximum 8 adultes et 2 immatures le 18 février (CORA) ; d'octobre à décembre à l'embouchure de l'Ain (MBb, GPC). Le 1^{er} novembre au Pouzin (07) (SM) ; 2 le 14 novembre à Belmont-en-Valromey (HR) ; le 22 avril 2 à Rumilly (74) (BC) et 5 à l'embouchure de l'Ain (MBb) ; 5 en Dombes le 29 mai (MC, PC).

— Goéland cendré *L. canus* : de décembre à mars à Jonage, maximum 15 oiseaux le 15 mars (CORA) ; 2 le 30 décembre à Feurs (42) (RF) ; 2 au lac de Paladru (38) le 23 janvier (MBv). Trois couples nicheurs à l'embouchure de la Dranse (74) (MC).

— Mouette rieuse *L. ridibundus* : hivernage abondant, notamment à Lyon où le chiffre de 10.000 oiseaux est avancé pour l'ensemble du milieu urbain et péri-urbain (DA). Un oiseau recueilli le 22 janvier à Donzère (26) était né en 1970 dans le Palatinat (Allemagne de l'Ouest) ; un autre, trouvé mort en janvier à St-Pierre-de-Chérennes (38), était né au printemps précédent en Basse-Saxe (Allemagne de l'Ouest) ; un troisième, tué (!) le 15 mars en Dombes, était né l'année précédente en Hollande.

— Mouette pygmée *L. minutus* : le 5 mai, 2 adultes et un immature à Jonage (GPC) ; le 7 mai, 2 immatures en Forez (BB, HC) ; le 11 mai, 2 immatures et un adulte en Dombes (UG).

— Guifette noire *Chlidonias niger* : une dizaine le 21 août au lac du Bourget (HR). A Jonage, une vingtaine le 20 mai (FA) ; en Forez,

une dizaine les 1^{er} mai et 18 juin (YT, BB) ; une le 15 juin à l'embouchure de l'Ain (JLc), 4 le 27 juin (MC, GPC).

— Guifette leucoptère *Ch. leucopterus* : une le 24 mai en Dombes (MC).

— Guifette moustac *Ch. hybrida* : dernière en Dombes le 7 octobre (PR), où les premières, précoces, sont notées les 1^{er}, 4 et 6 avril (PR, MC).

— Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : un couple dans les îles de Miribel (01) le 4 juin (JLc) ; à l'embouchure de l'Ain, un individu les 14 mai, 22 juin et 2 juillet (JLc, PL). Une trentaine de couples à l'embouchure de la Dranse (74) (MC).

COLUMBIDÉS.

— Pigeon colombin *Columba oenas* : quelques hivernants, le 30 décembre et le 7 février (retour précoce ?) en Forez (RF), le 15 janvier en Dombes (PR). Un oiseau tué le 2 octobre dans l'Isère, était né l'année précédente dans le canton de Genève.

— Pigeon ramier *C. palumbus* : très gros vol migratoire le 22 octobre à Luriecq (42) (RF) ; hivernants en Forez le 20 janvier ; gros du passage de printemps au tout début de mars en Forez et en Dombes (CORA).

— Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* : encore une le 6 octobre en Forez (PG) ; première, le 27 avril en Forez (RF).

— Tourterelle turque *S. decaocto* : nouvelles stations à St-Just-sur-Loire (42) (GT) et, à 500 m d'altitude, à St-Etienne (42) (RF) et à Vaux-en-Beaujolais (69) (DA).

COUCOUS.

— Coucou gris *Cuculus canorus* : premier le 21 mars à St-Marcel-Bel-Accueil (38) (MR), le 24 à Messimy (69) (BCo), le 25 à Rumilly (74) (BC), le 2 avril à Beynost (01) (PL), assez précoce.

— Coucou-geai *Clamator glandarius* : un individu aurait été observé le 17 avril peu en aval de l'embouchure de l'Ain (FA).

RAPACES NOCTURNES.

— Hibou grand-duc *Bubo bubo* : nicheur en Ardèche et Gorges de la Loire (CORA).

— Hibou moyen-duc *Asio otus* : nicheur abondant semble-t-il cette année en Forez (YT, RF, PG, JL), autour de Rumilly (74) (BC), et en Dombes (MC, PL, PC).

— Hibou des marais *Asio flammeus* : 2 adultes nourrissent 3 jeunes le 18 juin à Dimizieu, Ile Crémieu (MBb).

— Hibou petit-duc *Otus scops* : chante le 27 juin et le 9 juillet à la Boisse (01) (MC, GPC, PL).

— Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* : Vanoise (PL).

— Chouette chevêche *Athene noctua*.

— Chouette hulotte *Strix aluco*.

— Chouette effraie *Tyto alba*.

ENGOULEVENT.

— Engoulevent *Caprimulgus europaeus* : noté dans les Gorges Sud de la Loire (RF), à Rive-de-Gier (42) (YT), à St-Maurice-de-Beynost (01)

(FA), à Roussillon (38) (GF), à Belmont-en-Valromey (HR), à Remuzat (26) (SM).

MARTINETS.

— Martinet noir *A. apus* : encore le 12 septembre à Belmont-en-Valromey (HR) ; premier le 20 avril à Crépieux (69) (JLc), le 21 avril à Pierre-Bénite (69) (JL) et à Neyron (01) (PL).

— Martinet à ventre blanc *Apus melba* : au début-juin, 6 à Chèzery et 5 à Mijoux (01) (PRo) ; en mai, à St-Restitut et à Combe-Laval (26) (DM, SM) ; en juillet, à Aussois, Maurienne (FN) et à Monestier-de-Clermont (05) (MBb) ; en août à St-Christophe-en-Oisans (AR).

MARTIN-PÊCHEUR.

— Martin-pêcheur *Alcedo atthis* : 3 observations en décembre-janvier (Vallée du Rhône, lac d'Aiguebelette (38) (GF, HR, JDm, MBv) ; nicheur à Assieu (38) (GF).

GUËPIER.

— Guépier *Merops apiaster* : toujours présent en Dombes (RF, UG) ; 15 individus le 5 juin à St-Romain-de-Lerps (07) (AR) ; colonie à Morestel (38) (JLc).

HUPPE.

— Huppe *Upupa epops* : premières le 21 mars à St-Marcel-Bel-Accueil (38) (MR), le 23 à Vaulx (74) (BC), le 3 avril en Dombes (DA).

PICS.

— Pic vert *Picus viridis*.

— Pic noir *Dryocopus martius* : dans l'Ain, à Chèzery (PRo), à Cormoranche-en-Bugey et à Belmont-en-Valromey (HR), ainsi qu'au lac Genin (PL). Présent dans les Gorges Sud de la Loire (GPC, RF, PL, JL). En Vanoise (MBv) et Vercors (SM, MBv, AR, DA).

— Pic épeiche *Dendrocopos major*.

— Pic épeichette *D. minor* : observations nombreuses (une quarantaine), surtout en Forez (BB, PG), Monts du Lyonnais (RFt, BCo), Gorges Sud de la Loire (RF, JL), Vallée moyenne du Rhône (GF, JG, DM).

— Torcol *Jynx torquilla* : premiers, précoces, le 20 mars à Montségrou-Milieu (38) (DM), le 23 en Dombes (GPC), le 1^{er} avril à St-Etienne (42) (RF), le 2 à Vaulx (74) (BC).

ALOUETTES.

— Cochevis huppé *Galerida cristata* : nicheur en mai-juin à la Valbonne (01) (UG, GPC) ; noté le 15 mai à Font d'Urle (26) (SM).

— Alouette lulu *Lullula arborea* : rassemblement d'une centaine le 28 novembre à Péage-de-Roussillon (38) (RL) ; premiers chants les 7 et 10 février dans la Loire (YT).

— Alouette des champs *Alauda arvensis* : premiers chants le 15 janvier à Rive-de-Gier (42) (YT), le 10 février en Forez (RF), le 13 à Jonage (MC, JL).

HIRONDELLES.

— Hirondelle de rivages *R. riparia* : encore une quinzaine le 28 septembre à Grenoble (Jdm). Une colonie d'une trentaine de couples à La Motte-François (26) (SM).

— Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* : une quinzaine le 29 décembre dans les Gorges de l'Ardèche (JF) ; en mars au Col des Ducs (26) (RL), dans les Gorges Sud de la Loire (RF, JL) et à Champfromier (01) (Pro) ; colonie d'une vingtaine de couples à Pont-de-Lignon (43) (GPC) ; en août-septembre, à La Bérarde et au Vénéon, Oisans (DA).

— Hirondelle de cheminée *H. rustica* : dernières le 31 octobre en Valromey (HR) ; première le 16 mars à Cordieux (01) (MC) et le 19 mars à Fromente (01) (DA).

— Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* : des jeunes encore au nid les 18 et 21 septembre en Dombes (PL) et à Vienne (38) (MR) respectivement. Première le 29 mars à Vinay (38) (MBv), le 3 avril en Forez (PG). Colonies rupestres aux Grands Goulets, Vercors (DA) et dans les Gorges de l'Omblèze (26) (SM).

MOTACILLIDÉS.

— Pipit rousseline : *Anthus campestris* : en mai à l'embouchure de l'Ain (MC).

— Pipit des arbres *Anthus trivialis* : un oiseau tué (!) le 11 octobre à Vénissieux, avait été bagué en mai précédent (adulte) au Danemark. Premiers le 2 avril à Thusy (74) (BC), le 4 à Messimy (69) (BCo).

— Pipit farlouse *A. pratensis* : dates extrêmes en plaine 30 septembre et 23 mars (Rive-de-Gier) (42) (YT) ; une dizaine le 26 janvier à St-Etienne (42) (RF). Nicheur très probable le 24 juin au Col du Béal, Monts du Forez (RF).

— Pipit spioncelle *A. spinoletta* : nicheur au Col du Béal (42) (RF).

— Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : une dès le 18 mars à Jonage (JL), puis le 4 avril en Forez (PH). Assez commune en mai et juillet en Val-de-Saône, à La Salle et Varenne (71) (PN).

— Bergeronnette des ruisseaux *M. cinerea* : quelques hivernantes. Le 30 juin à Vaulnaveys (38) (MBv) ; le 13 mai à Boulieu, Ile Crémieu (BC) ; le 25 juin dans les Monts de la Madeleine (42) (BC).

— Bergeronnette grise *M. alba*.

PIE-GRIÈCHES.

— Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : premières le 30 avril à Messimy (69) (BCo), le 7 mai en Forez (BB).

— Pie-grièche à tête rousse *L. senator* : premières le 27 avril en Dombes (GPC), puis le 9 mai à Craponne (69) (DA) et à St-Chamond (42) (HB) ; une le 18 juin à Rozier-Côte d'Aurec (43) (PL).

— Pie-grièche à poitrine rose *L. minor* : une en Valbonne le 2 juillet (PL, MC).

— Pie-grièche grise *L. excubitor* : 19 observations régionales de novembre à février (CORA).

CINCLE.

— Cincle *C. cinclus* : un hivernant le 20 février à Glandieu (01) (BC). Nid avec œufs le 26 mars à Montségur-Milieu (38) (DM) ; nicheur à Soleymieux (42) (PH) et dans les Gorges de l'Ardèche (GG).

TROGLODYTE.

— Troglodyte *T. troglodytes*.

ACCENTEURS.

— Accenteur alpin *Prunella collaris* : une trentaine le 28 mars à Samoëns (74) (JDM) ; présent en Vanoise et en Oisans (BC, PL, DM, DA) ; 2 adultes et 2 jeunes le 16 août au Grand Veymont, Vercors (MBv).

— Accenteur mouchet *P. modularis* : dates extrêmes en plaine, 27 octobre (Dombes) (PL) et 24 mars (Messimy) (69) (BCo) ; noté le 18 juin dans les Gorges Sud de la Loire (PL).

MUSCICAPIDÉS.

Turdinés.

— Traquet tarier *Saxicola rubetra* : dernier le 4 octobre en Dombes (MC) ; premier, précoce, le 22 mars à St-Chamond (42) (HB).

— Traquet pâtre *S. torquata* : hivernants le 22 janvier en Dombes (PL) et dans l'Ain (MC), le 9 février en Forez (HB, JDb), le 10 à Grenoble (JDM) ; retour abondant le 21 février à St-Romain-de-Surrieu (38) (GF), le 23 à St-Chamond (42) (HB), le 25 en Forez (RF).

— Traquet motteux *Oe. oenanthe* : dernier le 3 octobre à Riverie (69) (YT) ; premiers le 8 avril en Forez (PH), mais le 14 mai encore à La Salle (71) (PN) et à l'embouchure de l'Ain (PL, MC).

— Merle de roches *Monticola saxatilis* : 3 observations en Vercors, les 15 mai, 18 et 20 juin (DA, MBv, SM).

— Merle bleu *M. solitarius* : un le 15 avril dans les Gorges de l'Ardèche (CORA).

— Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* : dernier le 15 novembre à Valence (SM) ; premiers (hivernants ?), précoces, le 15 février à St-Etienne (42) (PG), le 16 à Limonest (69) (RFt), le 18 à Miribel (01) (JLc) et Rive-de-Gier (42) (YT), le 21 à Roussillon (38) (GF).

— Rougequeue à front blanc *Ph. phoenicurus* : dernier le 21 septembre à Rive-de-Gier (42) (YT) ; premier, précoce le 18 mars à Roche-la-Molière (42) (GT). Noté le 8 juillet à L'Ecot, Hte-Maurienne, à 2 000 mètres d'altitude (BC).

— Rougegorge *Erithacus rubecula* : un oiseau de l'année bagué le 2 octobre près de Leipzig (Allemagne de l'Est) est repris 24 jours plus tard à St-Egrève (38).

— Rossignol *Luscinia megarhynchos* : premiers le 5 avril à Roussillon (38) (GF), Limonest (69) (RFt) et en Dombes (MC).

— Gorgebleue *L. svecica* : 5 observations du passage de printemps en Forez, à partir du 16 mars (HC, BB) ; une famille le 11 juillet au confluent de l'Ain (MC, JLc, MBb).

— Grive litorne *Turdus pilaris* : des individus le 25 septembre à Belmont-en-Valromey, sont certainement des nicheurs proches (HR) ;

dernières le 23 mars en Dombes (14 reprises hivernales de bagues, que nous ne détaillons pas ici). Une troupe d'une vingtaine le 15 août à Vénosc (38) relève très certainement d'une nidification proche (AR).

— Merle à plastron *T. torquatus* : un mâle adulte tué le 29 septembre au Béage, avait été bagué 4 ans avant au passage d'automne à Helgoland (Allemagne de l'Ouest) ; un le 25 octobre à Belmont-en-Valromey (01) (HR).

— Merle noir *T. merula* : 7 reprises hivernales de bagues. Premier chant le 5 janvier à Roussillon (38) (GF), le 9 à St-Chamond (42) (HB) ; premier jeune le 19 mars à Villeurbanne (RL).

— Grive mauvis *T. iliacus* : 5 reprises de bagues ; dates extrêmes de l'hivernage 4 octobre (HR) et 18 mars (BB, RF).

— Grive musicienne *T. philomelos* : gros du passage de la mi-septembre à la mi-octobre ; 5 reprises de bagues. Notée le 2 février à Clonas-sur-Varèze (38) (GF), le 7 en Forez (RF), le 15 en Dombes (HR). Chante le 2 juillet dans les Iles du Rhône à Miribel (PL).

— Grive draine *T. viscivorus* : nicheuse dans les Gorges Sud de la Loire (PL, JL, RF).

Sylviniés.

— Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*.

— Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides* : premières le 29 mars dans l'Ain (MC), le 1^{er} avril en Forez (RF) ; chante en mai dans l'île Crémieu (38) (PL).

— Locustelle tachetée *L. naevia* : une le 28 mars, précoce, en Dombes (PC) ; aux Echets le 23 avril (JL) ; en mai-juin au marais d'Albens (73) (BC) et dans les Monts de la Madeleine (42) (CORA).

— Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : un, précoce, le 26 mars en Dombes (PC).

— Rousserolle verderolle *A. palustris* : en juin-juillet au marais d'Albens (73) (BC) ; en Vanoise (PL, BC).

— Rousserolle effarvatte *A. scirpaceus* : première le 29 avril seulement en Forez (YT) ; chanteur le 16 mai à Arandon, Ile Crémieu (PL).

— Rousserolle turdoïde *A. arundinaceus* : commune aux étangs de Meyrieu et de Pommier-de-Beaurepaire (38) (DM).

— Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* : Forez, Gorges Sud de la Loire (CORA) ; le 18 juin au Col des Ducs (26) (RL).

— Fauvette orphée *Sylvia hortensis* : un chanteur cantonné les 19 juin et 3 juillet à Chambles, Gorges Sud de la Loire (RF, JL).

— Fauvette des jardins *S. borin* : première le 22 avril à l'embouchure de l'Ain (MBb), le 28 à Vaulnaveys (38) (MBv).

— Fauvette à tête noire *S. atricapilla* : quelques hivernantes, le 2 janvier (chant) à Roussillon (38), le 8 à Jonage (JL), le 14 février à Rive-de-Gier (42) (YT), le 17 à Lyon (RL).

— Fauvette babillarde *S. curruca* : quelques observations à l'embouchure de l'Ain, en Dombes, en Forez et en Vanoise (CORA).

— Fauvette grisette *S. communis* : premières, tardives, le 23 avril aux Echets (JL), le 25 à Vaulnaveys (38) (MBv).

— Fauvette pitchou *S. undata* : les 16 avril et 19 juillet dans les Gorges de l'Ardèche (JL, JB).

— Fauvette passerinette *S. cantillans* : chante le 11 mai à St-Restitut et à Mont-Ségur (26) (DM).

— Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : dès le 18 mars à l'embouchure de l'Ain (MBb), puis le 23 à Grenoble (JDm) et à Lyon (JL), le 26 dans les Gorges de la Loire (RF) ; un chanteur le 28 mai à Sandrans, Dombes (PL).

— Pouillot véloce *Ph. collybita* : hivernants les 10 et 13 janvier à Roussillon (38) (JF), le 18 en Dombes (MBv) ; premiers le 26 février à Poussieu (38) (GF, DA), le 4 mars en Forez (BB).

— Pouillot de Bonelli *Ph. bonelli* : premier, précoce, le 6 avril dans les Gorges de la Loire (RF), le 13 à Rive-de-Gier (42) (YT) et en Ardèche (JL).

— Pouillot siffleur *Ph. sibilatrix* : à St-Etienne (42) les 23 et 25 avril (PH) ; chanteur le 4 juin au Lac Genin (01) (PL) ; nicheur dans les Gorges de la Loire (RF, JL, JM) et en Vercors (MBv).

Régulins.

— Roitelet huppé *R. regulus* : nombreuses citations hivernales dans l'île Crémieu (MBb), le Pilat, les Monts du Lyonnais (BCo) ; le 4 juin noté au Lac Genin et en forêt de Merlone (01) (PL) ; le 18 juin dans les Gorges de la Loire (PL) ; en juin à St-Romain-de-Lerps (07) (AR).

— Roitelet triple-bandeau *R. ignicapillus* : quelques hivernants, le 12 décembre à Aiguebelette (73) (JDm), le 16 janvier à Rencurel (26) (MBv), le 10 février à Grenoble (JDm) ; chanteur le 11 mai à Joyeux, Dombes (PL) (MC), le 4 juin au Lac Genin et au Plateau de Retord (01) (PL), en juin à St-Romain-de-Lerps (07) (AR).

Muscicapinés.

— Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* : dernier le 26 septembre en Dombes (YT) ; premier le 21 avril à Jonage (GPC) et à St-Etienne (PH) ; un le 14 juillet à Brindas (69) (BCo), nicheur ou migrateur d'automne précoce ?

— Gobemouche gris *Muscicapa striata* : un dès le 9 avril à Grenoble (MBv). Nicheur à Vaulnaveys (38) (MBv), à Oullins (69) (DA), à Montrond (42) et à St-Romain-la-Chalm (43) (JL, PG, BB), au Lac Genin (01) (PL).

MÉSANGES.

— Mésange à moustaches *Panurus biarmicus* : 3 femelles ou immatures le 23 novembre à St-Rambert-sur-Loire (42) (YT) ; un couple le 8 mars à Frontenas (69) (YM) ; premières citations régionales.

— Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* : nid en construction le 21 février à Lissieu (69) (RFt).

— Mésange rémiz *Rémiz pendulinus* : 5 le 12 mars à Valeille, Forez (BB).

— Mésange nonnette *Parus palustris*.

— Mésange boréale *P. atricapillus* : notée en Forez en octobre, décembre et août (YT, HB, CB, JDb) ; un couple au marais d'Albens (73) (BC) ; le 15 mai à Font d'Urle, Vercors (SM) ; le 4 juin au lac Genin et en forêt de Merlone (01) (PL).

— Mésange huppée *P. cristatus* : le 18 juin à Malvalette, Gorges de la Loire (PL).

— Mésange noire *Parus ater* : 18 citations hivernales (CORA) ; le 18 juin dans les Gorges de la Loire (PL).

— Mésange bleue *P. caeruleus* : un oiseau trouvé mort le 7 février à Moutiers (73) avait été bagué le 27 septembre précédent au Col de Bretolet (Suisse).

— Mésange charbonnière *P. major* : un oiseau trouvé mort fin-décembre à Poliéνας (38) avait été bagué le 19 octobre précédent au Col de Bretolet.

— Sittelle *Sitta europaea*.

GRIMPEREAUX.

— Tichodrome *Tichodroma muraria* : hivernant probable aux grottes de La Balme (01) (MC, d'après renseignement local) ; un le 30 décembre à Lagorce, Gorges de l'Ardèche (JF) ; un le 26 février dans les Gorges de la Souloise (26) (MBv). Nicheur probable au Col des Ducs (26) (RL) et à Champfromier (01) (PRo).

— Grimpereau des bois *Certhia familiaris* : 2 le 29 décembre à Samoëns (73) (JDm). Chants le 15 mai à La Portette et le 27 au Col de la Bataille (26) (SM) ; un le 23 août à Autrans, Vercors (MBv).

— Grimpereau des jardins *C. brachydactyla*.

BRUANTS.

— Bruant proyer *Emberiza calandra* : plusieurs hivernants, le 3 décembre en Dombes (GPC), le 7 au Bois-d'Oingt (69) (HR), le 6 janvier à Valence (SM), le 6 février à Jonage (GPC) ; chant dès le 26 février en Forez (RF).

— Bruant jaune *E. citrinella* : des hivernants en Forez, Jonage, Salaise-sur-Sanne (38) (JF) : nicheur commun dans les Gorges de la Loire (PL).

— Bruant zizi *E. circlus* : hivernant à Valence (SM) : nicheur dans les Gorges de la Loire (RF, JL, PL), Gorges de l'Ardèche (JL, PL), à Vergisson (71) (DA) et à Vaulx (74) (BC).

— Bruant ortolan *E. hortulana* : niche à Vaux-en-Beaujolais (DA), Gorges de la Loire (RF, JL, PL), à Pouilly-le-Monial (69) (YM) ; noté en Dombes (MC, UG).

— Bruant fou *E. cia* : quelques hivernants à Grenoble (JDm), Rive-de-Gier (42) (YT), lac du Bourget (MBv) ; le 23 mars à Beynost (01) (MC), le 29 à Champfromier (01) (PRo). A la belle saison dans la Drôme, Saillans, Colonne et Remuzat (SM).

— Bruant des roseaux *E. schoeniclus* : 4 reprises d'octobre-novembre dans la région concernaient des oiseaux bagués en Suède, Allemagne de l'Est et de l'Ouest, et Suisse. En mai-juillet à l'embouchure de l'Ain (PL, MC).

FRINGILLES.

— Pinson des arbres *Fringilla coelebs* : deux oiseaux trouvés le 12 novembre à Donzère (26) et le 20 février à Scionzier (74) avaient été bagués à la mi-octobre 1971 au Col de Bretolet, Valais. Premier chant le 8 février à Roussillon (38) (GF).

— Pinson du Nord *F. montifringilla* : très faible hivernage, avec léger maximum fin-décembre (RF, JDb, YT, HC) ; dates extrêmes 17 octobre et 7 avril (42) (CB).

— Verdier *Carduelis chloris* : très faible hivernage ; plus grosse troupe, environ 300 oiseaux, le 13 novembre en Dombes (YT). A la mi-avril dans les Gorges de l'Ardèche (CORA).

— Chardonneret *C. carduelis* : passage abondant en octobre-novembre à Valence (SM). Un couple et 3 jeunes au nourrissage le 14 septembre 1972 encore à St-Sorlin-d'Arves (73) (J. F. GONNET).

— Tarin des aulnes *C. spinus* : bon passage en fin octobre-novembre (YT, HC), mais faible hivernage ; derniers le 25 mars dans la Loire (JL).

— Linotte *C. cannabina* : en janvier à Valence (SM) et dans le Trièves (38) (MBv). Nicheuse à Roussillon (38) (GF) et au confluent de l'Ain (MBb, JLc).

— Sizerin *C. flammea* : les 13 novembre et 7 février en Dombes (MC, DA). Bien représenté en Tarentaise (PL, DM).

— Venturon *C. citrinella* : présent en belle saison dans le Vercors (MBv) et dans les Monts de la Madeleine (42) (CORA).

— Serin cini *C. serinus* : quelques hivernants à Villeurbanne-La Doua (MC, JL, BCo), Rive-de-Gier (42) (YT), Salaise-sur-Sanne (38) (JF) ; dès le 10 février à Grenoble (JDM).

— Beccroisé des sapins *Loxia curvirostra* : en octobre à Luriecq (42) (RF), à Sarcenas (38) (MBv), à Belmont-en-Valromey (HR) et au Col du Sac (01) (PRO). En belle saison à la Seauve-sur-Semène (43) (GPC), St-Romain-la-Chalm (43) (BB), le Pilat (JL), le Vercors (AR, MBv), en forêt de Merlone, Bugey (01) (PL).

— Bouvreuil *P. pyrrhula* : hivernage peu abondant, avec légère remontée en février (SM, YT, GF, MC, MBv, PL) ; un oiseau trouvé mort le 21 février dans la Loire, avait été bagué jeune en juillet 1969, en Westphalie, Allemagne de l'Ouest. Noté comme nicheur en plaine du Forez (RF, JL) et en Bugey (Lac Genin et plateau de Retord) (PL).

— Gros-Bec *C. coccythraustes* : hivernage assez faible (40 citations), mais assez régulier, derniers le 21 mars à St-Etienne (CORA) ; 7 reprises de bagues (dont 3 en Isère et 2 dans la Drôme), 6 en novembre-décembre, dont une provenant de Pologne, une d'Allemagne de l'Est, 2 d'Allemagne de l'Ouest, une d'Italie, une de Belgique. En belle saison à Limonest (69) (RFt).

MOINEAUX.

— Moineau domestique *Passer domesticus*.

— Moineau friquet *P. montanus* : le 18 juin à Chambles, Gorges de la Loire (PL).

— Moineau soulcie *Petronia petronia* : noté le 7 mai à Cervières (05) (MBv) ; présent en Haute-Maurienne (JL, PL) ; noté en belle saison à Luriecq, Monts du Forez (RF, JL) ; le 25 juillet à Pont-de-Lignon (43) (GPC).

— Niverolle *Montifringilla nivalis* : Vanoise (MR, BC, JL, DM).

ETOURNEAU.

— Etourneau *Sturnus vulgaris* : hivernage à Lyon un peu plus faible que l'année précédente (DA) ; un individu tué (sous le nom de Faisan !)

au début de décembre à Freterive (73) avait été bagué le 28 octobre 1971 au Col de Bretolet, Valais. Bonne nidification.

LORIENT.

— Loriot *O. oriolus* : premier le 29 avril en Forez (YT), le 30 à Vaulx (74), Albens (74) (BC) et Beynost (01) (MC).

CORVIDÉS.

— Geai *Garrulus glandarius* : faible hivernage. Nid de 6 œufs le 20 mai en Dombes (DA).

— Pie *P. pica* : 2 à plus de 1 000 mètres d'altitude le 24 octobre au Pilat (JL).

— Cassenoix *Nucifraga caryocatactes* : Vanoise (DM) et Chartreuse (DA).

— Crave *P. pyrrhacorax* : Vanoise (DM) ; en août en Dévoluy (MBv).

— Chocard *P. graculus* : près d'une centaine le 7 mai à Cervières (MBv) ; à la belle saison en Oisans, Chartreuse, Vercors, Vanoise (DA, MBv, PL).

— Choucas *Corvus monedula*.

— Corbeau freux *C. frugilegus* : un millier le 13 décembre à Rousillon (38) (GF). 18 couples nicheurs à Villeurbanne-La Doua (JL) ; quelques couples seulement à Chavanay (42) (RF) et destruction fin avril de la colonie de St-Alban-du-Rhône (38) (GF). Restes d'une douzaine de nids notés en octobre dans une peupleraie de Passieu-St-Romain (38) (PL).

— Corneille noire *C. corone*.

— Grand Corbeau *C. corax* : dans l'Ain, d'août à octobre à Belmont-en-Valromey (HR), en mars à Mijoux (PRo) et Champagnier (MBv).

En Haute-Savoie, en décembre au Plateau des Glières (GPC) et en février à Samoëns (JDm). En Savoie, en été en Vanoise (DM, PL), peu abondant toutefois. En Isère, à Grenoble en octobre (JDm), en février à Hières-sur-Amby (MBb), à la belle saison à Chichiliane et Corrençon, Vercors (MBv). Dans la Drôme, au Col de Bataille en mai (SM) et à Combe-Laval en juillet (MBv), Vercors ; en janvier-février à Rencurel (MBv). En Ardèche, le 27 mars à Cornas (JL) et le 26 avril à Lagorce (JG).

Rédaction : Philippe LEBRETON, Mireille RICHOUX
et Michel CZAJKOWSKI.

**COMPTE RENDU DE BAGUAGE
POUR L'ANNEE 1972
DANS LA REGION RHONE-ALPES ¹**

Dans les 9 départements du Centre Régional de Bagueage (Ain, Ardèche, Hautes-Alpes, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie), 15 681 oiseaux ont été bagués en 1972. La pose des bagues a été effectuée :

1. 10^e compte rendu ; précédent C. R., ce Bulletin (1973), 42, n^o 6, pp. 143-147.