

Abonnement 40 F

Le numéro 8 F

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUES DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc.

Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, 69006 Lyon

TRESORERIE :

Abonnement France	40 F
Membre scolaire	20 F
Abonnement Etranger	45 F
Changement d'adresse, inscription ou réintégration en sus	6 F

N.B. — Les virements à notre C.C.P. **LYON 101-98** ou les chèques bancaires, doivent être rédigés au nom de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON.

SOMMAIRE

BON M. — Agaricales rares ou nouvelles pour la région du Velay et ses environs ..	165
RAYNAUD P. — Stades larvaires de <i>Carabus (Xystrocarabus) catenulatus</i> Scp. (Coléoptères Carabidae)	181
VIETTE P. — Noctuelles trifides récoltées à Madagascar par le Dr Fred KEISER (Lep. Noctuidae)	184
LEBRETON Ph. — Compte rendu ornithologique annuel de l'automne 1972 à l'été 1973 dans la région Rhône-Alpes (suite)	187
DAVID L. — L'eau à Lyon, des Romains à demain	XVII
JOSSERAND M. — Deux légendes sans fondement : l'été de la Saint Martin et les saints de glace	XXVII

Athetis nitens (Saalmüller). — Nombreux exemplaires des deux sexes, Tananarive, 17 et 24-IV-1958, 1, 3, 7 et 18-IX-1958.

Athetis ignava (Guenée). — Nombreux exemplaires des deux sexes, Périnet, 7-IV-1958, 20 à 25, 29 et 30-IX-1958, 5-X-1958, 4-XII-1958. — Tananarive, 15, 18 et 24-IV-1958, 14-VII-1958, 7-IX-1958.

Elyptron cinctum Saalmüller. — Périnet, 1 ♀, 5-X-1958.

Elyptron berioi Viette. — Périnet, 1 ♀, 12-IV-1958.

Elyptron schröderi Viette. — Périnet, 2 ♀, 23-X-1957, 5-XII-1957.

Pseudelaeodes proteoides (Kenrick). — Périnet, 4 ♂, 11 et 13-IV-1958, 2-X-1958.

Sciomesa biluma Nye. — Ranomafana, 2 ♂, 1 ♀, 10 et 11-IX-1958. — Tananarive, 1 ♂, 1 ♀, 23-XII-1957, 28-VIII-1958.

Sesamia madagascariensis Saalmüller. — Périnet, 3 ♂, 7-X-1958.

Sesamia calamistis (Hampson). — Nosy be, Hellville, 1 ♀, 14-V-1958. — Tananarive, 1 ♂, 10-XII-1957.

Sesamia simplaria Rungs. — Tananarive, 2 ♂, 24-IV-1958.

Tathorhynchus homogyna malagasy Viette. — Ranomafana, 1 ♂, 13-IX-1958.

HELIOTHIDINAE (= MELICLEPTRIINAE)

Axyliia annularis Saalmüller. — Périnet, 12 ex., 4-XII-1957, 26, 27 et 28-IX-1958, 1 et 5-X-1958. — Manjakatempo, 2 ♀, 4-I-1958.

Heliothis (Helicoverpa) armigera (Hübner). — Tananarive, 2 ♀, 24-IV-1958 et 10-X-1958. — Manjakatempo, 1 ♀, 4-I-1958.

(Laboratoire d'Entomologie, Muséum national d'Histoire naturelle).

COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE ANNUEL DE L'AUTOMNE 1972 A L'ETE 1973 DANS LA REGION RHONE-ALPES

(suite).

LARIDÉS.

— Goéland marin *Larus marinus* : un oiseau de 2^e année le 31 juillet et le 8 août 1972 à Bussy, Forez (HB).

— Goéland argenté *L. argentatus* : peu d'hivernage ; un immature au Parc de la Tête-d'Or en novembre (MR, SHa) ; un à Grenoble le 15 novembre (JC), deux à Villars-les-Dombes le 3 décembre (PC) ; à Jonage, deux du 10 janvier au 28 février (GPC, RL) ; à l'embouchure de l'Ain en septembre (JLc) ; puis du 10 mars au 8 juillet (PL, MBb, GPC) mais sans nidification. Passage à Chasse-sur-Rhône (69) du 27 mars au 17 avril (MR) ; en avril-mai-juin, des immatures présents au Pouzin (07) (MR), Andance (07) (CS, JB, GF), Villars-les-Dombes (MC), Magneux-Haute-Rive (42) (JL), Talinges (74) (JD), Seyssel (73) (GPC) et Vaulx (74) (BC). En Dombes, 2 adultes le 4 avril à Balancet et un immature le 8 juillet à Joyeux ; nidification ? (PL, MC, PGE).

— Goéland cendré *L. canus* : en Forez, 3 immatures le 31 juillet 1972 (MC) et 1 le 13 janvier (RF) ; trois au Péage-de-Roussillon (38) (DM) le 31 octobre ;

un au Parc de la Tête d'Or le 9 novembre (MC) ; à Jonage un le 25 novembre (RL), deux les 13 et 28 janvier (MR, JL) et deux encore le 5 mars (GPC).

— Mouette mélanocéphale *L. melanocephalus* : un immature du 10 au 15 janvier à la Réserve de Dombes (MC, PC).

— Mouette rieuse *L. ridibundus* : hivernage régulier dans toute la région Rhône-Alpes, mais peu abondant ; maximum de 600 au Parc de la Tête d'Or le 14 janvier (JL), de 500 à la digue du Drac (38) le 17 janvier (JN), de 200 au Lac du Bourget le 2 décembre (GBo), de 150 à Feurs, Forez (RF). Toutes les petites colonies du Forez semblent en expansion (RF) ; environ 2 900 couples auraient niché en Dombes (GG, MC). Deux immatures bagués en Pologne en 1972 sont retrouvés (blessé) à La Voulte (07) et (mort) à Loyettes (01).

— Goéland railleur *L. genei* ; un adulte à la Réserve de Villars-les-Dombes le 28 avril (CORA), première citation régionale de cette espèce méditerranéenne.

— Mouette pygmée *L. minutus* : une le 2 septembre en Forez (YT). Une le 30 avril en Dombes (PR) ; à Jonage, une les 3, 11 et 13 mai (GPC) ; un immature le 5 mai en Forez (CORA).

— Guifette noire *Chlidonias niger* : en Forez, trois le 16 septembre (RF). Deux le 28 avril en Dombes (MR) ; 4 à St-Bonnet (38) (SH) le 1^{er} mai ; du 3 mai au 8 juin, 30 à 40 individus à Jonage (GPC). En Forez, présente du 5 mai au 17 juin (HC, PL) et une encore le 1^{er} juillet à Montverdun (RF).

— Guifette moustac *Ch. hybrida* : des jeunes au nourrissage le 3 septembre 1972 encore à Villars-les-Dombes (MC). Arrivée le 10 avril en Dombes (PC). A semblé assez peu abondante sur les lieux de nidification en Dombes (DA) ; une quinzaine de couples seulement en Forez (RF).

— Guifette leucoptère *Ch. leucopterus* : à St-Rambert, Forez, 4 le 16 mai et deux adultes et un immature en plumage d'hiver le 1^{er} juin (RF). Une le 10 et 11 juin à Annecy (74) (MBm).

— Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : trois le 29 mai et une le 4 juin à Jonage (GPC) ; à l'embouchure de l'Ain, une les 13 et 16 mai (MC), et le 8 juillet (PL, MC, PGe).

COLUMBIDÉS.

— Pigeon colombin *Columba oenas* : quelques cas d'hivernage en Dombes, les 17 (RL, MC), et 31 décembre (MC). Retour le 1^{er} mars dans les gorges de l'Ardèche (CS, JB).

— Pigeon ramier *C. palumbus* : gros passage dès le 1^{er} octobre en Dombes (MC) et dès le 4 dans les Monts du Forez (RF). Hivernants à Beynost (01) (MC) et à Marlieux, Dombes (MC, RL) les 15 et 17 décembre. Passage de retour dès le 25 février en Dombes (GBo), le 6 mars dans les Monts du Forez (RF) ; maximum dans la première quinzaine de mars en Dombes (MC) et à Jonage (FA).

— Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* : dernière le 28 septembre en Dombes (MC). Premières les 31 mars en Dombes (PR), le 16 avril à Clonas-sur-Varèze (38) (RE), le 22 à Optevoz-sur-Amby (38) (JL), le 25 en Forez (PG).

— Tourterelle turque *S. decaocto* : présente en hiver à Feurs (42) (JL), Roanne (42) (PG). A la belle saison, s'installe dans l'ouest de St-Etienne (GT), présente à Montbrison (42) (JN) ; notée en mai à Montélimar (26) (PL).

Coucou.

— Coucou gris *Cuculus canorus* : un (tué !) le 20 septembre en Dombes (PC). Retour très précoce dès le 21 mars à Pizanon (26) (RL), puis le 4 avril à Versoud

(38) (AD) et à Balan (01) (FA), le 6 à Craponne (69) (BCo), le 8 à St-Martin-le-Vinoux (38) (FS) et Clonas-sur-Varèze (38) (JG).

RAPACES NOCTURNES.

- Hibou Grand-Duc *B. bubo* : noté assez fréquemment en Ardèche (CORA).
- Hibou Moyen-Duc *Asio otus* : un dortoir d'une trentaine d'individus le 2 janvier en Dombes (GPC, MC). Noté nicheur dans les Monts du Lyonnais (HC). La nidification aurait été peu abondante cette année : une seule observation en mai en Forez (MR). Un nid et trois jeunes à Ste-Hélène-sur-Isère (73) (MBm).
- Hibou des marais *A. flammeus* : un trouvé mort à Ste-Sigolène (43) (GPC). Un le 2 janvier à Verdevant (74) (JD) ; un (probable) au confluent de l'Ain le 14 avril (MBb). Un nid avec 5 jeunes le 16 mai en Dombes (V. DUPONT, Anvers).
- Hibou Petit-duc *Otus scops* : chanteurs notés le 17 avril (JC) et le 29 mai en Dombes (MBv), le 5 juin à Claix (38) (JC) ; chanteurs dans quatre stations d'Ardèche (AR, SM, JN) ; à Beaufort-sur-Gervanne (26) (RM, BC), Pont-de-Basset (26) (MBv) et Châtillon-en-Diois (26) (MBv) ; également à Chaspinac (43) (HC) et à La Boisse (01) (MC, PL).
- Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* : une le 13 mai sur le plateau de Sornin (Vercors Nord) (38) (JC). Chant le 27 mars vers Chambéry (73) (MBm) ; un le 16 et 21 septembre au col de Chérel (Bauges) (73) (MBm). Un individu bagué le 9 août 1972 à Bretolet est contrôlé le 24 août à la Golèze.
- Chouette chevêche *Athene noctua*.
- Chouette hulotte *Strix aluco* : deux jeunes bagués en 67 et 71 en Suisse sont trouvés morts en Haute-Savoie, respectivement en mai 73 et août 72.
- Chouette effraie *Tyto alba* : notée dans le Pilat le 19 décembre à Pélussin (42) (MR), le 14 février à Véranne (42) (P. BERTON) et le 19 juin à Ste-Croix-en-Jarez (42) (YT). Deux individus bagués en 1972 en République Fédérale Allemande sont trouvés morts à Belleville-sur-Saône (69) et Bourg-en-Bresse (01), en janvier et février 1973.

ENGOULEVENT.

— Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* : un le 6 mai à Valeilles, Forez (PG), le 13 au Pertuiset (42) (JL) et le 17 à Pont-de-Bareys (26) (MBv) ; en juin, noté à Miribel (01) (GPC), Peyraud (07) (CS, DM, JB), St-Remèze (07) (JF, RV) et Engins (38) (JC). Nicheur à Chavanay (42) (renseignement local, MR), aux Iles du Méant (01) (MC) et dans les gorges Sud de la Loire (RF) ; le 9 août à La Bégude-de-Mazenc (26) (PL).

MARTINETS.

— Martinet noir *A. apus* : derniers le 31 août à Roussillon (38) (JB) et Sorbier (42) (HC). Retour le 20 avril à Miribel (01) (MC), le 21 dans les gorges de l'Ardèche (MR), le 25 en Dombes (PC).

— Martinet alpin *A. melba* : vol migrateur le 22 avril en Dombes (DA). En Haute-Savoie, le 2 mars, puis à la belle saison dans la vallée du Giffre (JD, PL). En Savoie, quelques observations de Maurienne et de Tarentaise (MR, JC, MBm). En Isère, le 7 avril à Grenoble (JC) et à la belle saison en Vercors (JC, MBv, BC). Dans la Drôme, le 12 avril à Vercheny (MBv), en juin à Saoû (PRe, SM) et Romeyer (MBP). En Ardèche, dès le 19 mars (AR), le 13 avril aux Fonds-du-Pouzin (DM) et nombreux le 2 juillet à St-Martin-de-Valamas (YT).

MARTIN-PÊCHEUR.

— Martin-pêcheur *Alcedo atthis* : assez gros passage à la fin septembre/début octobre à l'embouchure de l'Ain et à Jonage (JLc, GPC, MBb). Quelques hivernants, le 23 décembre à Tanninges (74) (JD), le 24 à Clonas-sur-Varèze (38) (GF), le 10 (RL) et le 13 janvier (JL) à Jonage, le 14 à Paladru (GBo), le 16 à Jons (01) (FA), le 21 à Menthon-St-Bernard (74) (BC). Retour à la mi-mars à l'embouchure de l'Ain (MBb, AD), et à la mi-avril en Haute-Savoie (JD). Un jeune bagué en août 1972 en Tchécoslovaquie est trouvé mort à Voreppe (38) en septembre.

GUÉPIER.

— Guépier d'Europe *Merops apiaster* : le 12 mai à Vallaurie (26) (SM), le 15 à Châteauneuf-d'Isère et St-Montant (07) (RV). Noté surtout en Ardèche : vallée de l'Ibie (SM, PRe, GOVR), Lanas (RV, JF), Vals (GOVR) et Peyraud (GOVR). Un au Péage-de-Roussillon (38) (GF) le 3 juin ; au moins deux le 11 juin à Sablonnières (PL) et quelques-uns début juillet à Morestel, Ile Crémieu (DA).

ROLLIER.

— Rollier d'Europe *Coracias graculus* : un le 18 juin à Voreppe (38) (GBo), trois au début juillet à Morestel, Ile Crémieu (DA), et un à La Roche-Percée (07) le 9 juillet (CS, JB, DM).

HUPPE.

— Huppe fasciée *Upupa epops* : arrivée dès le 23 mars à Auberives-sur-Varèze (38) (RE), le 25 à St-Etienne-de-St-Geoirs (38) (JD), le 26 à Chasse-sur-Rhône (38) (MR), le 28 à l'embouchure de l'Ain (FA) ; a semblé peu abondante cette année (CORA).

PICS.

— Pic vert *Picus viridis*.

— Pic cendré *P. canus* : un le 4 octobre en Dombes (MC) ; chant à Izieu (01) (MBm) le 11 avril.

— Pic noir *Dryocopus martius* : en septembre et décembre à Vaulx (74) (BC). Présent dans les Monts du Forez et St-Maurice-en-Gourgeois (42) en mars-avril-mai (RF, HC, MR) ; nombreux sur les hauts-plateaux du Vercors (MBv) ; présent en Belledonne (MBm) et Tarentaise (MR) ; nidification le 25 mai à Champfromier (01) (PRo).

— Pic épeiche *Dendrocopos major*.

— Pic épeichette *D. minor* : assez nombreux dans les lônes du Rhône vers Le Péage-de-Roussillon (GOVR) ; noté à Vercheny (26) (MBv), Charols (26) (SM), Sallèles (26) (JF, RV).

— Pic tridactyle *Picoides tridactylus* : un mâle le 29 août 1972 à Sixt et le 24 juillet 1973 à Samoëns (74) (JD).

— Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : premiers, précoces, les 21 et 23 mars à Pizanon (26) (RL) ; puis le 5 avril à St-Chamond (42) (HB), le 7 à Albertville (73) (MBm), le 8 à Clonas-sur-Varèze (38) (GF, JG).

ALOUETTES.

— Cochevis huppé *Galerida cristata* : chant le 13 mai à Verclaux (26) (SM).

— Alouette lulu *Lullula arborea* : passage peu abondant le 3 mars à Rive-de-Gier (42) (YT), Thurins (69) (GBo) et le 17 mars au confluent de l'Ain (MBb). Chante le 3 juin à Félines (07) (JB, CS) ; en mai dans les gorges de la Loire (PL) ;

en juin dans l'Île Crémieu (PL), en juillet à Roche-en-Régnier et Tiranges (43) (HC).

— Alouette des champs *Alauda arvensis* : hivernage normal dans l'ensemble de la région Rhône-Alpes (CORA). Chante le 8 février à Assieu (38) (DM, JB), le 3 mars à Rive-de-Gier (42) (YT), le 4 en Valbonne (MBv).

HIRONDELLES.

— Hirondelle de rivage *R. riparia* : fort passage fin août en Dombes (MC) et en Forez (RF). Retour le 28 mars à Grenoble (38) (JD). Nicheuse à Bas-en-Basset (43) (RF), Veauchette (42) (HC), Hyères-sur-Amby (38) (BCo), Andance (38) (DM, JB) ; deux colonies en nidification détruites sur les îles du Rhône (MC).

— Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* : présente de novembre à février dans les gorges de l'Ardèche (GOVR) ; une vingtaine le 11 mars au Pouzin (07) (JL) ; deux le 1^{er} avril à Monteynard (38) (JD), le 3 à Chambéry (73) (MBm), le 5 à Grenoble (38) (MBv), le 7 à Saoû (26) (BC). Une le 16 avril à Notre-Dame-de-Commiers (38) (JC), dix le 23 au Val-de-Fier (74) (BC). Présente en mai dans les gorges de l'Amayon (26) (SM), en juin dans la vallée du Janon (42) (HC) et à Magland (74) (PL), en juillet dans la vallée du Doux (07) (MR). Bonne nidification en Haute-Loire et dans les gorges S. de la Loire (CORA). Une dizaine de nids à Val d'Isère (73) le 1^{er} août (MC) ; 5 nids le 12 août à Pralognan (73) (MBm).

— Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* : dernières le 23 octobre à Villars-les-Dombes (PC) et le 2 novembre à Duingt (74) (MBm). Premières, précoces, le 11 mars à Craponne (69) et Lapeyrouse (01) (DA), le 14 à Neyron (01) (FA), le 15 à Feurs (RF).

— Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* : jeunes nourris au nid le 18 septembre encore en Dombes (PL) ; dernière le 12 octobre à Grenoble (38) (JC). Premières le 1^{er} avril au col de Grenouze (42) (MR), le gros des troupes le 12 à St-Fons (69) (DA), le 15 à Pact (38) (JG), dans les bras-morts de l'Isère vers Grenoble (38) (JN) et Taninges (74) (JD). Colonies en Chartreuse (100 couples), dans les gorges de la Chaillac (30 à 50 couples), en Valgaudemar (100 couples) (DA) ; dans le secteur de Bellegarde (01) (75 couples) (PRo).

MOTACILLIDÉS.

— Pipit rousseline *Anthus campestris* : un au col de Millet à Vals (07) (DM) le 31 mai, un le 23 juin près de Laval (07) (PL) ; nicheur confirmé en Valbonne (MC, PGe, PL).

— Pipit des arbres *A. trivialis* : derniers le 15 octobre à Engins (38) (JC). Retour dès le 22 mars à La Roche-de-Rame (05) (JN), le 31 mars à Haute-Jarrie (38) (DM), le 1^{er} avril à St-Pierre-d'Albigny (73) (MBm). Nicheur probable dans la vallée du Rhône à Peyraud (07) (GF).

— Pipit farlouse *A. pratensis* : hivernant en plaine du 5 octobre (MC) au 10 avril (GF). Noté à la mi-juin dans les Monts du Forez (JN, RF, PL).

— Pipit spioncelle *A. spinoletta* : encore présent en Dombes le 18 avril (MC, HT). De novembre à mars, petits dortoirs dans les marais de Veynes (05) (BCa). Nicheur dans les Monts du Forez (RF, PL).

— Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : gros passage en Dombes à la mi-août (PC) ; une le 17 novembre encore à Fontanil (69) (GPC). Très précocce le 5 mars à St-Fons (69) (MBb) ; le 13 avril, deux individus *M. f. flavissima* à Marlieux, Dombes (MC). Une le 26 mai dans la vallée du Guiers-Mort (Chartreuse) (DA).

— Bergeronnette grise *M. alba* : gros passage en Dombes début octobre (PC, PH) ; une à Beynost (01) le 19 décembre (MC). Passage de retour vers le 9 mars à Chasse-sur-Rhône (38) (MR), le 8 en Forez (RF), le 18 en Dombes (RL), les 24 et 25 en Chautagne (BC, MBm).

— Bergeronnette des ruisseaux *M. cinerea* : des hivernantes dans la vallée du Rhône (GF, MR), Taninges (74) (JD), Jonage (JL, MC, RL, GPC), aux lacs d'Aiguebelette (GBo), du Bourget (GBo), et d'Annecy (BC). Nicheuse dans les Monts du Forez (PL). Un mâle bagué en 1970 en République Démocratique Allemande est contrôlé à St-Alban-du-Rhône (38) en 1973.

PIES-GRIÈCHES.

— Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : première le 10 mai à Birieux, Dombes (SHA). Très bonne densité dans les gorges S. de la Loire (RF, GPC).

— Pie-grièche à tête rousse *L. senator* : première le 29 avril à Brujas (07) (SM, PRe), le 5 mai à Pressière (42) (MR), le 6 au marais du Grand-Plan (38) (MBb). Nicheuse à Chaspinac (43) (RF, HC), Gilly-sur-Isère (38) (MBm) ; notée dans la vallée de l'Ay (07) (GOVR) et à Bas-en-Basset (43) (GPC).

— Pie-grièche grise *L. excubitor* : hivernage régulier dans la région Rhône-Alpes, essentiellement en Dombes et en Forez (COR). Chant le 17 décembre dans les gorges de l'Ardèche (GOVR) et le 27 janvier à St-Marcellin-en-Forez (42) (RF). Un immature bagué en 1972 en Pologne est tué à Montaud (38).

CINCLE.

— Cincle *C. cinclus* : hivernant à Ville-sous-Anjou (38) (GF), Taninges (74) (JD), Vizille (38) (JC), aux lacs du Bourget et d'Annecy (GBo) et dans les gorges de l'Ardèche (GOVR). A la belle saison, présent sur l'Arve (RLK), le Guiers-Mort (DA), le Giffre (74) (JD), la Semène (43) (GPC), dans les gorges de Peyredère (43) (HC, RF), l'Ardèche (DA, JF, RV), l'Ayguës (26) (SM) ; également dans le Pilat (MR, HC), l'Oisans (GOVR), le Vercors-Nord (JC), le Valgaudemar (DA), le Dévoluy (PL) et la Maurienne (MBm).

TROGLODYTE.

— Troglodyte mignon *T. troglodytes* : bonne densité en nidification (COR).

ACCENTEURS.

— Accenteur alpin *Prunella collaris* : une vingtaine le 4 octobre à St-Sorlin-d'Arves (73) (JFG) ; présent dans les gorges de l'Ardèche à la mi-novembre puis les 10, 17 et 27 décembre ; bon passage de retour du 27 février au 16 mars avec un maximum de 25 le 1^{er} mars (GOVR). Deux le 14 novembre au col Vert (Vercors) (PGr) et trois le 15 février à Hières-sur-Amby (38) (MBb). A la belle saison dans le Dévoluy (MBv), le Vercors (MBv), les Bauges (MBm), la Maurienne et la Tarentaise (MR).

— Accenteur mouchet *P. modularis* : très peu d'hivernants, en décembre à Roussillon (38) (GF), en janvier-février à Pélussin (42) (MR), Sinard (38) (GBo) et Beynost (01) (MC). Chant dans les gorges S. de la Loire le 30 avril (RF, JL).

(à suivre).