

УГАМ-ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И ЧАТКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОСФЕРНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
5 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
СУРКАМ

ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

31 августа-2 сентября 2005

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПО ИЗУЧЕНИЮ СУРКОВ

ТАШКЕНТ, 2005

5 Международная конференция по Суркам. Тезисы докладов. Ташкент, Узбекистан, 31 августа-2 сентября 2005 г. – Ташкент, 2005. 134 с.

В сборник вошли тезисы докладов по различным направлениям исследований, отражающих современные тенденции в изучении рода *Marmota*. Представленные работы посвящены исследованиям в области экологии, систематики, филогении, палеоэкологии, этологии, морфологии, физиологии, паразитологии, эпидемиологии, акклиматизации и разведения сурков в неволе, а так же охраны и управления природными популяциями сурков.

Сборник предназначен для широкого круга специалистов - зоологов и экологов, сотрудников природоохранных организаций, студентов и др.

Редакционная коллегия:

Быкова Е.А.

Есипов А.В.

Вашетко Э.В.

Экологическая Издательская Компания
«Чинор ЭНК»

Подписано в печать 26.08.2005

Объем 9 печатных листов

Заказ №98 от 09.08.05

Формат 60x84 1/16

Печать офсетная, тираж 100 шт.

Отпечатано в типографии ЧП «Федоренко»

Ул.Фархадская 10А тел.: 50-03-80

СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРАСНОГО СУРКА В УЗБЕКИСТАНЕ

Быкова Е.А.¹, Есипов А.В.²

¹Институт зоологии АН РУз, Ташкент, Узбекистан; ²Чаткальский биосферный государственный заповедник, Паркент, Узбекистан, esip@tkt.uz

В Узбекистане красный сурок (*Marmota caudata* Geoffroy, 1892) обитает в двух изолированных областях – на Западном Тянь-Шане и Памиро-Алае. В Западном Тянь-Шане находится восточная и северо-восточная граница распространения сурка, включающая Пскемский, Угамский и Майдантальский хребты (р. Майдантал, Бодаксай, Чаралма, бассейн р. Ойгаинг), а так же южные склоны Чаткальского хребта обращенные в Ферганскую долину, (Салдырмасай, Чаначсай, Нанай). Красный сурок найден так же в окрестностях пос. Сох, на северных склонах Алайского хребта Ферганской долины. В Памиро-Алайской части ареала красный сурок распространен в западных отрогах Гиссарского хребта по рекам Кызылдарья, Танхаздарья, Аксу, Тамшуш, Сангардак, Хандиза. В прошлом встречался на Байсунтау, в настоящее время информация по этому району требует подтверждения. Ареал красного сурка в Западном Тянь-Шане последнее десятилетие расширяется. Нижняя граница распространения сдвинулась более, чем на 10 км. В 2002 г. расселяющиеся сурки были зафиксированы в непосредственной близости от гидропоста Майдантал, ур. Каранги-тугай (1414 м над ур. м.). Весной 2003 г. нами был отмечен сурок на левобережье Пскема на рекордно низкой высоте 1377 м над ур. м. В 1985-90 гг. нижняя граница проходила в районе устья р. Бештор, приток Ойгаинга, 1800 м над ур. м. Кроме того, постоянно живущие сурки отмечаются на левобережье р. Чоралма в районе ее впадения в р. Ойгаинг. На Памиро-Алае ареал красного сурка сокращается. Нижняя граница расселения вида зафиксирована в среднем течение р. Кызылдарьи на высоте 2000 м над ур.м. За последнее десятилетие он исчез в верховьях рр. Джиндыдарьи, Игрису и Каласая. В 1992 г. нами обследовались поселения красного сурка на левобережье р. Каласай, 3500 м над ур. м. (Вашетко и др., 1996). Данная территория интенсивно использовалась под выпас домашнего скота. Мы могли наблюдать за передвижением отар овец, находили потерянные капканы у нор и многочисленные охотничьи скрадки из камней. К настоящему времени сурок на этом участке, так же как и в верховьях Игрису полностью истреблен вплоть до границ Гиссарского заповедника и водораздельного гребня между Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областями. Здесь сохранились лишь нежилые обвалившиеся норы красного сурка, хорошо заметные по сохранившимся бутанам.