

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

## SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

Reconnue d'utilité publique par décret du 9 août 1937.

Secrétaire général : M. le Dr BONNAMOUR, 40, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises. . . . .	25 francs
	Étranger. . . . .	50 —

MULTA PAUCIS Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

## PARTIE ADMINISTRATIVE

## ORDRES DU JOUR

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Samedi 11 Novembre, à 16 heures.

- 1<sup>o</sup> Question de bureau.
- 2<sup>o</sup> Questions diverses.

## SÉANCE GÉNÉRALE

Séance du Samedi 18 Novembre, à 16 heures.

- 1<sup>o</sup> M. QUENEY. — Présentation de quelques Centaurées d'Algérie.
- 2<sup>o</sup> M. NIOLLE. — Note critique sur *Cortinarius traganus*, sa variété *finitimus*, *Cortinarius hircinus* et *Cort. amethystinus*.
- 3<sup>o</sup> M. SCHAEFER. — Notes de chasse pour 1939 (Coléoptères) (*présentation d'insectes*).
- 4<sup>o</sup> M. TESTOUT. — Sur les Saturnides de l'Afrique équatoriale française ; description d'une forme nouvelle.

## DONS

M <sup>lle</sup> ROUSSET, Le Bois d'Oingt. . . . .	10 fr.
QUANTIN, Luxeuil. . . . .	25 »
BATAILLE, Besançon. . . . .	25 »
MOURGUE, Marseille. . . . .	25 »
BATTETA, Bron. . . . .	25 »
GRANGE, Lyon. . . . .	25 »
	135 fr.

Souscription pour l'épidiascope (*suite*).

GRANGE, Lyon. . . . .	25 fr.
QUENEY. . . . .	25 »
BARBEZAT, Bourgoin. . . . .	10 »
	60 fr.

Souscription pour l'achat des *Icones Selectae Fungorum* (*suite* 4).

M. CAUDY, Lyon, 15 fr. ; M. BOUVARD Jean, Lyon, 40 fr. Total à ce jour : 1.070 fr.

**Cryptocephalus Mayeti** Mars.

J'ai obtenu plusieurs individus de cette rare espèce en battant des *Pinus Salzmanni* atteints par l'incendie, aux environs de Saint-Guilhem-le-Désert.

---

ÉTUDES LÉPIDOPTÉROLOGIQUES (VI)<sup>1</sup>

**Nouvelles formes françaises de Géomètres.**

Par Henri TESTOUT (Lyon).

**1. Anaitis plagiata** L. ab. **bifasciata** nova.

Mêmes dessins que la forme typique, mais l'espace compris entre la première ligne basilaire et la bande antémédiane est brun, ne laissant qu'un petit espace clair à la base de l'aile. La bande postmédiane est aussi élargie d'une zone de la même teinte brune, jusqu'à la ligne claire submarginale.

Cette forme a été figurée sans être nommée, par M. VASSAL (*Bull. Soc. Linn. Lyon*, V, 1936, (3), p. 38, fig. 8) d'après un seul exemplaire de sa collection<sup>2</sup>.

Elle est bien caractérisée et différente des ab. *fasciata* Garbomski et *tangens* Fritsch, qui consistent dans la réunion des deux bandes au milieu du disque et qui d'ailleurs ne sont pas rares dans la nature.

**2. Boarmia occitanaria** Dup. ab. **marini** nova.

Diffère de la forme typique par la disparition presque complète des lignes sur le disque. En outre, aux ailes antérieures la partie basale et toute l'aire marginale sont chargées d'un semis d'atomes brunâtres, formant un obscurcissement marqué. Aux ailes postérieures, ce même semis plus clair est répandu sur toute la surface et va en augmentant à mesure qu'il se rapproche de la ligne antémarginale.

Holotype : 1 ex. ♂, La Voulte-sur-Rhône (Ardèche) Collection MARIN.

La forme typique est commune dans la région de La Voulte. Cette aberration diffère de la ssp. *submelanaria* décrite par ZERNY, de la région d'Algésiras en Espagne (*Eos*, 3, 1927, p. 422, pl. 10, fig. 30-31), qui est caractérisée par de fortes lignes noires transversales et aussi de *melanaria* décrite de Géryville (Algérie) par OBERTHÜR.

Nous dédions cette aberration à la mémoire de Georges MARIN<sup>3</sup>.

---

1. Voir V, in *Bull. Soc. Linn. Lyon*, VIII, 1939 (1), p. 12.

2. Il y a lieu de rectifier dans la légende de cette planche, le nom de *fasciata* indiqué pour la figure 7, c'est l'ab. *tangens* qui est représentée.

3. Elle sera figurée ultérieurement.