

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE
DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832
RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE
PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

*Natura maxime miranda
in minimis.*

ANNÉE 1913



PARIS
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES
28, Rue Serpente, 28

Brésil : Espirito Santo (coll. Pic).

Diffère du précédent par la forme plus étroite, la coloration plus claire, les impressions basales du prothorax et la sculpture des élytres.

Description d'un *Oxypoda* nouveau de France

(COL. STAPHYLINIDAE)

par J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE.

Oxypoda (s. str.) **Falcozi**, n. sp. — *O. longipedi* Muls. et Rey affinis et simillima; ab eadem statura evidenter crassiore antennisque multo brevioribus optime distinguenda. — Long. 4,5 mill.

Patria: Alpes Galliae, in *Arctomyos alpini* nidis subterraneis.

Extrêmement voisin des *O. vittata* Märk. et *longipes* Muls. et Rey, ce nouveau Staphylinide est identique à la dernière de ces deux espèces pour la conformation des tarses postérieurs. Il s'en rapproche assez pour qu'il soit superflu d'en donner une description complète.

Examiné de côté, l'*O. Falcozi* est beaucoup moins aplati que le *longipes*; son épaisseur égale à peu près celle de l'*Aleochara puberula* Klug, avec lequel il présente une ressemblance superficielle. Comparées à celles de l'*O. longipes*, les antennes sont beaucoup plus courtes et plus épaisses; les 2^e et 3^e articles sont égaux, les 4^e et 5^e obconiques et à peu près aussi longs que leur largeur moyenne, les suivants jusqu'au 10^e franchement transverses; le dernier article n'est pas comprimé. Le pronotum est proportionnellement plus grand et plus brillant, les élytres un peu plus courts; l'abdomen, sensiblement moins atténué vers l'extrémité, est un peu plus brillant.

L'*O. Falcozi* a été découvert par notre collègue M. FALCOZ, de Vienne (Isère), en examinant de la litière recueillie au fond des terriers de la Marmotte des Alpes (*Arctomyos alpinus* L.) et provenant des environs de Briançon (H^{tes}-Alpes) (1).

(1) On sait que l'espèce la plus voisine, *O. longipes* Muls. et Rey, vit à peu près exclusivement dans les nids de taupes. Les *O. vittata* Märk. et *O. spectabilis* Märk., plus éclectiques, ont été à la fois observés dans les fourmières, les nids souterrains de Guêpes et de Bourdons, des terriers de lapins, etc.

part soit directement, soit par correspondance; dans ce dernier cas l'enveloppe fermée contenant le bulletin de vote et signée très lisiblement par le Sociétaire de qui elle émane devra parvenir entre les mains du Président, au plus tard le 14 mai à 8 h. 1/2 du soir.

Erratum. — Par suite d'une transposition typographique la légende de la figure 2 de la note de M. J. CHATANAY in *Bull. Soc. ent. Fr.* [1913], p. 115 est erronée, il faut lire :

Fig. 2. — Menton.

1. *Mesomorphus villiger* Blanch.
2. *Gonocephalum micans* Germ.

Observations diverses.

Rectification. — M. J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE présente la rectification suivante :

Dans l'un des derniers *Bulletins* (n° 5, p. 134), j'ai, par suite d'un lapsus regrettable, attribué à la Marmotte des Alpes le nom scientifique d'*Arctomys alpinus*. C'est *Arctomys marmotta* qu'il faut lire.

A ce sujet, je signale à la Société que les terriers de l'autre espèce européenne, la Marmotte des steppes (*Arctomys bobac* Schreb.), ont été depuis longtemps l'objet des investigations des naturalistes russes. Ils abritent notamment un Coléoptère des plus intéressants, l'*Aphodius rotundangulus* Reitt. — Cf. A. SEMENOV in *Rev. Russe d'Entomologie*, V [1905], p. 133.

Note de Synonymie [COL. PHYTOPHAGA]. — M. J. ACHARD signale que *Chlamys insularis* Jacoby, originaire de l'île de Haïti et décrit en 1901 (*Proc. zool. Soc. Lond.*, 1901, I, p. 157), est une espèce différente de *Chlamys insularis* Jacoby, du Mexique, décrit en 1881 (*Biol. Centr. Amer.*, Col., VI, 1, p. 78, tab. 5, fig. 12) et dont une variété existe à Panama (JACOBY, 1889, l. cit., suppl., p. 158, tab. 39, fig. 19). L'espèce haïtienne prendra le nom de **Chlamys Jacobyi**, nov. nom.
