

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937  
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES  
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

**Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)**

Trésorier : M. P. OMISOS, 9, cours du Docteur-Long, Lyon (3<sup>e</sup>)

---

**ABONNEMENT ANNUEL** : France et Colonies Françaises .. 9 N.F. — C.C.P. Lyon 101-98  
Etranger .. .. . 10 N.F.  
Scolaires .. .. . 4,50 N.F.

---

**COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE SEMESTRIEL.  
DONNEES SUR LA MIGRATION PRENUPTIALE  
ET LA SAISON DE NIDIFICATION EN 1960  
DANS LA GRANDE REGION LYONNAISE.**

(suite)

CANARDS de surface.

Le retour des Anatidés a été massif à la fin-février, en Dombes.

— C. colvert *Anas platyrhynchos* : premières pontes (8 et 11 œufs) le 27-3 en Dombes. Le 15-5, nid de 13 œufs à Charnoz, bords de l'Ain (S. d.G.).

— Sarcelle d'hiver *A. crecca* : encore abondante dans le Forez le 1-5, où une troupe de 35 ind. (20 ♂ et 15 ♀) est observée (R.K., P.L.).

— Sarcelle d'été *A. querquedula*.

— C. chipeau *A. strepera* : ponte assez abondante et précoce de 13 œufs, le 1-5 en Forez (R.K.).

— C. souchet *Spatula clypeata* : nicheur en Forez (R.K.).

CANARDS plongeurs.

— Nette rousse *Netta rufina* : semble particulièrement bien représentée en Forez, apparemment le plus abondant des Anatidés nicheurs après le Milouin (P.L., R.K.).

— Fuligule milouin *Aythya ferina* : Forez. Dombes : le 17-7, près de Sandrans, une ♀ avec 6 jeunes au tiers seulement de la taille ad. (P.L.).

RAPACES DIURNES.

— Buse variable *Buteo buteo*.

— Milan royal *Milvus milvus* : un migrateur le 14-4, près de Valence, bords du Rhône (P.L., S.M.).

— Milan noir *Milvus migrans* : premier migrateur le 11-3 à Valence (S.M.), et le 18-3 à Lyon (P.L.) ; abondant autour de Lyon le 20-3 (Ternay, bords du Rhône, peu au Sud de Lyon, et Dombes) (S.d.G.). L'espèce nous a paru remarquablement abondante tout ce printemps et cet été en Dombes, par rapport aux deux années précédentes (P.L.).

— Bondrée apivore *Pernis apivorus* : quelques individus en migration le 15-5, le long de l'Ain, à Charnoz (P.L.).

— Busard des roseaux *Circus aeruginosus* : un ♂ le 11-3 près du Rhône, à Valence, et 8 ♂ le 18, harcelés par des Corneilles (S.M.).

— Busard cendré *C. pygargus* : le 10-7, en Forez, deux nids sont trouvés à 100 m de distance : l'un avec deux jeunes aux 4/5 de la taille ad., l'autre avec deux pull. aux 2/5 de la taille ad. plus un œuf stérile (S.d.G.).

— Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* : Forez et Dombes en juillet.

— Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* : un migrateur observé le 1-5 en Forez. (P.L.).

— Faucon hobereau *Falco subbuteo* : 3 individus (avec jeux nuptiaux), le 15-5 à Charnoz (S.d.G.) ; une observation le 19-6 en Forez (P. L.).

— Faucon crécerelle *F. tinnunculus*.

GALLINACÉS.

— Caille des blés *Coturnix coturnix* : premiers chants le 7-5 en Dombes (P.L., H.T.).

RALLIDÉS.

- Râle d'eau *Rallus aquaticus*.
- Poule d'eau *Gallinula chloropus*.
- Foulque macroule *Fulica atra*.

OUTARDES.

— Outarde canepetière *Otis tetrax* : près de Montrond (Forez), une ♀ est levée au même endroit les 22 et 26-5, ce qui implique une très probable nidification. (R.K., P.L.).

LIMICOLES.

- Vanneau huppé *Vanellus vanellus*.
- Petit Gravelot *Charadrius dubius* : 2-3 individus à comportement local à Charnoz le 15-5 (S.d.G.).
- Bécassine des marais *Capella gallinago* : passage en Dombes de la mi-mars au 24-4 (P.L., A.C.) ; encore fréquente le 1-5 en Forez et quelques-unes le 7-5 près de Villars-les-Dombes, date tardive (2).
- Bécassine sourde *Limnocyptes minimus* : quelques observations le 27-3 en Dombes (A.C., P.L.).
- Courlis cendré *Numenius arquata* : nidification en Forez, inédite d'après les données de la récente mise au point G.J.O. (6) ; près de Montrond, le 22-5, 2 couples à comportement de nicheurs et nid avec coquilles de 2 œufs éclos (R.K., P.L.).
- Barge à queue noire *Limosa limosa* : passage particulièrement précoce et abondant (2) en Dombes : 200 à Balancet et 85 près de Versailles le 27-2 ; 20 le 28-2 près de Marlieux ; près de 300 au total le 20-3 en Dombes et 7, encore des migrateurs apparemment, le 24-4 à Dompierre (P.L.).

La population nidificatrice semble par contre se raréfier (2) : un couple seulement, avec vol et chant nuptiaux, le 7-5 à Birieux-Montcroissant (P.L., H.T.).

- Chevalier sylvain *Tringa glareola* : les 7 et 8-5 en Dombes (P.L.).
- Chevalier guignette *Tringa hypoleucos* : le 7-5 en Dombes (P.L.).
- Chevalier gambette *Tringa totanus* : du 27-3 en Dombes au 26-5 en Forez.

ECHASSE.

— Echasse blanche *Himantopus himantopus* : premier migrateur, précoce, le 27-3 en Dombes (A.C.). Les effectifs nicheurs ont paru assez peu abondants ce printemps en Dombes : par exemple, au groupe d'étangs du Grand Bataillard (2), 2-3 couples seulement ; deux pull. à mi-croissance sont trouvés le 23-7 (P.L.). Petite colonie de 7-8 couples à début juin, près de St-Paul-de-Varax (A.C.).

OEDICNÈME.

— Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* : semble mieux représenté en Forez qu'en Dombes (P.L.).

LARIDÉS.

- Goéland argenté *Larus argentatus* : deux ad. le 14-4, sur le Rhône, près de Valence (P.L.).
- Mouette rieuse *Larus ridibundus* : a niché à nouveau cette année

aux Echets, où l'on peut compter environ 400 ad. le 7-5 ; le 2-7, plusieurs jeunes hors d'état de voler sont observés en bordure de la R. N., soit à près d'un km. des nids situés au centre du marais, qu'ils ont donc dû quitter « à pied » lors de la dispersion générale (S.d.G.). Premier jeune volant le 6-6, près du Montellier ; un immature à Lyon le 18-6 déjà.

— Guifette noire *Chlidonias niger* : passage en Dombes les 7 et 21-5 (P.L., H.T.).

— Guifette moustac *Ch. hybrida* : premiers migrateurs le 24-4 en Dombes (P.L.) ; colonie d'une douzaine de couples à l'étang de Chassagne (S.d.G.).

— Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : un erratique au Gd-Bataillard, le 2-7, parmi les Guifettes moustacs (P.L.).

#### PIGEONS.

— Pigeon colombin *Columba oenas*.

— P. ramier *C. palumbus* : retour le 14-2 en Dombes où un vol d'une quarantaine a été observé (P.L.).

— Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* : alors que les premiers migrateurs sont notés le 7-5 en Dombes (P.L.), et le 15-5 près de la Tour-du-Pin (M.D.) seulement, une ponte de 2 œufs est trouvée le 1-5 déjà près de Valence (S.M.).

#### COUCOUS.

— Coucou gris *Cuculus canorus* : premier chant en Dombes le 27-3 (P.L., H.T., M.B.).

#### RAPACES NOCTURNES.

— Chouette effraie *Tyto alba*.

— Hibou petit-duc *Otus scops* : chant près de Valence du 22-2 au 27-3 (S.M.).

— Chouette chevêche *Athene noctua*.

— Chouette hulotte *Strix aluco*.

#### ENGOULEVENTS.

— Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*.

#### MARTINETS.

— Martinet noir *Apus apus* : quelques dizaines le 20-4 et nombreux le 21 à Lyon (P.L.). Passage abondant à Valence le 21-4 (S.M.), et sur le Rhône et en Dombes le 24 (A.C., P.L.).

#### MARTIN-PÊCHEUR.

— Martin-pêcheur *Alcedo atthis* : premier œuf le 3-4 en Dombes (P.L.) ; 3 jeunes volants déjà le 15-5 à Charnoz (S.d.G.), ce qui fait remonter la ponte du premier œuf aux tout premiers jours d'avril également : dates en avance de près d'un mois sur les données classiques (4).

#### HUPPE.

— Huppe fasciée *Upupa epops* : premières migratrices le 27-3 à Valence (S.M.) et en Dombes (P.L.).

#### PICS.

— Pic vert *Picus viridis*.

— Pic cendré *P. canus* : chant le 15-7 près de St-Marcel-en-Dombes (P.L.).

— Pic épeiche *Dendrocopos major*.

— Pic épeichette *D. minor*.

— Torcol fourmilier *Jynx torquilla* : le 17-4 en Isère (P.L.).

#### ALOUETTES.

— Alouette lulu *Lullula arborea*.

— Alouette des champs *Alauda arvensis* : premier chant le 24-1 déjà près de Valence, dès la fin de la neige (S.M.) ; à fin février seulement dans les Dombes.

#### HIRONDELLES.

— H. de cheminée *Hirundo rustica* : premières migratrices le 25-3 seulement près de Valence (S.M.) et le 27-3 en Dombes (A.C., P.L.).

— H. de fenêtre *Delichon urbica*.

— H. de rivage *Riparia riparia* : malgré d'importants travaux dans la sablière, la colonie de Jassans-s-Saône continue de prospérer : population estimée à 350 ind. (dont env. 10 % de jeunes, volant déjà) le 2-7 (S.d.G.) ; colonie d'une quarantaine de trous au Vieux-Rhône (A.C.).

#### LORIOT.

— Lorient *Oriolus oriolus* : premiers migrateurs les 4 et 5-5 en Isère (S.H., M.D.), le 7-5 en Dombes (P.L.).

#### CORVIDÉS.

— Corneille noire *Corvus corone*.

— Corbeau freux *C. frugilegus* : La colonie de Ternay, la plus méridionale de France (7), a été visitée les 28-2 et 20-3 : ébauche de quelques nids à la première date ; à la seconde visite, nous constatons que les oiseaux se sont installés dans une seconde peupleraie (500 m N.) où nous comptons 14 nids et 26 ad. bien cantonnés (S.d.G.). — La nidification vient de s'achever à Charnoz le 15-5 (S.d.G.). — La première nidification de cette espèce en Dombes a été constatée ce printemps, nouvel indice d'expansion locale : le 7-5 à B..., une quinzaine d'ad. sont observés, puis 2 nids sur un frêne isolé et cinq dans les chênes au milieu de la colonie mixte d'Ardéidés ; les jeunes sont en train de quitter les nids (P.L., H. T.) ; le 21-5, nous comptons une troupe en vol de quarante individus, groupant donc probablement l'ensemble des familles et s'associant, peu après, à la pâture dans un champ, avec une trentaine de Choucas (P.L.).

— Choucas des tours *Coloeus monedula*.

— Pie bavarde *Pica pica*.

— Geai des chênes *Garrulus glandarius*.

#### MÉSANGES.

— M. charbonnière *Parus major* : le 6-5, près de Valence, 7 jeunes hors du nid, conduits par un parent (S.M.) ; ceci porte la ponte du premier œuf au 5-4 au moins, assez précoce par conséquent, (4), mais la latitude et l'altitude basses y sont certainement pour beaucoup.

— M. bleue *P. caeruleus*.

— M. noire *P. ater*.

— M. nonnette *P. palustris*.

— M. boréale *P. atricapillus* : cohabite à Ternay avec la Nonnette (S.d.G.).

— M. à longue queue *Aegithalos caudatus*.

#### SITTELLÉS.

— Sittelle torchepot *Sitta europaea* : le 26-5, près de St-Etienne, 7 pull. de 2 semaines dans un nichoir à Etourneau, dont les parents avaient

rétréci le diamètre d'entrée et diminué le volume intérieur par un "toît" de glaise de 1,2 kg (poids sec !) ; la chambre était tapissée de fines lamelles d'écorce de conifères (volume : la valeur de 2 bols, soit env. 1500 fragments) : tout cet aménagement, examiné après l'envol de la nichée, représente plusieurs milliers de voyages (P.L.).

GRIMPEREAUX.

— G. des jardins *Certhia brachydactyla*.

TROGLODYTE.

— T. mignon *Troglodytes troglodytes*.

CINCLE.

— Cincle plongeur *Cinclus cinclus* : le 8-5, à St-Igny-de-Roches (Saône-et-Loire), sur l'Aron (alt. env. 350 m), nid avec 4 pull. d'une dizaine de jours (H.T.).

TURDIDÉS.

— Grive draine *Turdus viscivorus*.

— G. musicienne *T. philomelos*.

— Merle noir *T. merula* : première couvée, assez précoce, de trois jeunes de 2 semaines env., le 17-4 en Isère (P.L.).

— Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : passage en Dombes les 24-4 et 7-5 (P.L., H.T.).

— Tr. pâtre *Saxicola torquata* : retour déjà assez abondant à fin février en Dombes (A.C., P.L.).

— Tr. tarier *S. rubetra* : passage en Dombes les 24-4 et 7-5 (S.M., P.L.).

— Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*.

— Rougequeue noir *Ph. ochruros* : dès le 25-2 à Valence (chant le 3-3) (S.M.) ; couple cantonné le 6-3, près de St-Etienne (P.L.).

— Rossignol philomène *Luscinia megarhynchos* : premier chant (isolé) le 3-4 en Dombes (P.L.).

— Rougegorge *Erithacus rubecula*.

SYLVIIDÉS.

— Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : Charnoz, le 15-5 (S.d.G.).

— Locustelle luscinoïde *Locustelle luscinoïdes*.

— Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*.

— R. effarvate *A. scirpaceus*.

— Phragmite des joncs *A. schoenobaenus* : le 24-4, en Dombes, chant et vol nuptiaux (P.L.).

— Hypolais polyglotte *Hippolais polyglotta*.

— Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*.

— F. des jardins *S. borin*.

— F. grisette *S. communis*.

— F. babillarde *S. curruca* : un ad. le 12-6 aux Echets (S.d.G.), seconde citation de l'espèce pour les Dombes (8).

— Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* ; nombreux chants le 28-2 à Ternay (P.L.).

— P. fitis *Ph. trochilus* : premiers chants le 27-3 en Dombes (P.L.), le 31-3 à Valence (S.M.).

— P. siffleur *Ph. sibilatrix* : premier migrateur le 14-4 près de Valence (P.L.).

ROITELETS.

- R. huppé *Regulus regulus*.
- R. triple-bandeau *R. ignicapillus*.

GOBEMOUCHES.

- G. gris *Muscicapa striata* : le 21-4, près de Valence, précoce (S.M.).
- G. noir *M. hypoleuca* : premier migrateur (♂) le 14-4 près de Valence (P.L.) ; deux jeunes nourris par un ♂ le 20-6, près de Valence (S. M.) ; la nidification de cette espèce semble inédite pour le département de la Drôme (4).
- G. à collier *M. albicollis* : un ♂ près de Lyon le 29-5 (A.C.).

MOTACILLIDÉS.

- Pipit des arbres *Anthus trivialis* : chant et vol nuptiaux le 16-4 en Isère (P.L.).
- Bergeronnette grise *Motacilla alba*.
- B. des ruisseaux *M. cinerea* : net mouvement vers le N., le long du Rhône, à Ternay, le 20-3 (S.d.G.).
- B. printanière *M. flava* : première migratrice, isolée, le 27-3 en Dombes ; le 18-4, petit groupe au passage à St-Georges-d'Espéranche (Isère) (P.L.). Observation d'un indiv. de la sous-espèce Thunbergi, le 7-5 en Dombes (P.L., H.T.).

PIES-GRIÈCHES.

- P. grise *Lanius excubitor* : près de Versailleux, le 6-6, 3 jeunes nourris par les parents sur des fils téléphoniques (S.d.G.).
- P. à tête rousse *L. senator* : ad. et jeune le 23-7, près de St-Paul-de-Varax (P.L.).
- P. écorcheur *L. collurio* : notée assez tardivement, semble-t-il, le 4-5 à Valence (S.M.), le 15 en Dombes (P.L.). Près de Valence, en 1959, deux couples ad. avaient été bagués et 1960 a revu trois de ces oiseaux fidèles au poste ; le premier couple a niché dans le même buisson (4 pull. de 9 jours env. le 2-6) ; l'autre ♂ a élevé sa nichée à 100 m de là : œufs le 8-6, et 5 pull. près de l'envol le 20-6 ; ils sont nourris de papillons (Piérides) et chenilles (S.M.).

ETOURNEAUX.

- E. sansonnet *Sturnus vulgaris*.

FRINGILLES.

- Verdier *Carduelis chloris*.
- Chardonneret *C. carduelis*.
- Linotte mélodieuse *C. cannabina*.
- Venturon montagnard *C. citrinella* : un migrateur attardé ou erratique le 5-5 à Lyon (A.C.).
- Serin cini *C. serinus*.
- Pinson des arbres *Fringilla coelebs*.

BRUANTS.

- B. proyer *Emberiza calandra*.
- B. jaune *E. citrinella*.
- B. zizi *E. cirrus* : couple nicheur le 23-7 près de St-Paul-de-Varax (P.L.).
- B. ortolan *E. hortulana* : trois migrateurs le 7-5 en Dombes (P.L.).
- B. des roseaux *E. schoeniclus*.

MOINEAUX.

— M. domestique *Passer domesticus*.

— M. friquet *P. montanus* : près de Valence, un nichoir a reçu quatre couvées successives, dont trois menées à bien pour un total de 12 jeunes élevés :

1<sup>re</sup> couvée : 5 œufs (1<sup>er</sup> pondu le 3-4), éclosion 4 pull. le 19 ou 20, encore au nid le 5-5 ;

2<sup>me</sup> couvée : 1<sup>er</sup> œuf le 10-5, éclosion le 28 (2 pull.) et le 29 au matin (2 autres) ; les 4 jeunes sont observés hors du nid le 15-6 ;

3<sup>me</sup> couvée : le 20-6, un oiseau couve à nouveau et le 30 encore ; le 8-7, les parents nourrissent 4 jeunes dans le nichoir ;

4<sup>me</sup> couvée : le 30-7, le nichoir contient à nouveau 3 œufs mais ils sont disparus le 5-8.

S'agissait-il du même couple ?

P.L. Rédact.

RÉFÉRENCES.

(1) NOS OISEAUX. Bulletin bimensuel de la Société Romande pour l'Etude et la Protection des Oiseaux — Calendriers Ornithologiques.

(2) Ch. VAUCHER — Contribution à l'étude ornithologique de la Dombes — ALAUDA (1954), 81-114, 256-271 ; (1955), 108-137, 182-211.

(3) OISEAUX DE FRANCE, Bulletin trimestriel du Groupe des Jeunes Ornithologistes — Rapport « Migrateurs » de la Centrale Ornithologique.

(4) P. GEROUDET — La Vie des Oiseaux — 6 volumes — Collection « Les Beautés de la Nature » — Delachaux et Niestlé.

(5) Chr. JOUANIN et M.-H. JULIEN — Note sur la distribution de la Garzette (*Egretta garzetta*) et du Bihoreau (*Nycticorax nycticorax*) dans le Centre de la France. — Ois. Rev. Fr. Ornithol. (1960), 246.

(6) F. SPITZ — Mise au point sur la nidification du Courlis cendré en France. Ois. Fr. G.J.O. (1959), n° 26, 26-31.

(7) Ph. LEBRETON — Nidification du Corbeau freux *Corvus frugilegus* L. au Sud de Lyon — Ois. Rev. Fr. Ornithol. (1960), 179.

(8) Ph. LEBRETON — Sur la présence de la Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (L.) en Dombes — Alauda — (1960), 66-68.

Présenté à la Section Générale en sa séance du 18 février 1961.

---

BIBLIOGRAPHIE

*Répertoire entomologique international, édition 1961.* — Ecrire aux Editions CURIOSITAS, 438, Chaussée de Waterloo, Bruxelles 6 (Belgique) qui prépare la liste mondiale des entomologistes. Tous les renseignements qui seront communiqués (adresse, spécialité, etc...) y seront mentionnés *gratuitement*.

---

ECHANGES, OFFRES ET DEMANDES

AMATEUR disperse bibliothèque, principalement Champignons, quelques titres Fleurs, Oiseaux, Insectes. S'adresser GALLOY, B. P. 13, Saint-Galmier (Loire).

MICROFILMS de livres rares ou épuisés sur les Microscopes et les Champignons. Accessoires et Optique, rares ou spéciaux. Marcel LOCQUIN, 20, avenue Rapp, Paris (7<sup>e</sup>).