

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON.

Année 1856.

(NOUVELLE SÉRIE.)

TOME TROISIÈME.



LYON.

IMPRIMERIE DE F. DUMOULIN, LIBRAIRE,
rue Centrale-St-Pierre, 20.

1856.



DESCRIPTION

D'UNE

ESPECE NOUVELLE DU GENRE **PLEGADERUS**

(FAMILLE DES HISTÉRIDES),

par

E. MULLANT et Cl. REY.

(Présentée à la Société Linneenne de Lyon, le 12 juin 1854.)

Plegaderus hispidulus.

Oblongo-subquadratus, leviter convexus, nitidus, breviter albido-hispidulus, grossè parcéque punctatus, niger, pedibus antennisque rufis, capitulo pallidiori. Prothorace margine laterali incrassato, dorso non transversim sulcato; elytris ectùs obsolete histriatis.

Long. 0,0012 (1/2 l.)

Corps en carré long, un peu plus étroit en arrière et en avant, légèrement convexe, d'un noir brillant; couvert de poils courts, hispides, blanchâtres, peu serrés.

Tête verticale, près d'une moitié plus étroite que le prothorax, subtriangulaire, subdéprimée entre les antennes, longitudinalement convexe sur l'épistome qui est arrondi à son sommet où il présente quatre longs poils; d'un noir assez brillant, obsolètement et rugueusement ponctuée, et garnie surtout en avant, d'une pubescence très-courte, hispide, blanchâtre. *Parties de la bouche* d'un roux de poix. *Yeux* noirs, déprimés, en partie cachés par le prothorax.

Antennes atteignant le milieu du prothorax , légèrement pubescentes , d'un roux-ferrugineux , avec le bouton plus clair , testacé.

Prothorax très-grand , un peu plus large que long, de la largeur des élytres à leur base , rétréci en avant à partir du quart antérieur ; faiblement arrondi sur les côtés qui sont épaissis en forme de bourrelet entier ; assez fortement échaneré au sommet et légèrement arrondi au milieu de la base ; les angles antérieurs infléchis et aigus, les postérieurs droits ; sans sillon transversal sur le dos ; assez convexe , d'un noir brillant , couvert d'une ponctuation assez grossière , peu serrée , obsolète , et de poils hispides très-courts , blanchâtres.

Écusson très-petit, triangulaire, noir, lisse.

Élytres d'un quart plus longues que le prothorax, légèrement convexes, largement tronquées au sommet ; à côtés s'élargissant derrière les épaules jusqu'au quart antérieur , puis se rétrécissant insensiblement , d'une manière faiblement eintrée , jusqu'à l'extrémité ; d'un noir brillant ; couvertes de points grossiers , peu serrés, et de poils hispides, courts, couchés, blanchâtres ; marquées à la base sur les côtés de deux stries sulcifformes, obsolètes • arquées, obliques, s'effaçant avant le milieu.

Pygidium peu saillant; ponctué; d'un noir brillant.

Dessous du corps ponctué ; d'un noir brillant.

Pieds courts , d'un roux ferrugineux. *Cuisses* épaisses, latéralement comprimées, offrant quelques poils hispides, blanchâtres, très-courts. *Tibias* légèrement arqués , spinosules : les antérieurs brusquement dilatés dans la dernière moitié de leur arête externe, où ils présentent quatre denticules, bien distincts. *Tarses* d'un roux-testacé, brièvement ciliés ; à troisième article aussi long que les précédents réunis.

PATRIE : Draguignan. Rare.