

40^e année

N^o 4

Avril 1971

Abonnement 18 F

Le numéro 2,50 F

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDEE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937

des SOCIETES BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^e)

La partie administrative se trouve au centre de ce Bulletin.

du matériel (♂, ♀) récolté également en Suède : Västergötland, par GYLLENHAL.

En 1860 FLOR (Rhynch. Livl., I, p. 658) donna sous le nom d'*exilis* Fallén la diagnose des deux sexes d'une *Microphysa* et lui attribua pour synonyme : *Anthocoris tenellus* Zetterstedt 1838, Ins. Lapp., p. 265. En 1865, DOUGLAS et SCOTT (Brit. Hemipt., p. 484) mirent *exilis* Fallén en synonymie de *coleoptrata* Fallén ; cette synonymie a été conservée par les auteurs postérieurs.

J'ai pu, grâce à l'amabilité de M. le D^r Hugo ANDERSSON, obtenir communication des types de FALLÉN préservés à l'Institut de Zoologie de Lund. La série actuellement existante comprend un ♂ et deux ♀ étiquetés « *L. exilis* » de la main de FALLÉN. On peut supposer, en raison du nom de genre, qu'ils correspondent à la description de 1807. Le ♂ est conforme à cette description, mais les ♀ en diffèrent notablement. L'examen montre que le ♂ s'identifie avec *Myrmedobia tenella* (Zetterstedt), dont j'ai également vu le type, tandis que les ♀ sont à rapporter à *Orius niger* Wolff.

Il ressort de ces faits que le taxon *exilis* Fallén, représenté valablement par le spécimen ♂ de FALLÉN conforme à la description de 1807, doit être identifié à *tenella* Zetterstedt comme l'indiquait FLOR, et non à *coleoptrata* Fallén comme l'ont proposé DOUGLAS et SCOTT et les auteurs postérieurs. Mais *exilis* ayant priorité sur *tenella*, la nomenclature doit être modifiée comme suit :

NOM VALABLE : *Myrmedobia exilis* (Fallén) 1807, l.c. (*Lygaeus*).

SYNONYME : *Anthocoris tenellus* Zetterstedt 1838, l.c. (= *Myrmedobia tenella* auctt.), NOV. SYN.

COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE ANNUEL DE L'AUTOMNE 1968 A L'ETE 1969 DANS LA REGION RHONE-ALPES (suite)

— Bécasse des bois *Scolopax rusticola* : dans le Jura méridional (Ain), le 26 octobre à Souclins, Chartreuse-de-Portes (PR) et quelques-unes à Belmont-en-Valromey du 19 octobre au 10 novembre (2 femelles : 330 et 390 g) ; une le 20 octobre à Chasey (Ain) (HR) ; en Dombes, 5 citations du 10 novembre au 21 décembre (HR, PR). Un individu le 4 février et le 29 mars en Dombes (PR) et « croûle » du 22 mars au 6 avril à Belmont-en-Valromey (HR).

— Courlis cendré *Numenius arquata* : en automne, quelques-uns (maximum 15) de la fin août à la mi-novembre en Dombes (DDv, PL, PG) mais aussi le 9 juillet (CK, PL) et le 15 décembre (DA) ; en val de Saône près de Mâcon, en septembre et jusqu'au 17 octobre (PFN).

Au printemps, 3 citations (un oiseau) en Dombes du 22 au 30 mars (RLv, RL, PR) ; sur la côteière Sud, à St-Maurice-de-Beynost, 12 individus le 16 mai (renseignement local). Un individu le 17 juin à St-Paul-de-Varax (RLv) et deux le 22 juin à Bouligneux sont, éventuellement et probablement, des nicheurs locaux.

En Valbonne, continûment du 8 mars à juillet, avec 2-4 couples

nicheurs (HS, PL, JC, BC, DDv, RM). Le 28 mai, 2 couples probables au marais de Cressin et un couple peu au Nord de Lavour (Ain) (RLv). En Forez, quelques couples habituels, du 9 mars à mai au moins à Montrond-la-Vergnat et l'Hôpital-le-Grand (PL, JL).

En Isère, 2 oiseaux le 19 février déjà à Chamagnieu (JD), le 2 mars à Lumbin et St-Nazaire-les-Eymes (GOG) ; quelques individus les 7, 25 mars, 11 mai et fin juillet à Sablonnières, Ile Crémieu (Isère) (BC, GOG) ; 2 individus le 7 mars entre Bourgoin et Salagnon (GOG) et un le 12 juillet à Satolas (PL) ; 2 le 7 mars au marais du Grand-Plan (Isère) (SH).

En Savoie, 2 le 2 mars à Ste-Hélène-du-Lac et un couple (les 3, 10 avril et 8 juin) au marais d'Albens, à St-Girod près Rumilly (BC).

— Courlis corlieu *N. phaeopus* : observations possibles le 4 mai à Villars-lès-Dombes (RS), le 19 mai à l'embouchure de l'Ain (HS).

— Barge à queue noire *L. limosa* : à l'automne, derniers oiseaux le 20 août et le 26 septembre en Dombes (GG, GM). Au printemps, bon passage en Dombes, avec 16 citations entre le 28 février et le 12 mai, maximum quelques centaines durant tout mars (SH, DDb, PL, JC, DL, JJ, GG, RM, MB). Deux points de nidification : le 17 juin un couple et 4 œufs à St-Paul-le-Varax (RLv) ; peu à l'Est de Boulogneux, 2-4 couples bien cantonnés en juin-juillet (SH, PL, RLv, AVES) ; deux observateurs ont noté que les oiseaux se perchaient volontiers sur les fils de barrières ou même de lignes électriques.

— Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : en Dombes, bon passage « d'automne » du 9 juillet au 26 septembre (RLv, CN, GM, CK, DDv), mais aussi 4 citations du 2 novembre au 17 décembre (RLv, PG, PL). Au printemps, en Dombes, 7 observations du 4 mars au 11 mai (PL, RL, JJ, RM).

— Chevalier gambette *Tr. totanus* : en automne, trois observations du 10 juillet (CK), 8 août (CN) et 26 septembre (GM). Un cas d'hivernage (exceptionnel...) les 15 décembre et 12 janvier aux étangs du Roy, Forez (HB). Au printemps, 9 observations en Dombes du 22 mars au 25 mai (RLv, JJ, RL, JC, RM, YT, PR), une le 30 mars à Jonage (DDb) et une le 19 mai à l'embouchure de l'Ain (HS).

— Chevalier aboyeur *Tr. nebularia* : en automne, 15 citations échelonnées en Dombes du 19 juillet au 5 décembre (DDv, PG, RLv, PL) ; 2 oiseaux le 22 septembre au canal du Logis-Neuf/Rhône (Ardèche) (DA). Au printemps, 6 observations régionales (Jonage, embouchure de l'Ain, Meximieux, Dombes) du 30 mars au 21 mai (DDb, BC, MB, RM, PL, HS).

— Chevalier culblanc *Tr. ochropus* ; en automne, quelques-uns en Dombes du 9 juillet au 28 août (DDv, CK) ; un le 19 octobre à l'embouchure de l'Ain (PL). Au printemps, le 30 mars à Semons (Isère), le 2 avril au marais de Lavour (Ain) (JC), le 3 avril au marais d'Albens (Savoie) (BC), les 5 et 12 avril (et le 16 juin) en Dombes (RL, JJ, RLv), le 20 avril à Meximieux (Ain) (BC), le 30 avril à Jonage (HS), le 1^{er} mai à Rumilly (Hte-Savoie) (BC), les 21 mai et 21 juin à l'embouchure de l'Ain (HS, PL).

— Chevalier sylvain *Tr. glareola* : en automne, une douzaine de citations en Dombes du 13 juillet au 11 octobre, maximum en juillet-

août (DDv, GM, RLv, CK, PL) ; reprise le 9 septembre en Dombes d'un oiseau bague le 4 août précédent à Chavornay, Suisse. *Au printemps*, une seule citation seulement (10 oiseaux), le 13 mai aux Echets (PL).

— Chevalier guignette *Tr. hypoleucos* : en automne, 9 citations régionales (Dombes, lac du Bourget, Mont-Pilat, vallée du Rhône) du 19 juillet au 22 septembre (DDv, CN, GOS, PH, SM, DA). *Au printemps*, 10 observations (embouchure de l'Ain, Jonage, Dombes) du 16 mars au 21 mai (PL, MB, HS, BC, DL, PR, DDb). Les individus observés les 19 et 25 juillet à l'embouchure de l'Ain et le 23 juillet à Jonage (PL, HS) sont-ils des migrateurs précoces ou des nicheurs ?

— Bécasseau maubèche *Calidris canutus* : 5 le 17 décembre à Villars-lès-Dombes (HS).

— Bécasseau minute *C. minuta* : un individu le 9 août 1968 en Dombes (CN).

— Bécasseau de Temminck *C. temminckii* : un individu éventuellement de cette espèce le 30 avril à Jonage (HS).

— Bécasseau variable *C. alpina* : en Dombes, une cinquantaine le 7 novembre à St-Paul-de-Varax (DDv), un vol le 29 mars à St-Paul-de-Varax (PR), une vingtaine le 12 mai à Villars (MB).

— Chevalier combattant *Philomachus pugnax* : en automne, 4 citations du 10 juillet au 21 septembre en Dombes (CK, DDv, DA). *Au printemps*, une quinzaine d'observations en Dombes du 28 février au 8 mai, maximum à la mi-mars (SH, DDb, DL, BF, PL, JJ, JC, RM) ; autres citations : le 2 mars à Jonage (RL), le 9 mars à Valence (SM), le 11 mai en Forez (JL), le 15 mai à Rumilly (Hte-Savoie) (BC).

— Echasse blanche *H. himantopus* : année faible, première observation le 27 avril en Dombes (PR), puis seulement deux points de nidification : au Sud des Vavres de Marlieux (1-2 couples) (PL, RLv, AVES) et au Sud du Gd-Birieux (1 couple avec jeunes en juillet) (CK, AVES).

— Avocette *Recurvirostra avosetta* : une le 7 avril à Jonage (DDb) et une le 29 juin à l'embouchure de l'Ain (PL).

ÆDICNÈME.

— Ædicnème criard *Burhinus œdicnemus* : stations habituelles en Valbonne et Forez ; premières observations le 16 mars à l'embouchure de l'Ain et le 23 mars en Forez (PL).

GLARÉOLE.

— Glaréole à collier *Glareola pratincola* : les 7 et 11 juillet 1969, un individu observé aux Vavres de Marlieux, Dombes (AVES). *Rappel* : un individu le 1^{er} juin 1968 à Birieux, Dombes, un autre en juillet (PL, DA).

LARIDÉS.

— Goéland argenté *Larus argentatus* : plusieurs sur le Rhône à Beauchastel, Le Pouzin, Baix (Ardèche), le 22 septembre 1968 (DA). A Jonage, 3 observations du 12 janvier au 14 février (RL, PL) ; à l'embouchure de l'Ain, deux observations d'un individu en avril, de deux oiseaux adultes le 21 juin (JC, PL) ; 2 individus (immatures) le 4 mai au lac d'Aiguebelette (Savoie) (GOG), un le 6 juin à Lyon sur le Rhône (PL), un immature les 28 et 29 juillet à Villars-lès-Dombes (JL, CK).

— Goéland cendré *L. canus* : 3 individus le 22 septembre au barrage de Beauchastel/Rhône (Ardèche) (DA). Présence continue de plusieurs immatures du 14 décembre au 19 avril à Jonage, et même un adulte le 16 mai (DDb, RL, PL) ; un immature le 8 mars en Dombes (DDb).

— Mouette rieuse *L. ridibundus* : un millier d'oiseaux le 13 novembre à La Salle (Saône-et-Loire) (PFN). A Chambéry, 1 800 individus le 18 novembre, et environ 600 les 15 décembre et 12 janvier au lac du Bourget (GOS), où trois oiseaux hivernants étaient nés au printemps précédent en Tchécoslovaquie (2) et en Finlande. Minimum des effectifs, quasi nuls, à fin décembre-début janvier en Dombes, Forez et à Jonage (DA, PL, YT) ; en ce dernier lieu, dortoir de 3 000 individus le 2 février (HB). Un individu trouvé mort le 18 février 1969 à Lyon avait été bague le 16 novembre précédent à Ranst, Allemagne. A Grenoble, 300 oiseaux le 7 février (JC) ; 100 individus les 13 février et 2 mars à Pontcharra/Isère (GOG). 500 oiseaux le 18 février à Valence (SM).

Au Lac d'Aiguebelette (Savoie), 3 adultes le 17 mai. Premiers poussins le 8 mai en Dombes (GG).

— Mouette pygmée *L. minutus* : un individu le 11 mai à Villars-lès-Dombes (RM).

— Guifette noire *Chlidonias niger* : en Dombes, 6 observations du 26 avril au 16 juin (RL, RM, PL, RLv, YT) ; sur le Rhône à Pierre-Bénite et à Lyon les 27, 29 et 30 avril (FA) ; dans l'île Crémieu (Isère), les 27 avril à Courtenay et Arendon (CORA) et 13 juin à Courtenay (RM) ; à Jonage, les 30 avril et 15-17 mai (HS, DDb) ; en Forez le 11 mai (JL) ; à Varennes-lès-Mâcon le 8 juin (PFN).

— Guifette moustac *Ch. hybrida* : dernières le 29 septembre et le 10 octobre en Dombes (PR, PL). Premières au printemps les 12 et 22 avril (PR, MB) ; à Jonage le 16 mai (DDb). La nidification a paru plutôt faible en Dombes et Forez (PL, JL).

— Guifette leucoptère *Ch. leucopterus* : 3 individus le 15 mai à Jonage (DDb).

— Sterne pierregarin *Sterna hirundo* : à Jonage, un individu le 16 mai (DDb). A l'embouchure de l'Ain, présence de deux oiseaux cantonnés et observation d'un adulte couvant, du 21 mai au 25 juillet (PL, HS).

COLUMBIDÉS.

— Pigeon colombin *Columba oenas* : cinq cas d'hivernage, du 14 décembre au 9 février (Dombes, Forez, Valbonne, Jonage) (PL, PR, HS, YT) ; premiers migrateurs le 28 février au Bec de l'Echaillon (Isère) (JC) et en Dombes (SH), le 9 mars en Forez (PL).

— Pigeon ramier *C. palumbus* : à Belmont-en-Valromey (Ain), quelques hivernants les 28 et 29 décembre, et 26 janvier (HR). En Dombes, 4 observations entre le 17 et le 31 janvier (HS, PR) sont des avant-coureurs d'un passage précoce durant tout février (par exemple 2 500 à Villars le 15), mais s'étant poursuivi durant tout mars avec des milliers d'individus (PR, PL, HS, PGa, YT, DDv) ; noté le 6 février à Frontonas (Isère) (JD) et le 16 février à Vallières (Savoie) (BC).

— Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* : une le 6 octobre à Belmont-en-Valromey (Ain) (HR). Au printemps, premières le 19 avril à Cormoranche-s.-Saône (Ain) (PFN), le 20 avril à Valence (SM) et en

Dombes (PR), le 25 à Millery (Rhône) (JB), le 28 à Roussillon (Isère) (GF).

— Tourterelle turque *St. decacoto* : toujours présente à St-Maurice-de-Beynost (Ain) (PL), à Lyon-Villeurbanne (RL, JM), à Mâcon (PFN), à Villars-lès-Dombes (RLv, PL, MTh, AVES), à Aix-les-Bains (GOS), Valence (SM), St-Chamond (HB).

Notée à Rumilly (Hte-Savoie) le 8 avril (BC), à St-Pierre-de-Bœuf (Loire) le 4 mai (JB), à Vienne (Isère) où elle serait nicheuse depuis plusieurs années (JD, PL), à Roussillon (Isère) en mai (GF), à St-Genis-Laval (Rhône) le 17 juin (MB), à St-Etienne (Loire) le 28 mai et début juillet (JM).

Coucous.

— Coucou gris *Cuculus canorus* : un (tué !) au début d'octobre 1968 à St-Chamond (Loire) (HB). *Au printemps*, premiers chants le 3 avril à Valence (SM), le 4 et le 6 dans le Pilat (MTh, MB), le 5 en Dombes (J), le 7 à Roussillon (Isère) (GF) et en Dombes (2 citations) (DL, JC).

RAPACES NOCTURNES.

— Hibou Moyen-Duc *Asio otus* : 8 individus le 5 décembre au Col du Ballon, Valromey (Ain) (HR). *Nidification* : le 30 mars à Rillieux (Rhône), ponte de 6 œufs (BCo) ; le 10 avril à Vallières (Hte-Savoie), couvaison (BC) ; à Plottes (Saône-et-Loire) (PFN).

— Hibou des marais *Asio flammeus* : un le 2 mars à Lumbin, Grésivaudan (Isère) (GOG).

— Hibou Petit-Duc *Otus scops* : 4 individus (dont un, blessé, recueilli) le 16 octobre à St-Laurent-du-Pape (Ardèche) (SM). Premier chant le 10 mars à Valence (SM) ; chants notés le 2 mai à Salles-en-Beaujolais (Rhône) (RL), le 24 mai à Dompierre, Dombes (RLv), en août à Lentigny (Loire) (SM).

— Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* : observations le 15 avril au Pré Valet et le 14 juin à Arbounouze, Vercors (RD) ; une capture le 21 août 1969 à Aussois, Hte-Maurienne (Savoie) (MP).

— Chouette chevêche *Athene noctua* : dans le Pilat (Loire), le 5 septembre 1968 à Roisey, le 11 octobre et le 22 juin à Chavanay (MB), le 6 août et le 4 septembre 1969 à Tarentaise (MTh). Deux jeunes sortis du nid le 27 juin à Roussillon (Isère) (GF) ; dans le Vercors, une le 13 octobre 1968 à Tussac (1 700 m), une le 28 septembre 1969 au Mont-Aiguille (RD).

— Chouette hulotte *Strix aluco* : nicheuse commune dans le Pilat (MB, YT, JL, MTh). Notée au Mont-Aiguille, Vercors, les 15 août 1968, 22 février, 9 mars et 28 septembre 1969 (PL, RD).

— Chouette effraie *Tyto alba*.

ENGOULEVENT.

— Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* : 2 individus le 14 juin à Arbounouze, Vercors (RD).

MARTINETS.

— Martinet noir *A. apus* : en automne, derniers le 1^{er} septembre à Vals (Hte-Loire) (CC), le 19 septembre à Valence (SM). *Au printemps*,

premiers le 18 avril à Roussillon (Isère) (GF), à Lyon (PL), en Dombes (JL) ; le 19 à Corbas (Isère) (DL), à Jonage (DDb), à St-Etienne (Loire) (JL), en Valbonne (DDv) ; le 20 à Rive-de-Gier (Loire) (YT) et dans l'Île Crémieu (Isère) (BC).

Nidification : mortalité catastrophique (par centaines et milliers) pendant les froids de la première semaine de juin (Lyon, Rive-de-Gier, Vienne, Roussillon, etc.). Nicheur à Aussois (1 500 m), Hte-Maurienne (Savoie) (MP).

— Martinet à ventre blanc *A. melba* : premiers le 26 mars dans les gorges de l'Ardèche (DA), le 29 à La Balme/Rhône, près Yenne (MTh). En mai-juin, noté dans l'Ain à La Burbanche, Bugey (FA) ; en Savoie à Aussois, Hte-Maurienne (MP) ; en Isère à St-Même en Chartreuse (RD), à Hyères-s.-Amby (SH, AVES), à St-Nizier-en-Vercors (PL) ; dans les Htes-Alpes à l'Eychauda, près Le Monestier (FB), à Guillestre (RD).

MARTIN-PÊCHEUR.

— Martin-pêcheur *Alcedo atthis* : en automne, 5 observations en Dombes entre le 26 septembre et le 1^{er} novembre (GM, PGa, PL, DDv) ; en bords de Saône autour de Mâcon, 6 citations du 7 octobre au 17 novembre (PFN) ; les 4 et 8 septembre à St-Julien-de-l'Herms (Isère) ; le 26 octobre à Ste-Colombe/Rhône (JD). Bon hivernage : à Jonage, 9 citations entre le 11 novembre et le 2 mars (HS, DDb, PL, RL, SH) ; en Forez les 14 et 26 décembre (YT) ; sur le Rhône, à Péage-de-Roussillon (Isère) le 19 janvier (GF) et à l'embouchure de la Drôme le 12 janvier (SM). Au printemps, le 10 mars à Ampuis (Rhône) (JD), le 22 mars en Dombes — 3 citations — (RLv), le 30 mars sur le Rhône à Sault-Brénaz (Isère) (BC), le 4 avril à Cormoranche-s.-Saône (Ain) (PFN).

En saison de *nidification*, 8 citations de Dombes (RLv, RL, GG, MB, AVES) et 2 à l'embouchure de l'Ain (PL). La meilleure année pour l'espèce depuis longtemps.

GUËPIER.

— Guépier d'Europe *Merops apiaster* : la colonisation de la région Rhône-Alpes se confirme et même s'amplifie, avec pas moins de 7 cas de nidification. Dans l'Ain, en Dombes, 3 couples au Plantay (PL, RLv, AVES, H.R. PAULI, Berne) ; en Isère, trois cas dans l'Île Crémieu et deux dans la vallée du Rhône : 2 couples à Faverges-de-Mépieu le 14 juillet (PL) ; un couple entre Courtenay et Lancin le 24 mai (BC) ; au moins 2 couples à Trept-Sablonnères en mai et juillet (JC). 6 couples à Chantemerle-les-Blés près Valence, du 25 avril environ à début septembre (renseignement local Mme GUINTRAND, transmis GF) ; 4 couples à St-Maurice-de-l'Exil du 8 mai au 20 juillet (GF). En Ardèche, colonie d'une cinquantaine d'individus le 8 août à St-Jean-le-Centenier près de Villeneuve-de-Berg ; 3 oiseaux le 8 août à Vallon-Pont-d'Arc (SM).

HUPPE.

— Huppe *Upupa epops* : premières le 25 mars à Beynost (Ain) (renseignement local), le 27 à Rive-de-Gier (Loire) (YT), le 6 avril à Cormoranche/Saône (Ain) (PFN), le 7 en Dombes (PR), le 8 en Valbonne et en Dombes (JC, GG).

PICS.

— Pic vert *Picus viridis*.

— Pic cendré *P. canus* : en Dombes, 4 citations entre le 22 mars et le 10 avril (RL, RLv) ; le 9 juillet 1969, 2 individus en Valbonne (AVES).

— Pic noir *Dryocopus martius* : dans le Jura méridional (Ain), un individu tué (!) le 15 octobre à Lompnaz, Bugey (PRo) ; observations le 9 novembre à Belmont-en-Valromey et le 17 février en forêt de Sovémond (HR). Dans le Pilat (Loire), noté régulièrement à Tarentaise de février à juin ; cris le 7 août 1969 à St-Sauveur-en-Rue (Loire) (MTh, JL). Dans le Vercors, 6 citations de janvier à juin (forêt des Ecouges, forêt des Coulmes, Malleval, Veymont, Arbounouze) (RD, JC, FB). En Savoie, près d'Arêches, Beaufortin, noté à fin août-début septembre 1969 (FB).

— Pic épeiche *Dendrocopos major*.

— Pic épeichette *D. minor* : assez nombreuses observations de cette espèce peu fréquente à l'ordinaire. Dans la Loire le 23 janvier à St-Chamond (HB) ; en Saône-et-Loire le 17 mai à Louhans (DDv) ; dans l'Ain, en Dombes le 1^{er} juillet à Sandrans (AVES) et le 17 juillet à Villars (HS), dans le Valromey les 3 novembre et 27 décembre à Belmont (HR) et le 24 juillet à Lompnieu (SH) ; en Hte-Savoie le 8 avril à St-Eusèbe (BC) ; en Isère, dans l'Île Crémieu le 20 avril à Lancin et le 24 mai à Carizieu (BC), le 5 mars à Grenoble, le 30 avril à Arzay (JC), en novembre et décembre à Vienne (JD) ; en Savoie, le 1^{er} août 1968 au Tremblay près du Bourget, les 6 août et 1^{er} décembre à Bassens, le 6 octobre au col de la Cochette, Coise (GOS) ; dans la Drôme, le 11 août 1969 à Valence (SM).

— Torcol *Jynx torquilla* : au printemps, premiers le 4 avril à Rousillon (Isère) (GF), le 8 à Crempigny (Hte-Savoie) (BC) et à Mâcon (PFN), le 9 dans le Pilat (MB). Nidification : chants en mai dans l'Île Crémieu (Isère) à Arendon (BC) et à Optevos-s.-Amby (MB) ; citations nombreuses dans les collines Nord du Pilat : St-Chamond, La Valla, Rive-de-Gier, Rochetaillée, St-Etienne, La Garde (HB, YT, MT, MTh, JL, MB).

ALOUETTES.

— Alouette lulu *Lullula arborea* : premier chant le 25 février dans le Pilat (HB) ; niche dans le Pilat (HB, MB, HB, MTh) et dans l'Île Crémieu (Isère) (SH, BC, PL). Chanteur en juin à 1 400 et 1 600 m à Aussois, Hte-Maurienne (Savoie) (MP).

— Alouette des champs *Alauda arvensis* : grosse migration dans le Pilat le 21 octobre (JL) ; premiers chants le 20 février à St-Etienne (Loire) (JL), le 23 à Cormoranche-s.-Saône (Ain) (PL).

HIRONDELLES.

— Hironnelle de rivages *R. riparia* : quelques-unes le 1^{er} juin à l'étang de Boulieu, Île Crémieu (Isère) (BC).

— Hironnelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* : encore quelques dizaines le 11 novembre dans les gorges de l'Ardèche (DA). Au printemps, premières le 22 mars au Cerdon (Ain) (RLv). Niche dans le Bas-Bugey (Ain) à Serrières-de-Briord, gorges de la Pernaz (CORA) ; en Oisans (Isère) sur la route du col du Lautaret (YT) et dans la vallée

du Vénéon jusqu'à La Bérarde (DA) ; en Savoie, en Hte-Maurienne, quelques nids à Aussois, Avrieux, Le Bourget (MP).

— Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* : en automne, dernières le 25 octobre dans le Pilat (JL), le 1^{er} novembre en Valbonne (GOS). Au printemps, premières le 14 mars à Valence (SM) et à Myons (Isère) (A. MOIROUD), le 15 à Attignat (Ain) (renseignement local, rec. DDv), en Dombes (PR) et en Forez (HB, JL), le 16 à La Balme (Isère) (SH, BC), le 19 à Grenoble (JC).

— Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* : dernières le 11 octobre dans le Pilat, le 15 à Rive-de-Gier (Loire) (JL, YT). Premières le 27 mars à Lyon (DDb), le 8 avril à Port-Galland (Ain) (JC).

MOTACILLIDÉS.

— Pipit rousseline *Anthus campestris* : en Valbonne, un individu les 12 et 31 mai (RM, DDv).

— Pipit des arbres *A. trivialis* : premiers le 4 avril à La Garde, Pilat (Loire) (MTh), le 8 à Crempigny (Hte-Savoie) (BC).

— Pipit farlouse *A. pratensis* : dates extrêmes de la présence en mauvaise saison, le 12 septembre à Valence (SM), le 20 avril à Rive-de-Gier (Loire) (YT).

— Pipit spioncelle *A. spinoletta* : dates extrêmes de la présence en mauvaise saison, en plaine, le 8 septembre à St-Vincent-de-Chapey (Drôme) (SM), les 10 avril à Valence (SM), 16 avril à Belmont-en-Valromey (Ain) (HR). Nicheur (présent en août) à St-André-en-Vivaraix (Ardèche) (YT).

— Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : dernières le 17 octobre en bords de Saône près Mâcon (PFN). Premières le 3 avril au marais de Lavour (Ain) (JC), le 6 avril à Ste-Sigolène (Hte-Loire) (BCo), le 8 avril en Dombes (DA), plutôt tardif.

— Bergeronnette des ruisseaux *M. cinerea* : quelques hivernantes habituelles (PFN, JC, MB, DA, BC, HB) ; 5 poussins le 7 juillet à Planfoy, Pilat (Loire) (MTh).

— Bergeronnette grise *M. alba* : quelques hivernantes, le 15 décembre en Forez (HB), le 27 décembre à Jonage (DA), le 9 janvier à Villeurbanne (Rhône) (PL), le 13 février à Pontcharra (Isère) (GOG). Au printemps, gros passage à Valence le 11 février (SM), puis 5 dates entre le 2 et le 11 mars en Dombes, Forez, marais de Lavour (PL, SH, JC).

PIES-GRIÈCHES.

— Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : premières le 4 mai en Dombes (BC).

— Pie-grièche à tête rousse *L. senator* : première le 1^{er} mai à Francheville (Rhône) (YT) ; notée le 11 mai à Montrond, Forez (Loire) (JL), dans le Pilat en juin et le 5 septembre 1969, à Roisey, Véranne, Le Bessat (MB, MTh), à Ste-Eusèbe (Hte-Savoie) le 14 juillet (BC).

— Pie-grièche à poitrine rose *L. minor* : un individu le 13 juillet à Villars-lès-Dombes (YL).

— Pie-grièche grise *L. excubitor* : quelques cas d'hivernage (HB, MB, HR, JC, PL). Présente en avril et juin au marais d'Albens (Savoie) (BC), en mai à St-Genest-Lerpt (Loire) (JL), en juillet à Vassieux-en-Vercors (PFN).

CINCLE.

— Cincle *C. cinclus* : 3 oiseaux le 5 janvier sur le Séran à Belmont-en-Valromey (Ain) (HR) ; 4 le 16 mars sur le Furon à Sassenage (Isère) (GOG). Dans le Pilat (Loire), nicheur aux barrages du Pas-du-Riot, du Gouffre d'Enfer et de la Valla (JL, PL, HB, YT, MTh) ; présent à Aussois, Maurienne, Vanoise (MP).

TROGLODYTE.

— Troglodyte *T. troglodytes* : dans le Vercors, le 28 décembre, à 1 200 m d'altitude, 2 individus enfouis dans un talus enneigé (RD). Dans le Pilat (Loire), forte densité — env. 0,5 couples/ha — dans les sapinières (MTh, PL).

ACCENTEURS.

— Accenteur alpin *Prunella collaris* : 2 individus le 26 mars à St-Remèze, gorges de l'Ardèche (DA). Présent le 25 juin au Col du Lautaret (Isère) (GOG), à la belle saison en Maurienne (Aussois, Polset), Vanoise (Savoie) (MP, PL).

— Accenteur mouchet *P. modularis* : premiers oiseaux le 13 octobre à Valence (SM) ; hivernage abondant ; derniers le 20 mars à St-Etienne (Loire) (YT). Env. 0,2 couples/ha dans les sapinières du Pilat (MTh).

MUSCICAPIDÉS.

Turdinés.

— Traquet tarier *Saxicola rubetra* : encore un le 10 octobre dans le Pilat (HB). *Au printemps*, un précoce le 29 mars en Dombes, dernier le 2 mai (RL, MB). Nicheur dans le Vercors (Autrans, La Chapelle-en-Vercors, col de Lachaux) (PL, PFN).

— Traquet pâtre *S. torquata* : assez nombreux hivernants ; en décembre, les 11 et 30 à Rive-de-Gier (Loire) (YT), le 15 et le 29 en Dombes (DA, PL), le 26 en Forez (YT), le 18 à Roussillon (Isère), où des observations sont également faites du 21 au 30 janvier (GF).

Au printemps, premiers le 17 février à Valence (SM), le 19 à St-Quentin-Fallavier (Isère) (JD), le 23 à Cormoranche-s.-Saône (Ain) (PL), le 2 mars à Ste-Hélène-du-Lac (Savoie) (GOG) et en Dombes (PL), le 6 mars dans le Pilat (HB), le 8 dans les Monts du Lyonnais (MTh).

— Traquet motteux *Oe. oenanthe* : passage d'automne du 2 septembre au 20 octobre, avec maximum du 15 au 25 septembre (MM, JD, JL, DA, SM). Passage de printemps du 10 avril — Valence — au 16 mai (SM, BC, YT, HB).

— Merle de roches *Monticola saxatilis* : en juin à Arbounouze, Vercors (RD), au col du Galibier (Isère) (GOG), à Aussois, Maurienne, Vanoise (MP).

— Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* : assez nombreux hivernants ; en décembre, les 2, 16 et 31 à Rive-de-Gier (Loire) (YT), le 4 à Roussillon (Isère) (GF), puis le 8 janvier à Vienne (Isère) (JD).

Au printemps, premiers le 13 mars à Roussillon (GF), le 14 à Beynost (Ain) (PL), le 16 à St-Etienne et dans le Pilat (Loire) (CC, MB), le 17 à Lyon, à St-Chamond et à Rive-de-Gier (Loire) (DDb, MB, YT).

— Rougequeue à front blanc *Ph. phoenicurus* : au printemps, premiers assez tardifs, le 13 avril à Valence (SM), le 19 à Bourg-de-

Péage (Isère) (RL) et à Mâcon (PFN), le 21 à Rive-de-Gier et à St-Chamond (Loire) (HB, YT), le 22 à Roussillon et à Jonage (Isère) (GF, HS).

— Rougegorge *Erithacus rubecula* : env. 0,5 couples/ha dans les sapinières du Pilat (MTh).

— Rossignol *Luscinia megarhynchos* : premiers le 10 avril à Ozan (Ain) (PFN), le 11 à Roisey, Pilat (Loire) (MB), le 14 à Servas, Dombes (DDv).

— Gorgebleue *L. svecica* : le 3 avril à Villars-les-Dombes (JJ) ; les 3 et 5 avril au marais de Lavour (Ain) (JC).

— Grive litorne *Turdus pilaris* : premières le 9 novembre en Valromey (Ain) (HR) ; assez bon hivernage avec maximum en février et jusqu'en mi-mars ; dernières le 27 mars en Forez (Loire) (GT). Reprise à la mi-janvier, en Drôme et Ardèche, d'oiseaux nés en Finlande et en Allemagne.

— Merle à plastron *T. torquatus* : en automne, les 8 et 19 octobre au Col de la Barbanche, Pilat (Loire) (JL). Au printemps, quelques individus les 8 et 9 mars en Vercors (RD), le 26 à Pussy (Savoie) (GOS), un le 10 avril à Lapeyrouse, Dombes (JC), un le 19 avril (trouvé mort, bagué à l'automne 1968 en Allemagne) dans le Pilat (HB).

Nicheur commun en Vercors (RD, FB), en Maurienne, Vanoise (MP, PL).

— Merle noir *T. merula* : en hiver, oiseaux bagués en Suisse repris dans l'Isère et en Ardèche. Premiers chants le 15 janvier à Bourg-en-Bresse (DDv), le 21 à Roussillon (Isère) (GF), le 26 en Dombes (DDv).

— Grive mauvis *T. iliacus* : 13 citations entre le 20 octobre et le 30 décembre, dont 5 reprises de bagues (Finlande, Russie, Pologne, Suisse) en Hte-Savoie, Isère, Drôme, Htes-Alpes. Au printemps, une seule citation le 19 mars à Millery (Rhône) (JB, HR, YT, PG, MTh, DA, GOS).

— Grive musicienne *T. philomelos* : au début de novembre, 2 reprises dans la Drôme d'oiseaux bagués en Suède et Allemagne ; en décembre-janvier, quelques hivernantes dans la plaine du Forez (MTh, YT) et dans la vallée du Rhône (GF, SM), avec reprise dans l'Ardèche le 27 janvier d'un oiseau bagué en Suisse ; un individu le 9 février en Dombes (PR) ; le 29 mars, reprise dans la Drôme d'un oiseau bagué en Russie. Nicheuse dans le Pilat (MTh, PL), à la Chartreuse-de-Portes, Bas-Bugey (Ain), (CORA).

— Grive draine *T. viscivorus*.

Sylviniés.

— Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : toujours présente à Jonage (DDv, PL, SH, DDb) et à la lône de La Valbonne (JC). Notée le 13 octobre 1968 à St-Baldoph (Savoie) (GOS) ; présente de février à juin au moins en plusieurs points du marais de Lavour (Ain) (GOS, JC, RLv) ; une le 13 juin à Vertrieu-s.-Rhône (Ain) (SH).

— Locustelle lusciniôïde *Locustella luscinioides* : premières le 8 avril en Dombes (DA) et à la lône de La Valbonne, où elle est notée jusqu'en juillet (JC) ; un individu le 19 avril à Jonage (DDb). Présente en avril-mai dans l'Île Crémieu (Isère) à Courtenay, Lancin, Sablonnières (BC, PL) ; bien représentée le 15 mai à l'étang Beaumont, Albens (Savoie) (BC).

— Locustelle tachetée *L. naevia* : à la mi-avril à Valence (SM) et à Roussillon (Isère) (GF). Les 10 avril, 1^{er} mai et 8 juin au marais d'Albens (Savoie) (BC) ; le 3 mai au lac d'Aiguebelette (Savoie) (BC) ; le 6 juillet au Gd-Bataillard, Dombes ; le 10 juillet à la lône de La Valbonne (AVES).

— Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* : premier le 6 avril en Dombes (JJ, DA) ; quelques chanteurs le 20 avril au marais de Lancin, Ile Crémieu (Isère) (BC).

— Rousserolle verderolle *A. palustris* : plusieurs chanteurs le 8 juin au marais d'Albens (Savoie) (BC).

— Rousserolle effarvatte *A. scirpaceus* : première, précoce, le 5 avril au bord du Lac du Bourget (JC). Dans l'île Crémieu, des chanteurs le 11 mai à Arendon, le 24 mai à Ambossy (BC), le 19 juillet à Courtenay (PL) ; présente le 4 mai au lac d'Aiguebelette (Savoie) (JT) ; abondante le 13 juin le long du Rhône à St-Sorlin-en-Bugey et Vertrieu (Ain) (SH) ; notée le 10 août à la lône de La Valbonne (JC).

— Rousserolle turdoïde *A. arundinaceus* : première, assez précoce, le 8 avril en Dombes (DA) ; notée le 19 avril au barrage de Pizançon (Drôme) (RL). A la belle saison, en Valbonne (JC), au lac d'Aiguebelette (GOG), à Albens (Savoie) (BC), à St-Sorlin-en-Bugey (SH).

— Hypolaïs icterine *Hippolais icterina* : un individu capturé le 12 août 1968 à Billième (Savoie) (HT).

— Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* : premier le 4 avril, précoce, à Rive-de-Gier (Loire) (YT) ; nicheur dans l'île Crémieu (Isère) (BC).

— Fauvette orphée *Sylvia hortensis* : un couple le 4 mai à Rive-de-Gier (Loire) (YT).

— Fauvette des jardins *S. borin* : chant dès le 9 avril à St-Donat (Drôme) (SM).

— Fauvette à tête noire *S. atricapilla* : assez nombreux hivernants ; le 21 décembre à Grenoble (JC) ; en janvier, le 2 à Rive-de-Gier (Loire) (YT), le 12 à Villeurbanne (Rhône) (BC) et à Pussy (Savoie) (GOS), le 18 à St-Chamond (Loire) (HB) ; à 10 reprises du 25 janvier au 17 février à Rive-de-Gier (YT). Premiers chants le 7 mars à Millery (Rhône) (JB), le 16 à l'embouchure de l'Ain (PL).

— Fauvette babillarde *S. curruca* : en Dombes, une le 22 juin à Bouligneux (PL), une le 11 juillet à Sandrans (AVES) ; nidificatrice commune à Aussois, Maurienne, Vanoise (MP).

— Fauvette grisette *S. communis* : dernières le 9 octobre à Valence (SM). Premières le 29 mars — précoce — (RL) et le 8 avril (DA) en Dombes.

— Fauvette passerinette *S. cantillans* : une capture le 6 août 1969 à Valence (SM).

(A suivre).

Annonces sur les pages de couvertures. — P. II : Ets Henri Peter, Editions Delachaux et Niestlé, Librairie R. Desvigne. — P. III : Ets Rollet et Cie. — P. VI : Compagnie Générale de Madagascar. — P. VII : Microscopes Wild. — P. VIII : Optique Nagabbo, Ets Deyrolle.