

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

## SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège social et Secrétariat général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>e</sup>)

La partie administrative se trouve au centre de ce Bulletin.

**COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE ANNUEL.  
DE L'AUTOMNE 1968 A L'ÉTÉ 1969  
DANS LA RÉGION RHONE-ALPES (suite et fin)**

— Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : premiers le 7 avril en Dombes (DDv), le 10 à Ozan (Ain) (PFN) et à Albens (Savoie) (PC). Un individu le 19 juin à Tarentaise, Pilat (Loire) (MTh) ; cri le 9 juillet à Hières-s.-Amby (Isère) (AVES).

— Pouillot véloce *P. collybita* : assez nombreux hivernants ; en décembre, le 9 à Rive-de-Gier (Loire) (YT), le 12 à Valence (SM), le 15 à Charmes (Ardèche) (SM), et au Bourget-du-Lac (GOS) ; en janvier, le 19 à Rive-de-Gier (YT) et le 30 à Villeurbanne (Rhône) (PL). *Au printemps*, premiers le 26 février à Roussillon (Isère) (GF), puis le 8 mars à Montchat (Loire) (MTh), le 9 à Lavour (Ain) (GOS) et en Dombes (JC), le 10 à Jonage (BC) et à Rive-de-Gier (YT), le 13 à Grenoble (JC).

— Pouillot de Bonelli *P. bonelli* : noté à la fin mai à Roussillon, Ville-sous-Anjou et St-Maurice-de-l'Exil (Isère) (GF) ; le 15 juin à St-Georges-les-Bains (Ardèche) (SM) ; à la belle saison à Aussois, Maurienne, Vanoise (MP) ; abondant à Lompnieu-en-Valromey (Ain) en juillet (SH).

— Pouillot siffleur *P. sibilatrix* : 4 migrateurs le 25 avril à Villars-lès-Dombes (HS). Noté le 11 mai à La Balme-les-Grottes (Isère), le 16 au val d'Amby (Isère) (SH), le 18 à La Chartreuse-de-Portes, Bas-Bugey (Ain) (CORA).

*Régulins.*

— Roitelet huppé *R. regulus* : env. 1,2 couple/ha dans les sapinières du Pilat (MTh).

— Roitelet triple-bandeau *R. ignicapillus* : env. 1,1 couple/ha au Pilat (MTh).

*Muscicapins.*

— Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* : en automne, passage

jusqu'à la mi-septembre. Au printemps, passage entre le 20 avril et le 13 mai (YT, MTh, PL, JD, MM, MB, BC, HS, GOS, SM). A Valence, 4 jeunes nourris par un adulte le 5 août 1969 (SM) ; nicheur à Ste-Agrève (Ardèche) (P. MAIGRE).

— Gobemouche gris *Muscicapa striata* : derniers le 14 septembre à Bassens (Savoie) (GOS), le 22 à Montéléger (Drôme) (SM). A la belle saison, le 11 mai en Forez (Loire) (JL), le 18 à Lompnaz (Ain) (JM), le 21 à Jonage (SH) ; les 17 juin et 6 août à Valence, nicheurs ? (SM) ; dans la Loire, les 15 juin et 9 juillet à St-Chamond, les 19 juin et 11 juillet à La Valla-en-Gier, nicheurs probables (HB).

#### PARIDÉS.

— Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*.

— Mésange rémiz *Remiz pendulinus* : le 4 avril, une quinzaine, dont 2 captures, à Villars-lès-Dombes (JJ, DA).

— Mésange nonnette *Parus palustris* : un individu le 11 juillet à Sandrans, Dombes (AVES).

— Mésange boréale *P. atricapillus* : notée le 31 mars et le 1<sup>er</sup> mai au marais d'Albens (Savoie) (BC) ; dans l'île Crémieu (Isère), le 7 mars au marais du Gd-Plan, le 16 mars au lac d'Hyères-s.-Amby (SH, BC) ; du 31 mars au 6 avril au marais de Lavour (Ain) (JC) ; le 30 mars en forêt de Bonnevaux (Isère) (JC).

— Mésange huppée *P. cristatus* : notée le 30 mars en forêt de Bonnevaux (Isère) (JC) ; le 7 avril à Mâcon (PFN) ; le 8 juillet à Joyeux, Dombes (AVES) ; le 27 août à Millery (Rhône) (JB) ; env. 0,4 couple/ha dans les sapinières du Pilat (Loire) (MTh).

— Mésange noire *P. ater* : env. 1 couple/ha dans les sapinières du Pilat (MTh).

— Mésange bleue *P. caeruleus* : reprise le 27 septembre 1968 au col de la Golèze (Hte-Savoie) d'un oiseau né en 1966 dans le Bas-Rhin.

— Mésange charbonnière *P. major* : hivernage plus faible qu'en 1967-68 à St-Chamond (Loire) (HB) ; reprise le 15 décembre 1968 à Bessins (Isère) d'un oiseau bagué en automne 1966 au col de Bretolet, Valais (Suisse).

#### SITTIDÉS.

— Sittelle torchepot *Sitta europaea*.

— Tichodrome *Tichodroma muraria* : un le 12 janvier à Brison-St-Innocent, lac du Bourget (GOS) ; un à Aussois, Maurienne, le 20 juin (MP) ; un le 6 août au col des Ecrins — 3 500 m —, Oisans (Isère) (DA).

#### GRIMPEREAUX.

— Grimpereau des bois *Certhia familiaris* : un chanteur le 9 mars à St-Laurent-du-Pape (Ardèche) (SM) ; à la belle saison noté à Aussois, Maurienne (Savoie) (MP).

— Grimpereau des jardins *C. brachydactyla* : premiers chants le 18 janvier à Lyon et en Dombes (PL) ; env. 0,2 couple/ha dans les sapinières du Pilat (Loire) (MTh).

#### BRUANTS.

— Bruant proyer *Emberiza calandra* : 2 individus le 20 octobre au

col de la Barbanche, Pilat (JL). Premiers le 2 mars à Valence (SM), le 7 à Crémieu (Isère) (SH), le 16 en Valbonne (Ain) (PL).

— Bruant jaune *E. citrinella* : mouvements en mars et au début d'avril (CORA).

— Bruant zizi *E. cirrus* : en Dombes, chanteur à Dompierre le 22 mars, le 16 juin au Plantay (RLv) ; en Forez, un mâle le 24 mai à Mornant (Loire) (HB, JL).

— Bruant ortolan *E. hortulana* : un dès le 26 mars à Mirabel (Ardèche) (DA) ; passage le 6 mai et jours suivants à Villars-lès-Dombes (BL). Chanteurs le 3 mai à Roussillon (Isère) (GF), le 8 juin à Balan (Ain) (JC), le 9 juillet en Valbonne (AVES) ; dans le Bas-Bugey (Ain), le 18 mai à Serrières-de-Briord (CORA), le 13 juin à St-Sorlin (SH) ; à la belle saison à Aussois, Maurienne (MP).

— Bruant fou *E. cia* : en novembre, plusieurs observations à Rive-de-Gier (Loire) de « transhumants » du Pilat (YT) ; un le 7 décembre à Vienne (JD). 2 mâles le 6 avril à Vaux-en-Beaujolais (Rhône) (DA) ; à la belle saison à Aussois, Maurienne (MP).

— Bruant les roseaux *E. schoenichus* : à Clonas-s.-Varèze (Isère), un dortoir a regroupé une centaine d'individus du 8 décembre au 9 mars au moins (GF) ; noté en octobre, février et mars au barrage de Pizanzon (Drôme) (RL).

— Bruant nain *E. pusilla* : un individu aurait été observé le 22 avril à Jonage (SH) ; première citation régionale de l'espèce.

#### FRINGILLES.

— Pinson des arbres *Fringilla coelebs* : premiers chants le 23 février à Beynost (Ain) (PL), le 25 à Rive-de-Gier (Loire) (YT) ; env. 1,3 couple/ha dans les sapinières du Pilat (MTh) ; à Lompnieu-en-Valromey (Ain), effectifs très faibles en juillet (SH).

— Pinson du Nord *F. montifrigilla* : le 13 octobre — Pilat — et le 6 avril — Beaujolais — sont les dates extrêmes d'un hivernage notable, où les effectifs les plus abondants furent observés de la fin de janvier au tout début de mars (CORA) ; reprise en décembre en Drôme et en janvier dans l'Isère d'oiseaux bagués 1 et 2 ans auparavant en hivernage en Allemagne.

— Verdier *Carduelis chloris* : hivernage très faible à St-Chamond (Loire) (HB), mais très abondant à Valence (SM).

— Chardonneret *C. carduelis* : en octobre, reprise dans la Drôme et dans la Hte-Savoie d'oiseaux bagués en Suisse et Tchécoslovaquie.

— Tarin *C. spinus* : 21 octobre et 17 avril — Pilat — sont les dates extrêmes d'un hivernage surtout sensible en février (CORA).

— Linotte *C. cannabina* : gros passage à Valence en septembre-début octobre (SM) ; une trentaine le 1<sup>er</sup> janvier à Vallière (Hte-Savoie) (BC).

— Sizerin *C. flammea* : quelques cas d'hivernage à basse altitude ; du 31 janvier au 4 février, 5 oiseaux apparemment de cette espèce au Chambon-Feugerolles (Loire) (renseign. local, GT) ; un le 14 février à Rive-de-Gier (Loire) (YT) ; deux le 13 février à Pontcharra (Isère) (GOG) ; quelques-uns les 15 et 16 mars à Pussy (Savoie) (GOS). A la belle saison à Aussois, Maurienne, Vanoise (Savoie) (MP) ; le 20 juillet

au col des Montets, Chamonix (Hte-Savoie) ; le 8 août à la Bérarde, Oisans (Isère) (DA).

— Venturon *C. citrinella* : en octobre, le 5 au plateau du Seuil, Chartreuse (DA), le 21 au col de la Barbanche, Pilat (JL). Nicheur en Vercors (PL, RD) et dans le Pilat (MTh) ; noté le 16 août au vallon de Polset, Vanoise (PL).

— Serin cini *S. serinus* : quelques hivernants, le 7 décembre à Vienne (JD), à plusieurs reprises en janvier à Rive-de-Gier (Loire) (YT), le 1<sup>er</sup> février à Beynost (Ain) (PL), le 18 à Ampuis (Rhône) (JD), mais absent à Valence (SM).

Premiers le 5 mars à Lyon (JM), le 8 à Dagneux (Ain) (JC), le 9 à Clonas-s.-Varèze (Isère) (GF). Noté en juin à Tarentaise — 1 000 m —, Pilat (Loire) (JL, MTh), les 24 et 26 juin au col du Lautaret — 2 000 m — (Isère) (BS), en août à St-André-en-Vivarais — 1 000 m — (Ardèche) (YT) ; nicheurs ?

— Beccroisé *Loxia curvirostra* : un le 2 février au Parc de Lyon (HR). En Chartreuse, noté les 5, 13 octobre et 15 mai (DA, RD) ; dans le Vercors, les 24 novembre, 1<sup>er</sup> décembre, 22 février, 8 mars et 6 avril (RD, DA) ; dans le Pilat, de la fin novembre à la fin juin (MTh, PL) ; à la belle saison à Aussois, Maurienne (Savoie) (MP).

— Bouvreuil *P. pyrrhula* : faible hivernage cette année ; quelques-uns à Valence (SM), assez commun à Grenoble (JC), point à St-Chamond (Loire) (HB) ; dans la région, une citation de janvier et 5 de février (YT, JC, DL, PFN, GOG, BC). Noté le 30 mars à Vartrieux, Ile Crémieu (Isère) (BC), le 10 avril au marais d'Albens (Savoie) (BC), à la belle saison à Aussois, Maurienne (Savoie) (MP), en août à Ste-Catherine (Rhône) et à St-André-en-Vivarais (Ardèche) (YT).

— Grosbec *C. coccythraustes* : faible hivernage ; 4 citations entre le 30 novembre et le 25 janvier à Belmont-en-Valromey (Ain) (HR) ; 3 entre le 20 novembre et le 30 décembre à Valence (SM) ; une le 2 mars à Ste-Hélène-du-Lac (Savoie) (GOG) ; une reprise le 11 octobre à Vaulx-en-Bugey (Ain) d'un oiseau bagué en Tchecoslovaquie.

#### PLOCÉDÉS.

— Moineau domestique *Passer domesticus* : à Aussois, Maurienne (Savoie), les mâles relèvent de la sous-espèce *P. d. italiae* dite Moineau cisalpin (MP).

— Moineau friquet *P. montanus* : noté les 14 mars et 3 avril à Tarentaise, Pilat (Loire), à 1 000 m d'altitude (MTh).

— Niverolle *Montifringilla nivalis* : dans le Vercors, le 20 octobre à la Gde-Moucherolle (MBv) et les 8 et 9 mars (RD) ; en Isère, le 31 décembre à l'Alpe de Vénosc (GOG), les 24 et 26 juin au col du Lautaret (BS) ; en Vanoise — Maurienne —, troupe de plusieurs dizaines le 16 août au vallon de Polset (PL), des vols à la fin mars mais un seul en juin à Aussois (MP) ; plusieurs oiseaux le 25 mai à Guillestre (Htes-Alpes) (RD).

#### ETOURNEAUX.

— Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* : oiseaux nés en Allemagne et en Suisse repris le 29 septembre en Hte-Savoie, le 20 octobre à Meyzieu (Rhône) ; à Lyon, dortoirs en septembre dans la cour de la mairie du 6<sup>e</sup> arrondissement et en février place Tolozan (PL) ; au début

de février, dortoirs de plusieurs dizaines de milliers à la lône de La Valbonne (JC) ; un albinos le 9 février à Bourg-de-Péage (Isère) (RL).

#### LORIOT.

— Lorient *O. oriolus* : premières observations le 20 avril en Dombes (PR), le 30 à Millery (Rhône) (JB), le 1<sup>er</sup> mai en Dombes (PL).

#### CORVIDÉS.

— Geai *Garrulus glandarius* : le 12 octobre, observation prolongée à Cercier (Hte-Savoie) d'un individu entièrement blanc, sauf l'extrémité des rectrices légèrement gris-cendré (G. LE NOËL).

— Pie *P. pica*.

— Casse-noix *Nucifraga caryocatactes* ; à l'automne 1968, diverses observations parfois éloignés des montagnes, sont à rapporter à une invasion d'oiseaux orientaux. Un oiseau tué le 15 septembre à St-Amour (Saône-et-Loire) (PFN) ; un le 22 septembre à Poleymieux-au-Mt-d'Or (Rhône) (MM) ; 4 citations entre le 17 septembre et le 6 octobre à Belmont-en-Valromey (Ain) (HR) ; 3 citations d'oiseaux tués entre le 15 et le 21 octobre à Lompnaz et Serrières-de-Briord, Bas-Bugey (Ain) (PRo) ; 2 observations en octobre au cirque de St-Même, Chartreuse, et une le 24 novembre en forêt de Lente, Vercors (DA).

A la belle saison, noté en Chartreuse, à Guillestre (Hte-Alpes) (RD), à Flaine (Hte-Savoie) (CORA), en Vanoise au vallon de Polset (PL) et à Aussois (MP).

— Crave à bec rouge *P. pyrrhacorax* : quelques-uns en mai à Aussois, Maurienne (MP).

— Chocard *P. graculus* : le 31 décembre, une troupe d'un millier sur les tas d'ordures de l'Alpe de Vénosc (Isère) (M. LIOGIER) ; une bande d'au moins 200 individus le 26 janvier sur les plateaux du Vercors (RD).

— Choucas *Corvus monedula* : dans le Vercors, un le 24 mai à St-Nizier, altitude 1170 m (PL), une troupe d'une cinquantaine le 1<sup>er</sup> mai à Presles, altitude 1000 m (AR). Nicheurs ?

— Corbeau freux *C. frugilegus* : durant tout février, troupes de plusieurs milliers en Dombes (DDv, SH, DL). Colonie de 50 couples à l'embouchure de l'Ain (JC) ; dans l'Isère, colonies d'une centaine de nids à Pont-de-Chéruy, d'une cinquantaine à Chavanoz, d'une petite dizaine à Villette-d'Anthon, de quelques nids à Janeyrias (SH).

— Corneille noire *C. corone*.

— Corneille mantelée *C. (corone) cornix* : une le 30 mars à Chassins, près Morestel (Isère) (BC). Plusieurs le 3 janvier à Brindas (Rhône) (FA).

— Grand Corbeau *C. corax* : outre les citations classiques des Savoies, Vercors et Oisans, citons : dans l'Ain, régulier à Belmont-en-Valromey (HR) et le 9 août 1969 au col de Vallorse (SH) ; un le 18 mai à la Burbanche, Bugey (FA). Dans l'Isère, un couple le 16 mars à Hyères-s.-Amby (BC, SH) ; plusieurs le 19 mars au Mont du Jala, Grenoble (JC). Dans la Drôme, 2 individus le 5 avril à Valdrôme (AR). Dans l'Ardèche, un le 26 mars dans les gorges de l'Ardèche (DA).

Rédaction :

Philippe LEBRETON, Michel CZAJKOWSKI  
et Bernard CHABERT.