

B-1

Tome 65

fascicule 10

Décembre 1996

Abonnement 170 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

COMPTE RENDU MYCOLOGIQUE DE LA 67^e EXPOSITION (1996)

Les expositions se suivent et ne se ressemblent pas, et c'est ainsi qu'après quelques années favorables, les caprices du temps de cet été ont entraîné une faible poussée fongique bien ressentie par le public. Dans ces conditions, nous ne pensions pas avoir beaucoup de visiteurs, et c'est l'inverse qui s'est produit. Nombre d'entre eux étaient surpris de voir autant de champignons (290 espèces environ), apportés essentiellement par nos fidèles linnéens, alors que les apports des visiteurs habituels, venus pour détermination, sont restés insignifiants.

En conclusion, notre 67^e exposition reste encore appréciée et son succès habituel est dû aux membres de notre groupe mycologique que j'ai plaisir à remercier chaleureusement, avec les responsables des sociétés amies venus nous aider à la détermination des espèces litigieuses.

Voici la liste des espèces rares ou critiques, ou n'ayant jamais été présentées :

- *Cortinarius emonctus* Fr. ss Kill. :
- Trois petits *delibutus* à chapeau et stipe violet pâle, et lames argilacés. Sous conifères.
- *Cortinarius safranopes* Hy. :
- Sept *hinnuleus* aux couleurs chaudes, bien caractérisés par leur mamelon obtus entouré d'une dépression circulaire limitée par une marge godronnée. Lames très espacées et long stipe concolore avec des restes d'anneau. Sans odeur, sous feuillus.
- *Leccinum piceinum* Pilat et Dermek : Trois exemplaires de petite taille, à chapeau rouge brique, stipe blanc à méchules noirâtres et à chair blanche comme *Leccinum quercinum*, mais en différant par la chair vivement noircissante, trouvés sous conifères.
- *Leccinum melaneum* (Smoll.) Pil. et Derm. : Un seul exemplaire de 12 cm de haut, rappelant *Leccinum scarber*, mais avec un chapeau plus sombre, brun-noir et une chair blanche immuable. Sous bouleaux.
- *Coriolopsis gallica* (Fr.) Ryr. : Chapeau étalé-réfléchi, à surface grossièrement strigineuse-feutrée, peu zonée et gris-brun ; face inférieure gris-noir, à pores fins anguleux. Sur bois vivant de frêne.
- *Choiromyces meandriiformis* Vitt. (Ascomycète) : Un seul échantillon de grande taille, 13 × 9 cm, irrégulièrement globuleux, très rugueux, gris ochracé, ressemblant à une pomme de terre. Sa chair veinée, cérébriforme, dégage une odeur forte, indéfinissable. Semi-souterrain, sous feuillus. Succédané de la truffe, de qualité très inférieure.

A. POPIER.

SECTION BOTANIQUE :

Compte rendu de la session de Pentecôte

les 25, 26 et 27 mai 1996,

dans la région de Forcalquier et du Luberon

Jean-Paul Fraysse

La Lézardière, Don, 01260 Vieu-en-Valromey.

Traditionnellement, la section botanique organise, pour Pentecôte, trois journées d'herborisation dans le sud de la France. Cette année, le choix s'est porté sur la région de Forcalquier, l'abbaye de Salagon et son jardin médiéval, la Montagne de Lure et enfin le Petit Luberon.

Le samedi 25 mai, rendez-vous fut pris pour le pique-nique de midi, devant le prieuré de Salagon, à Mane, près de Forcalquier. Ce prieuré, après une histoire longue et mouvementée, abrite actuellement le Conservatoire du patrimoine ethnologique de la Haute-Provence.