

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
**DE LYON.**

*Année 1856.*

( NOUVELLE SÉRIE. )

**TOME TROISIÈME.**



**LYON.**

IMPRIMERIE DE F. DUMOULIN, LIBRAIRE,  
rue Centrale-St-Pierre, 20.

1856.



CONSTITUTION D'UN GENRE NOUVEAU  
DÉTACHÉ DU GENRE **TROGOPHILÆUS**

( FAMILLE DES BRACHÉLYTRES ),

PAR

**E. MULSANT et Cl. BEY.**

(Mémoire lu à la Société Linnéenne de Lyon, le 10 décembre 1855.)

GENRE **OCHTHEPHILÆUS**.

(*ὄχθη*, rivage, *φιλος*, ami).

*Corpus* elongatum, depressum.

*Palpi maxillares* articulo ultimo conico, attenuato.

*Antennæ* apice sensim crassiores.

*Pedes* mediocres, basi approximati.

*Tibiæ* muticæ, pubescentes.

*Tarsi* breves, triarticulati.

*Corps* allongé, sublinéaire, déprimé.

*Tête* assez saillante ; légèrement inclinée ; subtriangulaire ; faiblement resserrée à la base ; séparée du prothorax par une espèce de cou.

*Yeux* sémiglobuleux, assez gros et assez saillants.

*Labre* transversal ; sinueux et cilié à son bord antérieur.

*Mandibules* peu saillantes ; bidentées à leur extrémité.

*Palpes maxillaires* assez grands ; à dernier article en cône atténué au sommet.

*Menton* transversal ; largement mais faiblement échancré en avant.

*Antennes* graduellement plus épaisses à leur extrémité ; à premier article assez grand, allongé : les deuxième et troisième

beaucoup plus longs que les suivants: les intermédiaires submoniliformes: les quatre derniers un peu plus épais que les précédents, ou transversaux, ou guère plus longs que larges: le dernier ovalaire.

*Prothorax* plus ou moins rétréci en arrière, plus ou moins transversal, plus ou moins tronqué à la base et au sommet.

*Écusson* assez grand; en triangle transversal.

*Élytres* en carré long, tronquées au sommet, arrondies aux angles postéro-externes.

*Abdomen* sublinéaire; de six segments: le dernier très-petit, tronqué au sommet.

*Dessous du corps* assez convexe.

*Pieds* médiocrement allongés; rapprochés à leur base.

*Tibias* non spinosules, mais pubescents.

*Tarses* courts; de trois articles: les deux premiers très-courts: le dernier deux fois plus long que les deux précédents réunis.

Obs. Ce genre diffère du *G. Trogophlœus*, par la conformation du dernier article des palpes maxillaires, qui est en cône atténué, au lieu d'être en alène. On peut y joindre deux espèces décrites par Eriehson, et qui présentent ce même caractère, savoir: *Tr. omalinus* et *Tr. angustatus* (Genera et species Staphylinorum, pages 802 et 805).

### **Ochthephilus flexuosus.**

*Elongatus, depressus, parcè luteo-pubescens, nitidulus, piceus, capite abdomineque obscurioribus; antennis rufo-ferrugineis, pedibus piceo-testaceis. Elytris grossè parcèque punctatis, thorace tertîa parte longioribus; hoc basi subcarinato, utrinquè obliquè fortiùs impresso, lateribus post medium dentato-flexuosis.* (Pl. fig. 3).

Long. 0<sup>m</sup>,0036 (4 l. 2/3).

*Corps* allongé, assez déprimé; brillant; d'une couleur de poix,

ordinairement plus claire sur le prothorax et plus obscure sur la tête et l'abdomen ; couvert de poils courts, brillants, jaunâtres, couchés et peu serrés.

*Tête* subtriangulaire ; un peu plus étroite que le prothorax ; assez convexe ; d'un noir de poix brillant, avec les parties de la bouche d'un roux testacé ; creusée entre les antennes de deux sillons assez larges, parallèles, se terminant sur le front par deux petites fossettes peu apparentes ; assez fortement ponctué dans le fond et autour de ces sillons, ainsi que derrière les yeux ; couverte de quelques rares poils jaunâtres transversalement ou obliquement couchés de dehors en dedans, et ciliée derrière les yeux de deux ou trois longs poils obscurs. *Cou* très-finement chagriné ; brillant ; d'un noir de poix.

*Antennes* un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; graduellement plus épaisses à l'extrémité ; pubescentes ; d'un roux ferrugineux, avec les deux ou trois premiers articles un peu plus clairs : le premier assez gros, en massue oblongue ; le deuxième subcylindrique, plus grêle et d'une moitié plus court que le précédent ; le troisième en massue allongée, plus long que le deuxième ; les quatrième à septième submoniliformes ; les huitième à dixième légèrement transversaux ; le dernier ovalaire.

*Prothorax* près d'un tiers moins large que les élytres ; un peu plus court que large ; sensiblement rétréci en arrière ; très-faiblement subhissineusement tronqué à la base et au sommet : a angles postérieurs droits ; les antérieurs infléchis, obtus et légèrement arrondis au sommet ; les côtés assez fortement arrondis en avant, et présentant vers les deux tiers postérieurs une petite dilatation dentiforme ; faiblement convexe ; d'une couleur de poix ferrugineuse, brillante ; garni de quelques poils jaunâtres, courts, couchés obliquement ou en travers ; chargé d'une carene longitudinale, obsolète, se prolongeant en avant un peu au-delà du milieu ; marqué à la base, de chaque côté, d'une impression

oblique assez forte, et d'une autre beaucoup plus petite, ovale, de chaque côté de l'extrémité antérieure de la carène; en outre, d'une petite fossette de chaque côté vers les bords latéraux, au dessus de la dilatation dentiforme. Le fond et les bords de ces impressions sont plus ou moins grossièrement ponctués.

*Écusson* assez grand, triangulaire, finement et rugueusement ponctué.

*Élytres* plus d'un tiers plus longues que le prothorax; déprimées; d'une couleur de poix brillante; marquées à la base d'une très-légère impression oblique, et sur toute leur surface de points grossiers, peu serrés, un peu oblongs; couvertes de poils courts, assez raides, couchés, peu serrés et d'un jaune brillant.

*Abdomen* plus long que la poitrine; légèrement arrondi sur les côtés, qui sont assez fortement rebordés; faiblement convexe; lisse, d'un noir de poix brillant, avec l'anus un peu plus clair; garni d'une pubescence assez rare sur le dos, plus fournie sur les bords; cilié en outre, sur les côtés et au sommet, de quelques poils plus longs et non couchés: le cinquième segment plus grand que les précédents, un peu retréci postérieurement, sinueux et pellucide à son bord apical; le dernier, petit, en cône tronqué au sommet, plus ou moins voilé par le précédent.

*Pieds* médiocrement allongés; d'un testacé de poix; pubescents, avec deux ou trois longs poils, plus redressés que les autres, en dessous des cuisses antérieures et intermédiaires et en dessus des cuisses postérieures, et un autre poil solitaire semblable, au milieu de la tranche externe des tibiais. *Tarses* courts; pubescents; testacés.

*PATRIE*: Beaujolais, parmi les feuilles mortes, sur les bords de l'Ardèche. Principalement en automne.