

**BULLETIN MENSUEL**  
**DE LA**  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

**Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON**

**Rédaction : R. ALLEMAND**

**APPEL DES COTISATIONS 1990**

Cotisations payables par chèque bancaire ou postal (C.C.P. LYON 101-98 H)  
au nom de la Société Linnéenne de Lyon.

Tarifs ci-contre. Merci de ne pas attendre les lettres de rappel pour vous  
en acquitter.

*Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1990, 59 (4) : 105-120.

## Inventaire et répartition des Rhopalocères du département de la Savoie (Lepidoptera) (3<sup>e</sup> partie)<sup>1</sup>

Michel Savourey, 481 avenue S. Pasquier, F 73300 Saint Jean de Maurienne.

**Rhopalocera (Lepidoptera) of the department of Savoie (France) (Part 3).**

**Clossiana dia** Linnaeus, 1767 [2990]

*Répartition* : Centre et Ouest paléarctique (sibérienne) : Europe occidentale et centrale, Balkans jusqu'en Chine. Présente partout en France, elle n'occupe en Savoie que les plaines et la moyenne montagne : landes et prairies buissonneuses où poussent diverses Violettes. 230 - 1600 - (2000) m. IV - V / VII - VIII. Eclussions échelonnées suivant l'altitude.

*Localités* : Chindrieux (Chautagne, 230 m). La Biolle (400 m). Grésy (Sierroz, 400 m). St Jean de Chevelu (Monthoux, 700 m). Brison (400 m). Chambéry (Les Monts, 300-500 m ; Les Charmettes, 400 m). Chignin (380 m). Pugny Chatenod (Corbières, 600 m). Thoiry (C. des Prés Sud, 850 m). Doucy en Bauges (1100-1600 m). St Pierre d'Albigny (650 m). St Jean de la Porte (Montlambert, 300-800 m). Albertville (Fort du Mont, 1100 m). St Marcel (500-650 m). Brides (700 m). Fontaine le Puits (1000-1200 m). Bourg St Maurice (Versoye, 1800-2000 m). Salins (600 m). *ND du Cruet* (500-700 m). *St Alban des Villards* (Merlet, 1100-1200 m). *La Chambre* (430 m). *Montsapey* (Gd Arc, 1300-1500 m). *Montgellafrey* (1400-1600 m). St François Longchamp (1450 m). *St Etienne de Cuines* (600-700 m). *St Colombar des Villards* (La Chal Léchet, 1200-1500 m). *Le Châtel* (600-800 m). *Jarrier* (1200-1550 m). *Montvernier* (La Montaz, 950 m). *St Jean de Mne* (Bonrieu, La Combe, 600-700 m). *Hermillon* (600-900 m). *St Pancrace* (900-1200 m). *Fontcouverte* (Pierre Pin, Charvin, La Rochette, Luosset, 850-1600 m). *St Martin la Porte* (La Planchette, 1100-1500 m).

**Melitaea cinxia** Linnaeus, 1758 [2991]

*Répartition* : Paléarctique (holoméditerranéenne) : de l'Espagne à la Russie et la région de l'Amour. Cette mélitée très répandue en France semble un peu moins commune en Savoie que les autres. On la trouve dans des prairies maigres et bien exposées où poussent les Plantains. (230) - 600 - 1600 - (1900) m. (IV) - V - VI - VII. Rarement VIII.

*Variation* : *M. c. pilosellae* Rottentburg 1775 présentant des formes plus petites et plus sombres en altitude.

*Localités* : Serrières, Brison (230 m). St Jean de Chevelu (600 m ; Monthoux, 750 m). Chambéry (Les Monts, 300-500 m). St Jean de la Porte (Iles du Bourg, Montlambert, 280-800 m). Fontaine le Puits (1000-1200 m). St Marcel (600 m). Les Allues (Doron, 900 m). *St Jean de Blle* (Nant Brun, 1250-1500 m). La Perrière (Formier, 1400-1800 m). Ste Foy Tse (1500 m). Pralognan (Mt Chevrier, 1300-1500 m ; Chavière, 1500-1800 m). *ND du Cruet, La Chambre* (430-500 m). *St Alban des Villards* (Merlet, 1100 m). *St Colombar des Villards* (Glandon, 1350-1550 m). *Montvernier* (La Montaz Le Fragnin, 950-1200 m). *Hermillon, Le Châtel* (600-800 m). *St Pancrace* (1000-1200 m). *St Jean de Maurienne* (La Combe, 600 m ; Les Oules, 700 m). *Fontcouverte* (Les Adrets, 900 m). *Orelle* (1000 m). *St Martin la Porte* (Charbutin, 1500-1900 m). *Bramans* (Le Planay, 1600 m). Termignon (1400 m).

1. Deuxième partie : *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1990, 59 (3) : 69-84.

**Melitaea didyma** Esper, (1779) [2993]

**Répartition** : Centre Ouest paléarctique (holoméditerranéenne) : Maghreb, Sahara, Europe, Asie Centrale. Absente de l'extrême Nord Ouest de la France, la « mélitée orangée » est l'un des papillons les plus communs de Savoie, présent dans les prairies, les friches, les bois clairs, les pelouses alpines sèches. (230) - 500 - 1800 - (2200) m. (mi V) - mi VI - VII - mi VIII - (début IX).

**Variation** : La population savoyarde semble rattachée globalement au groupe *M. d. meridionalis* Staudinger 1870, avec parfois en altitude des formes plus petites et plus sombres (*M. d. subalpina* Staud. 1861).

**Localités** : Chindrieux (230 m). La Biolle (400 m). Chambéry (270 m). Le Bourget (250 m). St Jean de Chevelu (Monthoux, 750 m). La Chapelle du Mt du Chat (Hautecombe, 600 m). Aillon le Jeune (Couvent, 1100 m). Montagnole (800 m). St Jean de la Porte (400 m). St Pierre d'Albigny (La Noiriat, 450 m ; C. du Frêne, 500-1100 m). *Montmélian* (Arbin, 400 m). Plancherine (C. de Tamié, 780 m). *St Jean de Bille* (1100-1250 m). Pralognan (Chollières, 1500 m). St Marcel (600 m). Aime (Villette, 750-800 m). Planvillard, (1200 m). Les Chapelles (1100-1200 m). Fontaine le Puits (1000-1200 m). Brides (700 m). Les Allues (Villages, 1500 m). Planay (Plan Fournier, 1700-1800 m). Montsapey (Gd Arc, 1300-1500 m). St Alban des Huretières (Cucheron, 800-1000 m). *St Alban des Villards*, *St Etienne de Cuines*, *St Colomban des Villards* (Glandon, 600-1500 m). *La Chambre* (450 m). *ND du Cruet* (500-700 m). *Pontamaffrey*, *Le Châtel*, *Hermillon* (500-1000 m). *St Julien Mt Denis* (Canal, 700 m). *St Jean de Mne* (600-700 m). *Villargondran* (Les Reisses, 650 m). *Jarrier* (St Roch, 1200 m ; Sapey, 1500 m). *St Pancrace* (900-1600 m). *Fontcouverte* (Merderel-Roset, Rochette 800-1600 m). *Villarembert* (1400-1600 m). *Valloire* (Télégraphe, 1600 m ; Le Villard, 1380-1600 m). *Le Bourget* (1200-1300 m). *Bramans* (Le Planay, 1600 m ; Savine 2200 m). Termignon (RN 6, 1400 m ; Sentier de l'Arpont, 1400-1900 m). *Lanslevillard* (Arc, 1500 m ; Les Grattais, 1900-2200 m). Lanslebourg (Cuchet, 1900-2200 m).

**Localités anciennes** : Albertville. La Bathie.

**Melitaea diamina** Lang, 1789 [2994]

**Répartition** : Paléarctique (mongolienne) : Du nord de l'Espagne à la région de l'Amour. En France, à l'Est d'une ligne Pyrénées Ardennes. En Savoie, est présente un peu partout surtout en montagne, dans les lieux frais et humides : lisières, prés abrités, bords des cours d'eau. (230) - 600 - 2000 - (2200) m. (fin V) - VI - VII - mi VIII - (fin VIII).

**Localités** : Apremont (C. du Granier, 1130 m). St Jean de Chevelu (marais, 600 m). Serrières, Chindrieux (Chautagne, 230 m). Montcel (Mt Revard, 1200-1450 m). Les Déserts (La Féclaz, Les Ebats, 1350 m). St François de Sales (Chalet de Gralette, 1300 m). Thoiry (C. des Prés, 700-1130 m). Aillon le Jeune (C. du Lindar, 1180 m). Doucy en Bauges (Dent des Portes, 1100-1600 m). Jarsy (Forêt de Bellevaux, 1400 m ; Combe d'Ire, 1500-1800 m). St Pierre d'Albigny (Le Domaine, C. du Frêne, C. du Potat, 280-1300 m). Plancherine (Tamié, 780 m). *Ugine* (Vérel, 1080 m ; Le Frêne, 1400 m). *Arêches* (Mt Mirantin, 1800 m). La Giétaz (Aravis, 1500-1800 m). Beaufort (Entreeroches, 900 m). *St Jean de Bille* (1250-1900 m). *Feissons sur Salins* (Croix de Feissons, 1350 m). St Marcel (650 m). Aime (Planvillard, 1200 m). Les Allues (Villages, 1500 m ; Doron, 900 m, 1900-2000 m). St Bon (Les Avals, 1700 m). Champagny (Friburget, Laisonnay Bas, 1500-1600 m). Planay (Plan Fournier, 1700-1800 m). Pralognan (Doron, La Croix, 1200-1400 m ; Chavière, Les Fontanettes, 1500-2000 m ; Mt Chevrier, 1500 m). Peisey (1200 m ; La Gurrax, 2000 m). Bourg St Maurice (Versoye, 800-2000 m). Ste Foy Tse (La Thuile, 1100-1300 m). Tignes (Station, 2000 m). Montsapey (Gd Arc, 1300-1500 m). *St Etienne de Cuines*, *St Alban des Villards* (Glandon, 700-770 m ; Merlet, 1100-1200 m). *St Colomban des Villards* (Glandon, 1000-2000 m). *Montpascal* (1500 m). *St Jean de Mne*, *Hermillon* (600 m). *St Pancrace* (900-1200 m). *Jarrier* (Béranger, 1200 m ; Le Sapey, 1550 m). *Fontcouverte* (Charvin Roset, 700-1250 m). *St Jean d'Arves* (Vallonet, 1400 m). *Villarembert* (1100-1900 m). *St Julien Mt Denis* (1500 m). *Albanne* (Col, 1600 m). *Montricher* (St Félix, 700 m). *Valloire* (*L'Echerenne*, 1400 m ; Plan Lacha, 2000 m). *Orelle* (1000 m). *St Martin la Porte* (La Planchette Les Râteaux, 1200-1850 m). *St André* (Le Col, Plan de l'Ours, 1400-1800 m). *Avrieux* (Longecôte, 1700-2000 m). *Bramans* (Arc, 1300 m ; Le Planay, 1600 m). Termignon (Arpont, 1350-2000 m). *Lanslevillard* (Les Grattais, 1700-2200 m). Lanslebourg (Gd Coin Nord Ouest, 2400-2700 m). *Bessans* (Ribon, 2050 m).

**Localité ancienne** : Voglans (250 m).

**Mellicta athalia** Rottemburg, 1775 [2995]

*Répartition* : Paléarctique : Europe et Asie tempérées jusqu'au Japon ; partout en France, de même en Savoie, sauf en haute montagne : hôte des prairies et alpages, même fauchés. (230) - 600 - 1800 - (2000) m. (V) - VI - VII - VIII - (début IX).

*Variation* : *M. a. celadussa* Fruhstorfer 1910, forme de la moitié orientale française. Nombreuses variations individuelles et aberrations (mélanisants, albinisants, etc.).

*Localités* : Apremont (C. du Granier, 1130 m). Chambéry (les Monts, 300-500 m). Le Bourget du Lac (Mt du Chat, 1300 m). St Germain la Chambotte (700 m). Trévignin (700 m). St Jean de Chevelu (Monthoux, 700 m). Serrières, Chindrieux, Brison, Grésy sur Aix (230 m). St François de Sales (Chalet de Gralette, 1300 m). Les Déserts (900 m). Thoiry (700-1130 m). Doucy en Bauges (Le Golet, 1200-1500 m). Jarsy (Forêt de Bellevaux, 1400 m ; Combe d'Ire, 1500-1800 m). Montmélian (Arbin, 400 m). St Pierre d'Albigny (C. du Frêne, 900-1000 m). Ugine (Vérel, 1080 m). St Jean de Bille (1250-1800 m). St Marcel (650 m). Brides (700 m). Aime (Planvillard, 1200 m). Fontaine (1000 m). Les Allues (Villages, 1500 m ; Doron, 900 m). Champagny (Friburget, 1500 m). Pralognan (Doron, La Croix, Mt Chevrier, 1200-1500 m ; Les Fontanettes, Bochor, 1600-2000 m). Planay (Plan Fournier, 1700-1800 m). Salins (600 m). Bourg St Maurice (Versoye, 800-2000 m). Montsapey (Gd Arc, 1300-1500 m). St Alban des Huretières (Gd Cucheron, 900-1000 m). Montgellafrey (1400-1600 m). St Etienne de Cuines, St Alban des Villards (Glandon, 600-800 m ; Merlet, 1100-1200 m). St Colomban des Villards (Glandon, 1400-1900 m). Montpascal (Chaussy, 1500 m). Montivernier (Le Fragnin, 1250 m). Hermillon (550-1000 m). Pontamaffrey (550 m). St Jean de Mne (600 m). St Pancrace (900-1300 m). JARRIER (Léard, Le Sapey, 1550 m). Fontcouverte (partout, 700-1600 m). Villarembert (Garney, 1600 m). Albiez Montrond (Gevoudaz, 870-1000 m ; Le Crêt, 1400 m). St Julien Mt Denis (Stade, 700 m ; Grény, 1100 m). Montricher (St Félix, 700-800 m). Valloire (L'Echerenne, 1400 m ; C. du Télégraphe, 1650 m). St Martin la Porte (La Planchette, 1200-1500 m). St André (Le Col, 1500 m). Avrieux (La Reposette, 1700 m). Bourget (1200-1300 m). Termignon (Arpont, 1400-1600 m ; Chalet Fina, 2200 m).

*Localités anciennes* : La Bathie (600 m). Peisey (1200 m).

**Mellicta deione** Geyer, 1832 [2996]

*Répartition* : Atlanto-méditerranéenne : Afrique du Nord, Europe méridionale. En France citée du Languedoc, de Provence, du Sud des Alpes et de l'ouest lyonnais. Sans doute très localisée en quelques sites de Maurienne, sur des pelouses alpines xérotiques. 1500-2000 m (?). VII (?).

*Localités* : St Colomban des Villards (communication orale A. CUSIN, 1986). Lanslebourg. Sollières Sardières (J. BOURGOGNE, 1930).

**Mellicta varia** Meyer-Dür, 1851 [2997]

*Répartition* : Apennins et Arc alpin uniquement. Dispersée en Savoie dans toute la zone montagneuse, elle passe facilement inaperçue. Elle exploite certaines gentianes des pelouses bien exposées, en particulier à l'étagé alpin. 1200-2900 m. VII - mi VIII.

*Localités* : Doucy en Bauges (le Golet, 1250 m). Pralognan (Gd Marchet, 2000-2500 m ; Les Fontanettes, 1650-2000 m). Termignon, Lanslebourg, Sollières (Rostin, 2200 m ; C. de Sollières, 2900 m ; Gd Coin, 2200-2700 m). Bramans (Savine, 2100-2300 m). Lanslevillard (Les Grattais, 2200-2700 m). Bessans (La Buffa, 2300 m ; Ribon, Grand Plan, 2100 m).

*Localités anciennes* : Peisey. Lanslevillard (l'Arcele, 2200-2600 m).

**Mellicta parthenoides** Keferstein, 1851 [2998]

*Répartition* : Atlanto-méditerranéenne : Absente du Nord de la France, cette méliée occupe en Savoie les pelouses, paturages et friches sèches de

moyenne montagne. (230) - 400 - 1600 - (2000) m. mi V - VI - mi VII / VIII - (IX). Eclotions échelonnées suivant l'altitude.

*Localités* : Serrières, Brison (230 m). St Jean de Chevelu (Monthoux, 700 m). Chambéry (Les Monts, 300-500 m). Vérel Pragondran (400 m). Grésy sur Aix (350 m). La Thuile (900 m). Les Déserts (La Féclaz, Le Revard, 1300 m). *St Pierre d'Albigny* (C. du Frêne, 900-1000 m). Plancherine (C. de Tamié, 780 m). *Ugine* (Vérel, 1080 m). Centron (700 m). Fontaine le Puits (1200 m). Aime (Villette, 750-800 m). *Feissons sur Salins* (Croix de Feissons, 1350 m). Les Allues (1500-1800 m). Pralognan (Les Fontanettes, 1650-2000 m ; Vallée de Chavière, 1500-1800 m ; Mt Chevrier, 1300-1500 m). *La Chambre* (430 m). *St Colomban des Villards* (Léchet, 1400 m). *Jarrier* (St Roch, 1200 m ; le Sapey, 1600 m). *Montvernier* (900-1300 m). *St Jean de Mne* (Bonrieu, La Combe, 600-700 m). *Hermillon* (550-900 m). *Fontcouverte* (Charvin, 1100 m). *St Jean d'Arves* (Col Nord, 1700 m). *Montricher* (St Félix, 700-800 m). *St Julien Mt Denis* (1500 m). Termignon (1400 m).

### *Melicta aurelia* Nickerl, 1850 [2999]

*Répartition* : Mongolienne : Europe et Asie centrales ; France du Nord Est et du Centre. Sans doute présente en Savoie, mais très localement, car signalée des départements voisins. Landes, tourbières. 230-1500 m. VI - VIII (?).

*Localités* : Seulement citée de Serrières en Chautagne (à confirmer). D'autres indications (Méribel, Pralognan) se sont révélées fausses.

### *Hypodryas intermedia* Ménétries, 1859 [3001]

*Répartition* : Alpine oréale : Alpes et montagnes d'Asie en aires très disjointes. Même en France, cette espèce a une répartition mal connue, suivant des localités très dispersées en Savoie, Isère et Hautes Alpes. Elle semble se plaire sur les pentes forestières à aunes et rhododendrons, à la limite de l'étage alpin, ou dans les couloirs plus aérés de l'étage montagnard. 1600-2000 m. mi VI - mi VII - (fin VII).

*Variation* : *H. i. wolfensbergeri* Frey 1880 est la forme présente en Savoie.




Fig. 8 : Enveloppe des relevés d'observations en Savoie des Mélietées : a) *Hypodryas intermedia* ; b) *Hypodryas cynthia cynthia*. La zone quadrillée représente les maxima de densité des couples (date-altitude).

*Localités* : Beaufort (C. de Méraillat nord, 1550 m ; JACOB). Arêches (Lac de St Guérin, Le Planey, 1600 m ; HERES). Les Allues (Altiport, 1700-1900 m ; Doron, 1750-2000 m ; NEL). Pralognan (Isertan, 1600-1800 m ; Rocher de Villeneuve ; BOURGOGNE. Abadie, Gerlon, Montaimont, 1500-1900 m ; NEL, ROUX).

*Localités anciennes* : Peisey (Les Esserts, 1600-2000 m ; DE LESSE, MARION). Arvillard (Forêt de St Hugon, Pré nouveau, 1500 m GOBERT). Lanslevillard (DE BEAULIEU, GHILIANI ?) : confusion possible avec *H. cynthia*.

### **Hypodryas cynthia** Denis et Schiffermuller, 1775 [3002]

*Répartition* : Alpes et montagnes de Bulgarie. Présente en Savoie seulement dans les grands massifs centraux, elle exploite les violettes et plantains dans les pelouses montagnardes pas trop exploitées, et peut y être d'une extrême abondance, mais elle disparaît irrémédiablement des zones trop pâturées. 2000 - 2600 - (3000) m. VII - (VIII).

*Localités* : St Martin de Belleville (Val Thorens, Pécelet, 2200-3000 m). Pralognan (Mt Bochor, 2000-2100 m ; Gd Marchet, C. de Napremont, 2000-2500 m). Ste Foy Tarentaise (Le Miroir, La Sassièrre, 2000 m). Tignes (L. du Chardonnet, 2380 m). Val d'Isère (Solaise, 2200-2400 m). *St Sorlin d'Arves* (Croix de Fer Olle, 2000-2100 m ; Lac Tournant, 2600-2700 m). *St Colomban des Villards* (C. du Chaput Ouest, 2000 m). Valloire (Les Granges du Galibier, 2200-2700 m ; Trois Lacs, 2500 m ; Aig. d'Arves, 3000 m). *Avrieux* (Gd Fond, 2200-2700 m). *Bramans* (Etache, 2000 m). *Sollières* (Savalin Grand Plan, 2100-2500 m ; Pointe Drosset, Lacs Giaset, 2600-2900 m). *Lanslebourg* (Mt Cenis, 2100 m ; Gd Coin Nord, 2400-2700 m). Bessans (Avérole, La Buffa, 2300 m ; Oney, 2500 m). Bonneval sur Arc (Evettes, 2500 m ; Iseran, 2400-2770 m ; Aig. Pers, 2700-3000 m).

### **Eurodryas aurinia** Rottenburg, 1775 [3003]

*Répartition* : Paléarctique. De l'Afrique du Nord aux Balkans, la Russie jusqu'à la Corée. Espèce très répandue en France, elle semble en Savoie commune en montagne, mais plutôt en recul dans les régions les plus basses (ssp. *E. a. aurinia*). Exploite les prés maigres, les pelouses à Gentianes. (230) - 1000 - 2600 - (300). (mi V) - VI - VII - (mi VIII). Eclotions échelonnées suivant l'altitude.

*Variation* : *E. a. aurinia* : en plaine (rare). *E. a. debilis* Oberthür 1909 : plus petit, en montagne (commun). *E. a. glaciegenita* Verity 1928 : sombre, très petit, très localisé sur les hauts sommets (occasionnel). Cette nomenclature est actuellement discutée et en cours de révision.

#### *Localités* :

1) *E. aurinia aurinia* : Serrières, Chindrieux (Chautagne, 230 m). Montcel (C. de la Cluse, 1350-1450 m). Les Déserts (C. de Plainpalais, 1200 m). Thoiry (C. des Prés, 800-1140 m). St Pierre d'Albigny (Les Iles, 280 m ; C. Frêne, 1100 m).

2) *E. aurinia debilis* : Doucy en Bauges (Dent des Portes, 1100-1600 m). St Pierre d'Albigny (Dent d'Arclusaz, 1400 m). Fontaine le Puits (Crève tête, 1500 m). *St Jean de Bille* (Deux Nants, 1500 m). Les Allues (Doron, Tuéda, 1700-1750 m). St Martin de Bille (Val Thorens, 2200-2300 m). Pralognan (Chavière, 1500-1800 m ; Mt Chevrier, Napremont, 2000-2500 m ; C. de la Vanoise, Cirque du Gd Marchet, 2100-2500 m). Tignes (Lac, 2100-2300 m ; Lacs du Chardonnet, 2380 m). *Montvernier* (Le Fragnin, 1200 m). *Jarrier* (Léard, La Balme, 1500-1600 m). *Fontcouverte* (La Rochette Les Trembles, 1500-1700 m). *St Sorlin d'Arves* (Lac Tournant, 2600-2700 m). *St Jean d'Arves* (Vallonnet, 1400 m). *St Julien Mt Denis* (Grény, 1200 m ; Mt Denis, 1500 m). *Albanne* (Le Col, 1600 m). *St Martin la Porte* (Les Râteaux, 1750-1850 m). *Valloire* (Les Verneys, 1700 m). *Orelle* (L'Arcellin, 2200 m). *St André* (Le Col, 1500 m). *Avrieux* (Gd Fond, 2300-2700 m). Termignon (Sentier de l'Arpont, 1350-2000 m). *Sollières, Lanslebourg* (Savalin-C. de Sollières, Fina-Gd Coin Nord Ouest, 2100-2800 m). *Bonneval sur Arc* (C. de l'Iseran Sud, 2200-2770 m).

3) *E. aurinia glaciegenita* : Lanslebourg (Ramasse Turra, 2000-2200 m). *Sollières* (Mt Froid, 2800-3000 m). Peisey (?).

### Conclusion

Il est évident que la plupart des espèces de cette sous-famille, ubiquistes notoires, sont bien présentes en Savoie, et que les listes données n'apportent guère d'enseignements particuliers, hormis peut-être au sujet de leur extension en altitude (c'est malheureusement là où l'on manque le plus de données...).

Il est plus instructif de considérer celles qui ont une aire géographique plus restreinte :

— Dans le cortège « sibérien », ne manquent que deux espèces françaises : *E. matura* et *C. selene* (soit 2 sur 11).

— Dans les différents cortèges « méditerranéens », manquent quatre espèces : *C. jasius*, *P. egea*, *P. pandora* et *B. hecate* (sur 12).

— Enfin une seule boréoalpine est absente (*P. eunomia*) sur huit alpines ou arcto-alpines.

On peut de plus souligner la pénétration relativement faible des deux premiers groupes vers le cœur des massifs montagneux, à l'exception de *M. diamina* : Les sibériens n'ont pas toujours pu pénétrer très avant dans les grandes vallées alpines. Quant aux « méditerranéens », ils ne trouvent sur les versants que des biotopes disjoints, souvent éloignés des aires plus importantes qui constituent les « réservoirs » naturels de leurs populations lorsque par chance leurs plantes nourricières s'y trouvent ! Comme plus tard chez les Lycènes, on notera la présence courante de formes montagnardes généralement plus ternes et plus petites, à des degrés variables (surtout chez les mélitées).

### Bibliographie

- BOURGOGNE J. et DE LESSE H., 1951. — Un Rhopalocère de plus à inscrire au catalogue des lépidoptères de France, *Euphydryas ichnea* Bdv. (*intermedia* Ménétriers). *Rev. Fr. Lép.*, 13 : 143-152.
- DROUET E., 1980. — Le point sur la répartition de *Brenthis daphne* Schiff. en France. *Bull. Sc. Nat.*, 28 : 12-15.
- NICOLLE M., 1977. — La répartition en France de *C. titania* Esper. *Alexanor*, 10 (3) : 100-105.
- NICOLLE M., 1979. — Deuxième note sur *C. titania* Esper en France. *Alexanor*, 11 (3) : 141-144.
- PLANTROU J., 1960 — Note sur la répartition en France de *C. titania* Esper. *Alexanor*, 1 : 198-200.

### NYMPHALIDAE SATYRINAE

J'ai pu étudier un nombre de données très satisfaisant grâce à la contribution de deux collègues MM. WILLIEN et ESSAYAN qui effectuent le recensement au plan national.

Les données se répartissent de la manière suivante :

— C.I.E. - S.F.F. : 500 dont 440 pour les *Erebia*,

— personnelles : 500, toutes postérieures à 1980,

— origine diverse : 1 330 réparties entre une vingtaine de personnes.

Soit un total de 2 330 données pour les 45 espèces concernant le territoire considéré auxquelles il faut ajouter 3 espèces douteuses vu l'ancienneté et le petit nombre des indications les concernant.

**Melanargia galathea** Linnaeus, 1758 [3005]

*Répartition* : Holoméditerranéenne : du Maghreb à l'Iran par l'Europe (sans la Scandinavie), l'Asie mineure et le Caucase. En France et en Savoie, est présent partout, sauf vraiment en altitude, avec un habitat très varié, car c'est une espèce peu exigeante. Semble néanmoins préférer les prés maigres et les friches de l'étage collinéen. 230 - 1600 - (2000) m. VI - VII - VIII.

*Variation* : Forme femelle *M. g. leucomelas* peu signalée : 1 ex. Mt Clergeon, Ruffieux (950 m, FOURNIER, 1986) ; 1 ex. Mt Revard (C. de la Cluse, 1250 m, LEBRET, 1974).

*Localités* (toutes récentes) : Yenne, Vions, Chanaz, Serrières, Chindrieux (Chautagne), Brison : 230 m. Chambéry (Les Monts, 300-500 m). Montagnole (Pas de la Fosse, 800 m). Le Bourget du Lac (230-500 m). St Jean de Chevelu (Monthoux, 500-700 m). Novalaise (450 m). La Biolle (400 m). Thoiry (C. des Prés, Fougère, 800-1100 m). Les Déserts (C. de Plainpalais, 1000 m). Montcel (C. de la Cluse, 1200 m). *Arbin, Cruet* (C. de Marozaz, 400-800 m). Jarsy (Bellevaux, 800-1000 m). Doucy en Bauges (Le Golet, 1500 m). St Jean de la Porte (Montlambert, 300-800 m). St Pierre d'Albigny (300-1200 m). Villard sur Doron (700-1100 m). *Ugine* (Vérel, 1100 m). *St Jean de Belleville* (Nant Brun, 1100-1250 m). Fontaine (1000-1200). St Marcel, Brides, Salins (600-700 m). Aime (750-800 m). Les Allues (Tuéda, 1700-1750 m). Les Chapelles (1000-1200 m). Bourg St Maurice (Versoyen, 800-1750 m). (Les Prioux, 1800-1900 m). Montsapey (les Platières, 1300-1500 m). Montgellafrey (1300-1500 m). *St Etienne de Cuines, La Chambre, ND du Cruet, Pontamaffrey* (450-700 m). *St Alban, St Colombar des Villards* (770-1600 m). *Albiez Montrond, St Julien Mt Denis, St Martin la Porte, St Jean de Mne, Hermillon, Montricher* (600-1000 m). *Jarrier* (1200-1400 m). *St Pancrace* (800-1300 m). *Fontcouverte, Villarembert* (850-1700 m). *Orelle* (1000 m). *Villarodin* (Bourget, 1150 m). *Aussois* (1500 m). Termignon (1400 m). Lanslebourg (Mont Cenis, 2000 m).

**Hipparchia fagi** Scopoli, 1763 [3009]

*Répartition* : Pontoméditerranéenne : du nord de l'Espagne au sud de la Russie, sans atteindre la Mer du Nord ni la Baltique. Elle est absente du quart nord-ouest de la France, et atteint sans doute l'ouest du département de la Savoie. Quelques colonies très localisées sont plausibles dans les bassins chauds des grandes vallées alpines : coteaux buissonneux. 230 - 900 m (?). VII.

*Localités* : (méritent toutes confirmation très sérieuse, plusieurs correspondants ayant déjà rectifié des erreurs, en particulier au sujet de femelles de grande taille, *H. alcyone* étant prise pour *H. fagi*...). St Jean de Chevelu (C. du Chat, vignes, 500-700 m) ; Lucey (Rive du Rhône, 230 m) ; St Germain la Chambotte (560-650 m) (G. DENIZE) ; Thoiry (C. des Prés sud, 850 m ; A. CHAULIAC). St Marcel, Brides (600-700 m ; NEL, ROUX).

**Hipparchia alcyone alcyone** Denis et Schiffermüller, 1775 [3010]

*Répartition* : Holoméditerranéenne : Atlas, Espagne, Europe centrale jusqu'en Asie mineure, Liban, Caucase et Kurdistan. Espèce mal connue, présente au sud-est d'une diagonale « Landes-Lorraine », localisée en Savoie dans les bassins chauds et sur les coteaux bien exposés. (400) - 600 - 1200 - (1500) m. mi VI - VII - VIII.

*Variation* : *H. alcyone genava* Fruhstorfer, 1907 serait la forme présente en Savoie.

*Localités* : St Germain la Chambotte (Mt Cessens, Mt Corsuet, 700-1000 m). *Lullin* (600 m). Trévignin (800 m). Arith, Lescheraines (Chéran, 600 m). Thoiry (C. des Prés, 950 m). St Pierre d'Albigny (Miolans, La Noiriât, La Planta, Roissarve, 400-700 m). St Jean de la Porte (Montlambert, 300-800 m). Fontaine le Puits, *St Jean de Belleville* (700-1100 m). Aime (Villette, 800 m). *St Alban des Villards* (Glandon, 770 m). Hermillon (Mt André, 600-1100 m). *St Julien Mt Denis* (700-1200 m). *Montricher* (St Félix, 700-800 m). *St Pancrace* (800-1100 m). *Fontcouverte* (Arvan, Merderel, Idioule, 670-1400 m). *Jarrier*

(Sapey, 1300-1500 m). *Villarembert* (Roset, Chaperelles, Orgières, 1300-1500 m). *St Martin la Porte* (750-800 m). *Modane, Avrieux, Aussois* (1100-1400 m).

*Localités anciennes ou imprécises* (mais fort probables !) : *Novalaise* (700 m). *St Michel de Mne. Valloire*.

### **Hipparchia semele** Linnaeus, 1758 [3012]

*Répartition* : Holoméditerranéenne : Toute l'Europe, y compris la Grande Bretagne et le sud de la Scandinavie, la Russie et l'Arménie. En Savoie comme ailleurs en France, on doit le rencontrer partout jusque vers 2000 m et plus. Jamais très abondant, il se montre par exemplaires isolés sur les sentiers forestiers caillouteux ou les pelouses xérothermes. 700 - 1500 - (1900) m. mi V - début IX.

*Localités* : Aime (Villette, Plan Villard, 750-1200 m), Bourg St Maurice (Les Arcs, 1900 m, G. JACOB). Peisey Nancroix (1200 m, LERAUT). St Jean de Mne (Tilleret, 700 m ; Plan Gondran, 600 m). St Julien Mt Denis (Ste Anne, 700 m), Fontcouverte, Jarrier (Le Sapey, 1280-1500 m), St Pancrace, 900-1500 m), Hermillon (Mt André, 1000-1100 m), Aussois (1500 m) ; (SAVOUREY). St Sorlin d'Arves (Envers du Plan, 1650 m), Jarrier (Varcinières, 1200 m) ; (GALAND-GAUTHIER). Villarodin (Bourget, 1200 m), Modane (1100 m) ; (ESSAYAN).

*Localités anciennes ou imprécises* : Montagnole (Pas de la Fosse, 800 m, ROBERT). *Novalaise* (700 m, JACOVIAK). Grésey sur Aix, Sééz, St Michel de Mme (WHEELER). Lanslebourg (CATHERINE). Pralognan la Vanoise (MOLLET).

### **Chazara briseis** Linnaeus, 1764 [3016]

*Répartition* : Holoméditerranéenne : Maghreb, Europe moyenne et méridionale jusqu'au Pamir et l'Altaï. Très dispersé en France au sud d'une ligne « Angers-Bourges-Dijon-Strasbourg », et bien répandu seulement dans le quart méridional, il n'a été signalé en Savoie que de l'ouest du département, dans des pelouses xérothermes ou des rocailles buissonneuses de Chartreuse et des Bauges, vers 800 m (VIII).

*Localités* : St Pierre d'Entremont (800 m, ESSAYAN, 1972). La Thuile (800 m, ESSAYAN, 1974). Montagnole (Pas de la Fosse, 800 m, ROBERT, 1944-1945). *Lescheraines* (MNHP, 1907). Grésey sur Aix (TUTT, 1894).

### **Oenis glacialis** 1783 [3017]

*Répartition* : Alpine européenne : Des Alpes Maritimes à l'Autriche uniquement. Il occupe en France l'arc alpin central et l'est de la Drôme. On ne le trouve en Savoie que sur les pentes à pelouses rases et sèches de l'étage alpin des hauts sommets de l'Est, du Sud, et de la Vanoise. 1900-2700 m. fin VI - VII - début VIII.

*Localités* (toutes récentes) : Pralognan (Napremont, Mt Chevrier, Gd Marchet, Mt Bochor, Chavière, 2000-2500 m, BOURGOGNE). Champagny (Bozelet, 2100 m, HERES). Tignes (Lacs du Chardonnnet, 2500-2600 m, ROUX). Lanslebourg, Sollières (Turra, 200-2200 m ; Malamot, Rostin, Lacs Giaset, C. de Sollières, 2200-2800 m, GALAND G./SAVOUREY). Bessans (Avérole, 2200 m, GALAND G. ; Grand Fond, 2700 m, ROUX). Bonneval sur Arc (Les Evettes, 2500 m, VIGNERON/BOUHIN). Valloire (C. du Galibier, 2300 m, NEL). St Colomban des Villards (Gandon sud, 2150 m, VARENNE). St Sorlin d'Arves (Col de la Croix de Fer, 2100 m, CUSIN ; Lac Tournant, 2500-2700 m, SAVOUREY).

### **Satyrus ferula** Fabricius, 1793 [3019]

*Répartition* : Pontoméditerranéenne : Atlas, Sud Est de la France, Apennins, Alpes, Balkans, Asie mineure, jusqu'en Himalaya. Plutôt limité à la France du Centre et du Sud Est, il aime en Savoie les adrets les mieux

exposés aux flancs des grandes vallées alpines : talus pierreux, coteaux secs. (430) - 600 - 1500 - (2050) m. VI - VII (surtout) - VIII.

*Localités* : Chignin, Curienne (La Roche, 650-800 m). Chambéry (Les Monts, 500 m). Montagnole (700-800 m). Thoiry, Aillon le Jeune (C. des Prés, 1150-1200 m). St Pierre d'Albigny (Miolans, La Noiriât, La Planta, Roissarve, 500-700 m). St Marcel, Brides (600-700 m). Fontaine (1000 m). *St Jean de Belleville* (1250 m). Centron, Aime (Villette, 700-800 m). Bourg St Maurice (Versoyen, 2050 m). Les Chapelles (1000-1200 m). *La Chambre* (430 m). *St Etienne de Cuines*, *St Alban des Villards* (Glandon, 600-1000 m). *Montpascal* (1500 m). *Hermillon* (Mt André, 600-1000 m). *Jarrier* (Varcinières, Le Sapey, 1200-1500 m). *St Pancrace* (Route des Colonnes, 800-1300 m). *Villarembert* (Taraveray, Chaperelles, 1100-1400 m). *Fonicouverte* (Arvan, Merderel, 670-850 m ; Comborsière, 1800 m ; La Rochette, 1300-1400 m). *St Julien Mt Denis* (Ste Anne, 700 m). *Orelle* (Orelette, 1000-1100 m). *Albiez Montrond* (Gévoudaz, 800-1000 m). *Aussois* (1400 m). *Bramans* (Arc rive droite, 1300 m). *Modane* (1100 m). *Villarodin* (Bourget, 1200 m). Termignon (1400 m).

*Localités anciennes ou imprécises* : Aix les Bains. Pralognan. Peisey. Bozel. Moutiers. Séez (Chavonnes, 1300 m). St Jean d'Arves (Le Rieux, 1300 m). Valloire. Lanslebourg. Lanslevillard.

### **Minois dryas** Scopoli, 1763 [3022]

*Répartition* : Sibérienne : du nord de l'Espagne au Japon sans atteindre l'Arctique ; en France des trois quarts sud est (sauf midi méditerranéen), mais avec une pénétration très réduite dans la partie nord des Alpes : il n'a pas été signalé en Savoie plus à l'est que le confluent Arc-Isère, et il ne s'élève guère au dessus de l'étage collinéen, habitant des zones boisées d'humidité variée, et plus rarement des pentes herbeuses sèches. 230-900 m. mi VII - VIII (surtout).

*Variation* : Les populations savoyardes se rattacheraient à la race *M. d. dymaea* Fruhstorfer.

*Localités (toutes récentes)* : Serrières, Chindrieux, Vions (Chautagne, 230 m). Brison (Coteau du lac, 300 m). Grésy sur Aix (Gorge du Sierroz, 350 m). Mouxy (700 m). St Germain la Chambotte (Mt Corsuet, 500-700 m). Chambéry (Les Monts, 500 m). St Jean de Chevelu (Vignes, C. du Chat, 600 m). Chignin (500 m). Montagnole (Pas de la Fosse, 800 m). Curienne (700 m). La Thuile (820 m). Cruet (C. de Marozaz, 900 m). St Jean de la Porte (Montambert, 300-800 m). St Pierre d'Albigny (280-700 m). Aiton (La Sise, 300 m).

### **Brintesia circe** Fabricius, 1775 [3023]

*Répartition* : Holoméditerranéenne : de l'Espagne à l'Himalaya en passant par l'Asie mineure et l'Iran. Des trois quarts Sud est de la France, il remonte depuis la combe de Savoie les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise jusqu'à Aussois et Aime. Hôte des landes buissonneuses et des forêts claires (chênaies) bien ensoleillées, il aime se reposer sur les troncs ou les pierres chauffées par le soleil. (230) - 400 - 1000 - (1600) m. VII - VIII - IX.

*Localités* : St Germain la Chambotte (Col, Mt de Cessens, 850-950 m). Ruffieux (Mt Clergeon, 900-1000 m). St Jean de Chevelu (600-700 m). Brison, Chindrieux, Chanaz (Rives du Rhône, 230 m). Billième (Gerbaz, 450 m). Chambéry (Les Monts, 300-500 m ; Jacob, 400 m). Cruet, La Thuile (C. de Marozaz, 800-1000 m). Thoiry (C. des Prés, 950 m). Aiton (300 m). St Pierre d'Albigny (300-900 m). St Jean de la Porte (Route de Montlambert, 300-800 m). Brides (700 m). St Marcel (650-700 m). Aime (Villette, 750-800 m). Fontaine le Puits (1100 m). Valezan (1200 m). Montsapey (800-1000 m). La Chambre (430 m). St Avre (470 m). St Alban des Huretères (Gd Cucheron, 1000 m). *St Alban des Villards* (770 m). *Jarrier* (Le Sapey, 1400-1550 m). *St Jean de Mne*, *St Julien Mt Denis*, *St Martin la Porte* (600-800 m). *St Pancrace* (900-1600 m). *Fontcouverte* (800-1550 m). *Villarembert* (1400-1550 m). *Villarodin* (Bourget, 1350 m). *Aussois* (1550 m).

*Localités anciennes ou imprécises* : Novalaise (500 m). Montagnole (800 m). Lescheraines. Montcel.

**Arethusana arethusa** Denis et Schiffermüller, 1775 [3024]

*Répartition* : Atlanto-pontoméditerranéenne : Eurasie occidentale et Centrale ; un peu partout en France, sauf Bretagne et Cotentin. Sa présence reste douteuse en Savoie, bien qu'elle soit certaine des environs immédiats : Ain, région Grenobleise, Oulx et Cesana en Piémont... Son habitat serait constitué de pelouses xérothermes. (Vol : VIII).

*Localités* : Challes, Yenne (données anciennes à confirmer).

**Erebia ligea** Linnaeus, 1758 [3027]

*Répartition* : Eurasiatique : Très répandu du Massif central au Japon en passant par l'Oural, la Scandinavie et la Chine. Absent d'Armorique et des Pyrénées (il n'y a plus aucun *Erebia* en Armorique), on le rencontre à peu près partout en Savoie, sauf au-delà de 2000 m. Il n'a pourtant pas encore été signalé du nord du Beaufortain et de très haute Maurienne. Il habite la plaine mais surtout la moyenne montagne : bois clairs de conifères, prairies alpines et subalpines. (500) - 800 - 1600 - (2000) m. VII (surtout) - mi VIII.

*Variation* : *E. l. carthusianorum* Fruhstorfer, 1909 (un peu plus grand que le type scandinave).

*Localités (toutes récentes)* : Ruffieux (Pas de Clergeon, 900 m). Le Bourget du Lac (Mt du Chat, 1200-1500 m). Apremont (C. Granier nord, 900-1130 m). St Pierre d'Entremont (St Mème, 650-850 m). St François de Sales (Gralette, 1300 m). Montcel (N 513, C. de la Cluse, 500-1260 m). Les Déserts (Mt Revard, 1300-1450 m ; Bois Brûlé, 1350 m ; Plainpalais, 1200 m). Aillon le J. (C. du Lindar nord, 1180 m). Puygros (Fenestre, 800 m). Thoiry (D 206, 850-950 m). Jarsy (Combe d'Ire, 1200-1600 m). St Pierre d'Albigny (C. du Frêne, 600-1100 m). Beaufort (Route de Roselend, 1100 m, 1500-1600 m). Aigueblanche (Vorchère, 1800 m). Fontaine (1100 m). *St Jean de Belleville* (Vers la Roche, 1250 m). Les Allues (Scierie, 1100 m ; Doron, 1400 m ; Villages, 1500 m ; Tuéda, 1700-1750 m). Planay (Plan Fournier, 1700-1800 m). La Perrière (Formier, 1400-1800 m). Bellentre (Les Bauches, 1900 m). Pralognan (Chavière, Le Plan Pte de Villeneuve, 1500-1600 m ; Doron, La Croix, 1200-1400 m). Aime (Planvillard, 1200 m ; Forêt de Tessens, 1500-1800 m). Bourg St Maurice (Versoye, 1300 m). Sééz (Rte du St Bernard), Arvillard (Val Pelouse, 1500 m). Montsapey (Les Pâtisères, 1300-1500 m). *St Alban des Villards* (770 m). *Albiez Montrond* (Gevoudaz, La Cochette, 900-1450 m). *Jarrier* (Le Sapey, 1550 m). *St Pancrace* (Les Bottières, 1200-1300 m). *Fontcouverte* (Merderel, 750-800 m ; Taraveray, 110-1300 m). *Villarembert* (Orgières Garney, 1500-1550 m). *St Jean de Mne* (Le Tilleret, 700 m). *Aussois* (Route de Modane, 1400 m).

**Erebia euryale** Esper, 1805 [3028]

*Répartition* : Eurasiatique boréo-alpine : du nord de l'Espagne à l'Altai en aires disjointes. En France dans les régions montagneuses, des Pyrénées au Jura par l'Auvergne et l'arc alpin. Présent à peu près partout en Savoie au dessus de 1200 m, rarement plus bas, il y préfère les bois clairs (conifères surtout), mais aussi les prairies de lisières ou les alpages (il s'élève nettement plus haut que *E. ligea*). 1000 - 2000 - (2800) m. mi VI - mi VIII.

*Variation* : *E. e. euryale* :

— la forme *E. e. isarica* Heyne, 1895 serait la race géographique du nord des Bauges, des Aravis et de l'ouest du Beaufortain. (cf. DE LESSE, 1947 ; 1951).

— la forme *E. e. adyte* Hübner, 1822 serait celle du reste du département.

*Localités* : Montcel (Mt Revard, 1300-1450 m). Thoiry (Sauget, 800-1000 m). Doucy en Bauges (1500-1600 m). Jarsy (Combe d'Ire, 1400-1700 m). *Beaufort* (Lac des Fées, 1600-1900 m). La Giétaz (C. des Aravis, 1600-2000 m). Hauteluze (C. des Saisies, 1600-1700 m).

La Girotte, 1650 m). *St Jean de Belleville* (Nant Brun, 1250-1850 m). Les Allues (Doron, 1900-2100 m). *St Martin de Belleville* (Ménuires, 1700-2000 m). Champagny (Friburget, 1500 m). Pralognan (Chavière, Mt Bochor, 1500-2000 m). ND du Pré (1600 m). Aime (La Plagne Mt Biolley, 2100-2300 m). Aigueblanche (Vorchère, 1800 m). Bourg St Maurice (Versoyen, 2000 m ; Les Chapieux, 1600-1800 m ; Aig. rouge, 2150 m). Sées (Rte du St Bernard, 2100 m). Montvalezan (Le Châtelard, 1600 m). Ste Foy Tse (La Thuile, 1100-1300 m ; Le Monal, 1870 m). Villaroger (La Guraz, 1700 m). Tignes (1900-2000 m). Val d'Isère (Solaise, 1900-2200 m). *Celliers, St François Longchamp* (C. de la Madeleine, 1900-2100 m). *St Colomban des Villards* (Glandon, 1600 m ; Chapat Gd Truc, 2200 m). *St Sorlin d'Arves* (Croix de Fer, 1600-2100 m ; Plan de la Guerre, 2100-2200 m). *St Jean d'Arves* (Pré Rieux, 1300 m ; C. d'Arves, 1600-1700 m). *Jarrier* (Le Sapey, 1500-1600 m). *Albiez Montrond* (Le Pacqueret, La Motte, 1700-2100 m). *Fontcouverte* (Luosselet, Comborsière, Grd Truc Chapat, 1500-2200 m). *Villarembert* (Garney, 1600-1700 m). Valloire (Plan Lacha Mottets, 2000-2100 m). Villarodin (1200 m). Aussois (La Loza, 1800 m, *Rte de Modane*, 1400-1500 m). *Bramans* (Le Planay, 1600 m. La Savine, 2300 m). Termignon (Le Mont, 2000 m). *Lanslebourg* (Mt Cenis, Savalin, Turra, 2000-2200 m). Bessans (*La Goulaz*, 1750 m ; *Ribon*, 2000 m ; Avérole, 2200 m ; La Buffa, 2000 m). Bonneval sur Arc (L'Écot, 1900-2000 m).

### **Erebia manto** Denis et Schiffermüller, 1775 [3029]

*Répartition* : Alpine européenne : En aires disjointes jusqu'aux Carpates ; en France cité des Pyrénées, Cantal, Mont Dore, Alpes du nord ouest et Mercantour. Sans doute assez dispersé en Savoie, il n'a curieusement presque pas été signalé de la moitié sud est du département (malgré mes propres recherches assidues en Maurienne !). On le trouve, en colonies parfois très prospères, dans les prairies subalpines et alpines à végétation dense, même arbustive. (1000) - 1200 - 2000 - (2800) m. VII - VIII. surtout fin VII - mi VIII.

*Variation* : Il règne encore une certaine confusion dans la nomenclature de cette espèce, car les caractères généraux des populations sont encore mis sur le même plan que des caractères propres à des variations internes à ces populations... En collaboration avec M. F. CUPEDO, nous tentons actuellement d'éclaircir les choses et, en en première analyse, il semblerait que :

— Les Préalpes (Chartreuse, Bauges, Aravis) et le Beaufortain abriteraient la race *E. m. mantoides* Esper, 1804, et ceci de manière très homogène, c'est-à-dire sans altération notable des caractères typiques vers des formes différentes (comme par exemple *E. m. pyrrhula* Frey, 1880, plus sombre et peu orné).

— Le Grand Arc, Belledonne, la Vanoise seraient peuplés par des races plus grandes et plus colorées proches de la race *E. m. valmaritima* Floriani, 1965, avec en Vanoise une bonne proportion de femelles pâles du type *E. m. bubastis*.

Bien entendu ces hypothèses demandent à être vérifiées, car nous n'avons pu pour l'instant qu'effectuer des observations limitées d'habitats et de genitalia.

*Localités* : Apremont (C. du Granier, 1135 m). Les Déserts (C. de Plainpalais, 1200 m). Aillon le Jeune (Mt Margeriaz, 1700-1800 m). St Pierre d'Albigny (C. du Frêne, Arclusaz, 1200-1700 m). Ste Reine (Morbidié, 1200-1300 m). Doucy en Bauges (Dt des Portes, 1100-1900 m). Jarsy (Combe d'Ire, Forêt de Bellevaux, 1100-2000 m). La Giétaz (C. Aravis, 1800 m). Beaufort (Roslend, 1600-2000 m ; Combe de la Neuva, 2000-2300 m). *Arêches* (Mt Mirantin, 1700 m). La Léchère (Nant du Beurre, 2100-2400 m). *St Jean de Bille* (Nant Brun, 1250-1850 m). Pralognan (La Croix, 1400 m ; Gerlon, 1600 m ; Napremont, 1500-2000 m ; Chavière, 1800 m). Aime (La Côte, 1300 m). Tignes (Lac de la Sassièrre, 2270 m). Bourg St Maurice (Chapieux, 1600-2000 m ; Versoye, 1600-2000 m ; Collet des Rousses, 2600-2800 m). Sées (Les Ecludets, 1100 m ; Le Combottier, 1900 m). Montsapey (Gd Arc, les Platières, 1450-1700 m). Montgellafrey (1400-1600 m). *St François Longchamp* (C. de la Madeleine, 1900-2200 m).

*Localités imprécises* : Bozel, Val d'Isère, Bessans.

**Erebia epiphron** Knoch, 1783 [3030]

*Répartition* : Alpine européenne : très commun de la chaîne cantabrique aux Carpathes, et dans toutes les montagnes françaises (sauf le Jura), y compris en Savoie où il reste néanmoins assez peu signalé de certains massifs (Chartreuse, Bauges et Belledonne). On devrait pourtant l'y découvrir, car il est parfois très localisé sur quelques ares de prairies (parties humides), ou près des sources et des micro-tourbières des étages alpin et subalpin. (1400) - 1600 - 2200 - (2800) m. fin VI - VII - VIII.

*Variation* : *E. e. aetheria* Esper, 1805 et sa forme d'altitude (plus sombre) *E. e. nelamus* Boisduval, 1828.

*Localités* : Jarsy (Combe d'Ire, 1900 m). La Giétaz (C. des Aravis, 1800-2000 m). Beaufort (Cornet de Roselend, 1900-200 m). St Martin de Belleville (Les Ménuires, 1700-2500 m ; Val Thorens, 2200-2500 m). La Léchère (Nant du Beurre, 2100-2400 m). Pralognan (C. de Napremont, Mt Chevrier, 2000-2200 m ; Cirque du Gd Marchet, 200-2500 m ; Mt Bochor, Glières, 200-2100 m). Peisey (La Guraz, 1700 m ; C. de La Chal, 2550 m). Bourg St M. (Versoye, 1800-2100 m ; Les Chapieux, 1600-1800 m ; Aig. Rouge, 2150 m). Granier (Forêt, 1500-2000 m). Aime (Mt Biolley, 2100-2300 m ; Tessens, 1500-2000 m). Séez (Col du Pt St Bernard, Lancebranlette, 2100-2500 m). Tignes (Lacs de Tignes et du Chardonnet, 2000-2500 m). Arvillard (Val Pelouse, 1500 m). *St Colomban des Villards* (Glandon, 1500-2000 m ; Prés du Rivage, 1900-2100 m ; Olle, 1900-2000 m ; Gd Truc, 1800-2200 m). *St Sorlin d'Arves* (C. de la Croix de Fer, C. des Lacs, Lac Tournant, 2000-2550 m ; Ouillon Est, 2200-2350 m). *Fontcouverte* (Comborsière, Pierre du Turc, 1800-2300 m). *Villarembert* (Garney, 1650-1800 m). *St Martin la Porte* (C. des Encombres, 1850 m). Valloire (C. du Galibier 2400-2600 m). Aussois (La Loza, 1800-2000 m). Termignon (Arpont, 1800-2000 m). *Lanslebourg* (L. de l'Ouillon, 2300 m ; Lac du Mt Cenis, 2000-2100 m). *Sollières* (Savalin, Pt Mt Cenis, 200-2200 m ; Pte Droset, 2600-2700 m). *Bessans* (Ribon, 2000-2300 m ; la Buffa, 2400-2700 m ; Arnès, 2200-2500 m). Bonneval sur Arc (C. de l'Iseran Sud, 2550-3000 m).

*Localités anciennes ou imprécises* : Argentine. Val d'Isère. St Jean d'Arves (Pré Rieux, 1400 m).

**Erebia pharte** Hübner, 1804 [3032]

*Répartition* : Européenne (Alpes et Monts Tatras). En France, du Mercantour au Haut Chablais, à l'est du 6° méridien. Assez dispersé en altitude dans tous les massifs savoyards (sauf la Grande Chartreuse), on le rencontre dans les prairies alpines ou subalpines humides, et assez souvent en compagnie de *C. palaeno* et *V. optilete* dans les landes arbustives (*Rhododendron*, *Vaccinium*...). (1400) - 1800 - 2300 - (2700) m. VII - mi VIII.

*Variation* : *E. pharte pharte*, *E. p. thynias* Fruhstorfer, 1911 (plus petit) et l'aberration *E. p. phartina* Staudinger (presque sans taches).

*Localités* : Jarsy (Combe d'Ire). St Pierre d'Albigny (C. du Potat, Arclusaz, 1300-1700 m). Doucy en Bauges (Dent des Portes, 1400-1600 m). La Giétaz (C. des Aravis, Châlet du curé, 1400-1600 m). Beaufort (Lac et Cornet de Roselend, 1560-2200 m). St Bon (Courchevel, 1900 m). St Martin de Bille (Val Thorens, 2000-2500 m). *St Jean de Belleville* (Nant Brun, 1750 m). Pralognan (Mt Chevrier, 1600-2500 m ; Rocher de Villeneuve, 1500-2000 m ; Les Fontanettes, 1800-2100 m ; Gd Marchet, 2000-2500 m ; Vallée de Chavière, 1450-1950 m ; C. de Napremont, 2000-2200 m). Peisey (la Guraz, Rosuel, 1700-2000 m). Aime (Mt Biolley, 2100-2300 m ; Tessens, 1500-2200 m). Bourg St Maurice (Versoyen, 2050 m ; Aig. Rouge, 2150 m). Séez (Lancebranlette, 2100-2600 m). Tignes (Lac, 2100-2300 m). Val d'Isère (Prariond, 2200 m). *St François Longchamp* (C. de la Madeleine, 1900-2200 m). *St Sorlin d'Arves* (C. de la Croix de Fer, 2000-2100 m ; C. des Lacs, 2400 m ; Envers du Plan, 1650 m). St Colomban des Villards (Glandon, 1600-1900 m ; *Chaput Ouest*, 1900-2200 m ; Pré du Rivage, 1800-2100 m). *Villarembert* (Garney, 1600 m). *Fontcouverte* (Gd Truc, 1800-2200 m ; *Chaput Est*, 2000-2200 m). *Albiez Montrond* (La Motte, 2200 m). Valloire (Plan Lacha Mottets, 1950-2100 m). Termignon (Arpont, 2000-2200 m). *Bonneval sur Arc* (Iseran Sud, 2000-2700 m).

*Localités anciennes* : St Jean d'Arves (Pré Rieux, 1400 m). Lanslebourg (Mt Cenis, Gd Coin, 2100-2600 m).

**Erebia melampus** Staudinger, 1861 [3033]

**Répartition** : Européenne ; limitée aux Alpes et à l'Europe Centrale. Il doit surtout peupler en Savoie les massifs les plus internes, sans doute à l'est des vallées de l'Arvan et du Nant Brun (actuellement en cours de séparation d'avec *E. sudetica*). Il habite surtout les prairies alpines, Mais descend parfois plus bas sur des pentes herbeuses variées. (1100) - 1300 - 2200 - (2500) m. V - VII - mi VIII - (fin VIII).

**Variation** : *E. melampus tigranes* Fruhstorfer, 1910.

**Localités (toutes récentes)** : La Giétaz (Aravis, 1900-2000 m). Hauteluce (C. des Saisies, 1600-1700 m). Beaufort (Roselend, 2200 m). Granier (1800 m). Arêches (Mt Mirantin, 1700 m). Aime (Mt Biolley, 2100-2300 m). Bellentre (Les Bauges, 1500-1900 m). St Martin de Bille (Val Thorens, 2200 m). St Bon (1100-1300 m). ND du Pré (1350 m). Les Allues (Villages, Doron, Altiport, 1500-2000 m). Pralognan (Chavière, 1500-1800 m ; Fontanettes, 1650-2000 m ; Rocher de Villeneuve, 1300-1800 m). Planay (Route, 1200 m). Champagny (Le Bois, Friburget, Laisonnay bas, 1470-1560 m). Séez (Beaupré, C. du Pt St Bernard, 2000-2100 m). Bourg St Maurice (Les Chapieux, 1600-1800 m ; Versoye, 1600-1900 m ; Aig. Rouge, 2150 m). Tignes (2100-2300 m ; L. de la Sassièrre, 2460 m). Val d'Isère (Prariond, 2500 m). *Albiez Montrond* (Pacqueret, 1800-1900 m). Valloire (Plan Lacha Mottets, 1900-2100 m). Valmeinier (Le Désert, 1600-1800 m). Aussois (La Loza, 1800 m). Termignon (Sentier de l'Arpont, 1350-2000 m). Lanslebourg (Turra, 2000-2200 m). Bessans (Ribon, 2000 m). Bonneval sur Arc (L'Écot, 1900-2000 m).

Quelques-unes de ces indications demandent à être revérifiées, vu la séparation en cours des deux espèces *E. melampus* et *E. sudetica*, surtout aux abords des limites occidentales de la Vanoise (zone transitoire supposée...). Les détenteurs d'informations à ce sujet sont priés de les transmettre à M. F. CUPÉDO ou à moi-même.

**Erebia sudetica** Staudinger, 1861 [3034]

**Répartition** : Européenne, du Massif central aux Alpes et la Silésie. Bien connue en France du Cantal, cette espèce est présente également en Isère et en Savoie (découverte récente). Elle est en cours de localisation dans le massif de Belledonne, le Grand Arc, et les vallées de l'Arvan, du Glandon, du Bugeon, et aussi près de Moutiers. Les habitats repérés sont des herbages en limite de secteurs boisés ou des prairies alpines. (600) - 1400 - 2200 m. mi VIII - (fin VIII).

**Variation** : Forme non précisée (*inalpina* ?).

**Localités (séparation de *E. melampus* en cours)** : Montsapey (Gd Arc, 1400 m). ND des Millières. Arvillard (Val Pelouse, 1500 m). *St Jean de Bille* (1750 m). Montgellafrey, *St François Longchamp* (Bugeon Madeleine, 1400-2000 m). St Etienne de Cuines (600 m). *St Pancrace* (1300 m). *Fontcouverte* (La Rochette, La Toussuire, Comborsière, Chaput, 1500-2100 m). *Villarembert* (La Baye, C. d'Arves, Garney, Orgières, 1550-1700 m). St Coloman des Villards (La Chal, Léchet, Glandon, Oille, 1200-2100 m ; *Chaput ouest*, 1800-2100 m). *St Jean d'Arves* (Pré de Lore, 1900 m). *St Sorlin d'Arves* (Plan de la Guerre, Torret, 2000-2200 m).

**Erebia aethiops** Esper, 1777 [3035]

**Répartition** : Eurasiatique (sibérienne) : du centre de la France au Caucase et l'Altaï, sans atteindre l'Arctique. En France, cette espèce est absente des Pyrénées et disparue d'Armorique. En Savoie, elle est très commune partout, bien qu'encore assez peu signalée de Hautes Maurienne et Tarentaise. On la trouve surtout dans des secteurs plus ou moins boisés, principalement de conifères, ou dans leur voisinage immédiat (prairies subalpines). (230) - 600 - 1600 - (2200) m. VII - VIII. surtout mi VII - mi VIII.

**Variation** : *E. a. sapaudia* Fruhstorfer, 1917 (vivement coloré : Revard, Cessens) ; forme *E. a. altivaga* Fruhstorfer, 1917 (petit et foncé, en altitude).

*Localités* : St Pierre d'Entremont (St Même, 600-850 m). Apremont (C. du Granier, 1140 m). Montagnole (Pas de la Fosse, 800 m). Vions, Yenne (230 m). St Jean de Chevelu (500-700 m). Ruffieux (Mt Clergeon, 900-1000 m). St Germain la Chambotte (Mt Corsuet, Mt Cessens, 500-900 m). Moux (700 m). Montcel (Le Revard, 500-1500 m). Les Déserts (La Féclaz, 1300 m). Puygros (Fenestre, 800 m). Thoiry (C. des Prés, 800-1180 m). La Thuile (C. du Lindar, 1100 m). Doucy en Bauges (Dent des Portes, 1000-1600 m). Jarsy (Bellevaux, Combe d'Ire, 1400 m). St Pierre d'Albigny (C. du Frêne, 600-1200 m). La Giétaz (Aravis, 1700-1800 m). Beaufort (Rte Saisies, 800 m. Roselend, 1500 m). Moutiers, St Marcel (600 m). Fontaine le Puits (900-1000 m). *St Jean de Belleville* (Nant Brun, 1250-1750 m). St Martin de Bille (Les Ménuires, 1900 m). St Bon (Courchevel, 1900 m). Pralognan (Rocher de Villeneuve, 1300-1800 m). Aime (Villette, 750-800 m ; Plan Villard, 1200 m). Bourg St Maurice (Versoyen, 1200-1300 m ; Les Chapieux, 1600 m). Sééz (Les Ecludets, 1100 m). Val d'Isère (Solaise, 2000 m). Arvillard (Val Pelouse, 1500 m). Montsapey (Gd Arc, 1300-1500 m). *St Martin sur la Chambre* (Montoudras, 800 m). *Montgellafrey* (1400-1600 m). St François Longchamp (C. de la Madeleine, 1900-2000 m). *St Etienne de Cuines, St Alban et St Colomban des Villards* (Glandon, 600-800 m, Léchet, 1400 m). *Villarembert* (Taraveray, 1100-1300 m). *St Jean d'Arves* (Entraigues, 1300 m). *Albiez Montrond* (Pacqueret, 1800-1900 m). Valloire (C. du Télégraphe, 1600 m). Aussois (Rte de la Loza, 1600-1800 m). Termignon (vers l'Arpont, 1300-2000 m). Lanslebourg (Mt Cenis, 2000-2100 m).

*Localité ancienne* : Chambéry (Les Charmettes, 400 m).

### **Erebia triaria** De Prunner, 1798 [3036]

*Répartition* : Européenne : du Portugal à l'Albanie en aires disjointes. Assez bien reconnu des Pyrénées et des Alpes au sud de l'Isère, il n'a encore été l'objet en Savoie que de quelques citations très dispersées, sauf des alentours de la vallée du Glandon : Lisières forestières subalpines, sans doute entre 900 et 2000 m. VI - VII. surtout mi VI - mi VII probablement.

*Variation* : *E. t. letincia* Fruhstorfer, 1910. Les exemplaires observés ont en effet des taches distinctes aux ailes postérieures (alors qu'elles sont réunies chez le type).

*Localités* : St Etienne de Cuines, St Colomban des Villards (600-2000 m, VARENNE). St Sorlin d'Arves (1600-2000 m). St Colomban des Villards (Léchet, 1600 m), Jarrier (Sapey, 1600 m) St Jean d'Arves (Col d'Arves Nord, 1700 m), Avrieux (Longe Côte, 2000 m), Lanslevillard (Les Grattais, 1850 m, SAVOUREY). Bonneval sur Arc (1900 m, BOURGOGNE).

*Localités à confirmer* : Les Déserts (Mt Revard, CUSIN). Pralognan, Peisey (VENTURE/BOURGOGNE).

### **Erebia medusa** Denis et Schiffermüller, 1775 [3037]

*Répartition* : Eurasiatique (pontoméditerranéenne) : du Nord-Est de la France à la Pologne, la Yougoslavie et les Balkans, l'Oural et la Sibérie ; en France du Cher aux Vosges, par le Bassin parisien. Se trouve en Savoie à la limite méridionale de son aire, à l'ouest du département (Bauges et Combe de Savoie). Il y habite les landes et forêts humides jusqu'aux limites de l'étage alpin : (230) - 800 - 1600 - (2000) m. mi V - début VIII. Emergences retardant progressivement avec l'altitude.

*Variation* : *E. m. brigobanna* Fruhstorfer, 1917 et ssp. (?) *E. m. hippo-medusa* Ochsheimer 1820. Les individus pris en altitude sont en effet souvent petits et sombres (présence notée (h) dans la liste ci-dessous), mais peut-on dire ici qu'il s'agit véritablement d'une sous-espèce ?

*Localités* : Chambéry (Les Monts, 500 m). Serrières (Chautagne, 230 m). Montcel (Le Revard, 1400-1560 m ; C. de la Cluse, 12000 m, (h)). Les Déserts (C. de Plainpalais, 800-1170 m). Thoiry (C. des Prés, 1150 m). Jarsy (Combe d'Ire, 2000 m, (h)). St Pierre d'Albigny (Les Garniers, La Planta, *La Noiriat*, Plan Ravet, 500-800 m. Pré Ballet, C. du Frêne, 1000-1100 m). St Jean de la Porte, Coise (Les Iles, 280-350 m). La Giétaz (Aravis, 1700 m, (h)).

*Localité douteuse* : St Jean de Belleville.

**Erebia alberganus** de Prunner, 1798 [3038]

*Répartition* : Espèce européenne très commune dans les Alpes, les Apennins, jusqu'aux Balkans, mais présente en France seulement dans les Alpes surtout les chaînes internes. En Savoie, on la rencontre partout en montagne, mais elle est encore assez peu signalée des massifs des Bauges et des Aravis. Elle semble préférer les alpages et prairies de moyenne et haute altitude, ainsi que les forêts peu denses (mélèzins, paissières). (600) - 800 - 2000 - (2200) m. (fin V) - VI - VII - (VIII).

*Variation* : *E. alberganus ceto* Hübner, 1804 : grands individus très répandus. *E. alberganus alberganus* de Prunner 1798 : plus petits, présents en altitude seulement.

*Localités* : Les Déserts (Revard, 1500 m). St Pierre d'Albigny (C. du Frêne, 700-1100 m). La Giétaz (Aravis, 1100-1500 m). Ugine (Vérel, 1100-1400 m). Beaufort (Roselend, 1800-2200 m). Hauteluce (Les Saisies, 1600 m). Celliers (La Léchère, 1500 m). St Martin de Belle (Ménuires, 1700-2200 m). Fontaine (1000-1200 m). *St Jean de Belleville* (Nant Brun rive gauche, 1250-1900 m). Planay (Plan Fournier, 1700-1800 m). La Perrière (Formier, 1400-1800 m). Les Allues (Doron, 900-2000 m). Pralognan (Doron, La Croix, 1200-1400 m ; Chollières Chavière, 1500-1900 m ; Rocher de Villeneuve, 1300-1800 m ; Les Fontanettes, Mt Bochor, 1650-2100 m). Champagny (Friburget, 1500 m). ND du Pré (1350-1600 m). Peisey (Villaret, Ponturin, La Gurraz, 1200-2000 m). Bourg St Maurice (Versoyen, 800-2000 m ; Les Chapieux, 1600-1800 m). Séez (Les Ecludets, 1100 m ; Le Combottier, 1900 m). Ste Foy Tse (Le Miroir, 1500-1900 m). Tignes (La Sassièrre, 1800-2900 m). Val d'Isère (Solaise, 1900-2200 m). *St François Longchamp* (C. de la Madeleine, 1450-2200). *St Alban et St Colomban des Villards* (Glandon, 700-2000 m ; Eau d'Oille Rive Droite, 1900-2100 m ; Merlet, 1100-1200 m). *St Sorlin d'Arves, St Jean d'Arves* (Arvan, Arvette, partout, 1300-2100 m). *Fontcouverte, Villarembert, Jarrier, St Pancrace* (partout, 750-2100 m). *Hermillon* (600-1000 m). *Le Châtel* (800 m). *Montvernier, Montpascal* (1100-1500 m). *St Julien Mt Denis* (Grény, 1200-1300 m). *Albanne* (1600 m). *St Martin la Porte* (Encombres, 1200-1900 m). Valloire (Télégraphe, Les Verneys, 1500-1700 m). *St André* (Le Col, 1500 m). Aussois (La Loza, 1500-1800 m). Termignon (sentier de l'Arpont, 1400-2200 m). Lanslevillard (Arc, 1500 m ; Le Châtelard, 1900 m ; Les Grattais, 1900-2200 m). Lanslebourg (Turra, 2000-2200 m). Bonneval sur Arc (L'Ecot, 2000 m).

**Erebia pluto** de Prunner, 1798 [3039]

*Répartition* : Erèbe strictement alpin, en France du Mercantour au Mont Blanc. (Dévoluy seule citation à l'ouest du 6<sup>e</sup> méridien). N'habite en Savoie que la portion orientale du département, toujours en haute altitude dans les pierriers, moraines et éboulis des étages alpin et nival, où il butine les touffes rases de « plantes pionnières » avec *H. comma* et *E. gorge*. On le rencontre fréquemment aussi sur les crêtes ventées en compagnie de *P. callidice* et *A. urticae*.

*Variation* : *E. p. pluto* : partout, surtout Vanoise et Maurienne. *E. p. oreas* Warren, 1933 : chaîne frontalière de Haute Tarentaise, Gd Galibier. *E. p. anteborus* Fruhstorfer, 1818 : voisinage de la Haute Savoie (signalé sporadique (?) ailleurs).

*Localités récentes* : La Giétaz (C. des Aravis, 1900-2000 m). Bourg St Maurice (Versoye, collet des Rousses, Col du Bonhomme, 2300-2900 m). St Martin de Belleville (Thorens Pécelet, 2700 m). Pralognan (Gerlon, 1700-1800 m ; Plan de la Roche, 2000-2500 m ; Lac des vaches, 2000-2200 m). Valloire (C. du Galibier, 2000-2700 m). *Avrieux* (Grd Fond, Pte St Michel, 2500-3250 m). *Albiez Montrond* Plan Pradin, 2300-2700 m). *St Sorlin d'Arves* (Glacier de St Sorlin, 2700 m). *Lanslebourg, Sollières* (Mt Cenis, Gd Coin, Mt Malamot, Pte Droset, 2100-3000 m). Bonneval sur Arc (Vallonnet, 2200-2600 m ; Evettes, 2500-2600 m ; C. de l'Iseran, 2500-2900 m).

*Localités anciennes* : Beaufort (C. de Roselend, C. de la Seigne, 2000-2600 m). Séez (C. du Pt St Bernard, Lancebranlette, C. de Forcles, 2100-2900 m). Val d'Isère (Solaise, 2450 m ; Iseran Nord, 2900 m). Ste Foy Tse (Archeboc, 2850 m). Tignes (La Sassièrre,

2000 m). Peisey (C. de la Chiaupe, 2500 m). St Martin de Belleville (C. de la Pierre Blanche, 2650 m). Lanslevillard (Pte S-O. du Châtelard, 2900 m).

### **Erebia gorge** Hübner, 1804 [3040]

*Répartition* : Alpine Européenne, des Monts Cantabriques aux Balkans par les Apennins, les Tatras et les Carpathes, en aires disjointes ; en France des Pyrénées et des Alpes. Sans doute dispersé un peu partout sur les sommets savoyards, il n'est encore cité qu'une seule fois à l'Ouest de l'Isère (Bauges, A. HERES, 1986). Il affectionne particulièrement les éboulis, moraines, et pentes caillouteuses zébrant les pelouses alpines bien exposées. Sa période de vol semble courte et très sensible aux conditions météorologiques. (1600) - 1800 - 2800 - (3000) m. mi VII - VIII.

*Variation* : *E. g. gorge* et forme *E. g. erynis* Esper, 1805 (ocelles absents aux antérieures). Les deux formes sont généralement mêlées, avec de nombreux individus montrant une ornementation intermédiaire.

*Localités* : La Giétaz (Aravis, 1900 m). St Pierre d'Albigny (Dent d'Arclusaz, 1800-1900 m). St Martin de Belleville (Les Ménuires, Val Thorens Pécelet, 1700-2800 m). Pralognan (C. de Chavière, 2100 m). La Léchère (Chalet Nant du Beurre, 2100-2400 m). Peisey (C. d'Entreporte, 2390 m ; C. de La Chal, 2460 m). Bourg St Maurice (Versoye, 2650-2900 m ; C. de la Seigne, 2200 m). Tignes (Lacs de la Sassièrre et du Chardonnet, 2000-2500 m). Val d'Isère (Leissières, 2600-2700 m). *St Sorlin d'Arves* (C. de la Croix de Fer, Lac Tournant, 2000-2700 m ; Massif de l'Ouilleon Est, 2300-2350 m). *St Colomban des Villards* (Gd Truc Ouest, 2000-2200 m). *Albiez Montrond* (Pacqueret, 1800-2000 m ; Pradin, 2200-2700 m). *Fontcouverte* (Gd Truc, 2000-2200 m). Valloire (Plan Lacha, 1950-2100 m ; Galibier Nord, 2300-2550 m). *Lanslebourg*, *Sollières* (Mt Cenis, Grand Coin, Lacs Giaset, Mt Malamot, 2100-3000 m). Lanslevillard (Pierre aux pieds, 2600-2700 m). *Bessans* (Avérole, Arnès, Oney, 2400-2500 m). Bonneval sur Arc (Iseran Sud, 2550-2770 m ; Rge du Carro, 2500-2780 m ; Rge des Evettes, 2480 m).

*Localités anciennes* : Pralognan (Fontanettes, 1750 m ; Gd Marchet, 2000-2500 m). St Jean d'Arves (1800 m).

### **Erebia mnestra** Hübner, 1804 [3042]

*Répartition* : Alpine. Localisé en France au nord de la Romanche et de la Guisane, il est présent en îlots assez dispersés dans les hauts massifs savoyards (Vanoise, Beaufortain et chaînes frontalière), soit au sommet de la forêt alpine (en éclaircies), soit plus haut sur des rocailles et pelouses xériques. 1800 - 2600 m. mi VII - mi VIII.

*Localités* : Beaufort (C. de Roselend, 1800-2200 m ; Combe de la Neuva, 2000-2200 m ; Cormet d'Arèches, 2100 m). La Léchère (Nant du Beurre, 2100-2400 m). Bellentre (Les Bauches, 1500-1900 m). Aime (Mt Biolley, 2100-2300 m). Pralognan (Mt Bochor, 2000-2100 m ; La Valette, 2500 m ; Montaimont, 1950-2100 m). St Martin de Belleville (Les Ménuires, Val Thorens, 1700-2200 m). Bourg St Maurice (C. de la Chal, 2460 m ; Aig. rouge, 2150 m ; C. de la Seigne, 2200-2500 m). Montvalezan (La Rosière, 1900-2000 m). Ste Foy Tarentaise (Archeboc, 1900-2300 m). Villaroger (La Guraz, 1700 m). Tignes (La Sassièrre, 2000-2100 m ; Lac 2100-2300 m). Val d'Isère (Pt St Charles, 2200 m ; Iseran Nord, 2700 m). *St François Longchamp* (C. de la Madeleine, 1900-2200 m). *St Sorlin d'Arves* (Croix de Fer - Trois Lacs, 2000-2600 m). Valloire (Plan Lacha, 2000-2200 m ; Les Granges du Galibier, 2200 m). Aussois (La Loza, 1800-2000 m). Bessans (Vincendières, 1850 m). *Lanslebourg* (Savalin, Drosset Nord, 2100-2500 m). *Bramans* (Savine, 2300 m). Bonneval sur Arc (*Iseran*, 2500-2700 m ; Evettes, 2000-2500 m).

*Localité à confirmer* : Arvillard (Forêt de St Hugon, 1900 m).

*Localités anciennes (mais sûres)* : Beaufort (Mt Outrey). Peisey (L. de la Plagne, 2000 m). Pralognan (Gd Marchet, 2300 m ; Plan de la Roche, 2000-2200 m ; C. de la Vanoise, C. des Saulces, 2000-2500 m). Bourg St Maurice (C. de Forcles, 21000 m). Val d'Isère (C. du Palet, 2600 m). Modane (C. de Chavière Sud, 2500 m).

(à suivre).