

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, etc.

Secrétaire général: M. J. FIASSON, 48, rue Tête-d'Or, Lyon 6^e.
Trésorier: M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon 6^e.

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet, 6^{me} (Immeuble Municipal).

ABONNEMENT ANNUEL C. C. P. Lyon 101-98	France et Colonies Françaises	400 francs
	Etranger	600 —

PARTIE ADMINISTRATIVE

DERNIER AVIS DU TRÉSORIER

Les cotisations non réglées seront mises en recouvrement vers le 25 mai, majorées des frais de 100 francs. Les retardataires ont intérêt à se libérer avant cette date.

ORDRES DU JOUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE : Mardi 9 mai, à 21 heures

Approbation des comptes et du bilan au 31 Décembre 1949.
Rapport du censeur. — Nomination du censeur. — Questions diverses.

CONSEIL D'ADMINISTRATION : Mardi 9 Mai, à 20 h. 15

Admission de :

Mme BOUVIER, pharmacien, 56, rue de Clermont, Roanne, parrains Mlle Pascal et M. Dieudonné. — M. l'Inspecteur de la Protection des Végétaux, Directeur de l'Insectarium du Jardin d'Essais, Alger. — Syndicat professionnel de l'Industrie des engrais azotés, 15, place Bellecour, Lyon, parrains MM. Coquillat et Ponchon. — M. LAFERRÈRE Marc, 6, place St-Jean, Lyon, parrains MM. Viret et Berthet.
Questions diverses.

SECTION ENTOMOLOGIQUE : Mercredi 10 Mai, à 20 h. 15

P. VIETTE: Contribution à l'étude des *Hepialidae* (18^{me} note). Description d'un genre et d'une espèce nouvelle.
Présentation d'insectes. — Questions diverses.

SECTION BOTANIQUE : Samedi 13 Mai, à 17 heures

E. BONNOT: *Carex helodes* Link. dans les Monts du Roannais.
A. QUENEY: *Erica arborea* L. en Algérie et ses utilisations industrielles.
Présentation de plantes. — Questions diverses.

CATALOGUE DES HISTERIDES DE LA REGION LYONNAISE

par G. AUDRAS et J. THÉRON

avec la collaboration de M. SCHAEFER et des membres Lyonnais
de la Société Linnéenne de Lyon.

Limite de la zone et abréviations : voir Bulletin d'Avril 1949.

Autres entomologistes cités : D^r AUZAT (AZ), BOUDET (BO), BERTHOLEY (BE), CHAUFFANGEON (CH), CHOBAUT (CT), CHATANAY (CA), F. CORNILLON (CO), DAVID (DA), FOUDRAS (FO), FAUVEL (FA), H. GAVOY (GV), MAYET (MA), D^r NODIER (NO), D^r PIGNOL (PI), J. PERRET (PE), RIBOULET (RB), L. SCHAEFER (S), D^r VIALLIER (VI), XAMBEU (X), THÉRON (TH).

Bibliographie : *Miscellanea Entomologica*. D^r AUZAT : *Histeridae* Gallo-Rhénans. — F. GUILLEBEAU : Catalogue des Coléoptères du Département de l'Ain. — L'Échange, revue linnéenne, 1892, n^o 86. — FAUCONNET et VITURAT : Catalogue des Coléoptères de Saône-et-Loire.

1. *Hololepta plana* Fuessly.

Rh. : Irigny, St-Fons (FN), Yvours (RI, SZ), Collonges (R), Iles de la Pape (S, R), Ecully !, Rochetaillée (J), St-Didier (R). — Ain : St-Rambert !, Beynost (CH), Chalamont (S) sur un chêne, Mionnay (RI), le Plantay (GU), Marlieux (GE), Montluel (J). — Isère : Vienne (F), Bourgoin (S), Solaize (S).

Sous les écorces des peupliers, rarement sur d'autres essences. Les variétés : *appendiculata* Auzat, *Derbordesi* Auzat, *Rouquesi* Auzat, *orientalis* Roubal et *deficiens* Roubal sont individuelles et peuvent se rencontrer partout mélangées à la forme typique.

2. *Tereetrius picipes* Er.

Rh. : Lyon (RO), Beaujolais (Rey). — Ain : Dombes (J), le Plantay (GU).
Sous les écorces aux dépens des Scolytes, assez rare.

3. *Onthophilus sulcatus* F.

Rh. : Lyon (RI). — Ain : Bugey (Rey), Thoissey (F), les Echets (RO). — Is. : Vienne (F).

Végétaux décomposés, excréments, nids de taupes et blaireaux (F), rare.

4. *Onthophilus striatus* Forst.

Rh. : Lyon, crues du Rhône (CT), Ecully !, Charbonnières (S). — Ain : (GU), Lent !, St-Rambert ! — Loire : Mt-Pilat (F).

Dans les fumiers et matières végétales en décomposition.

5. *Plegadurus vulneratus* Panz.

Ain : le Plantay (GU). — Sous les écorces de pin sylvestre.

6. *Plegadurus caesus* Herbst.

Rh. : environs de Lyon (RO), Beaujolais (Rey), Tassin (FO), Mornant (BE), St-Cyr (R), Ecully ! — Ain : Le Plantay, Charnoz (GU).

Sous les écorces ; vit aux dépens des Ipides ; assez rare.

7. *Eubrachium pusillum* Rossi.

Rh. : Yvours (SZ).

Sous les écorces vermoulues des chênes. Espèce méditerranéenne, très rare dans la région lyonnaise.

8. *Abraeus globulus* Creutz.

Rh. : Lyon (AZ), Charbonnières (FO), Beaujolais (Rey). — Ain : le Plantay (GU), Lent ! (S). — Is. : Vienne (F).

Dans les bouses, fumiers, fourmis, aussi dans les vieilles souches et sous les écorces.

9. *Abraeus globosus* Hoffm.

Rh. : Lyon (AZ), la Tour de Salvagny (X), St-Didier (R). Tout l'Ain (GU).
Même habitat, un peu plus rare.

10. *Acritis minutus* Hbst.

Ain : le Plantay (GU).

Dans les fumiers, et les détritits végétaux en décomposition, assez rare.

11. *Acritis nigricornis* Hoffm.

Rh. : Yvours (SZ), Ecully !, Mornant, Lyon détritits d'inondations du Rhône (CT). — Ain : le Plantay (GU), St-Rambert ! — Is. : Vienne (PE).

Dans les fumiers et substances végétales en décomposition ; assez commun.

12. *Saprinus semipunctatus* F.

Rh. : Lyon (H), Beaujolais (Rey), Ecully !, St-Genis-Laval (D). — Ain : les Echets (J).

Fréquente les cadavres d'animaux en putréfaction, les spathes d'*Arum dracunculus*, insecte méridional rare dans la région lyonnaise. Des individus noirs (var. *Chobauti* Auz.) peuvent se trouver mélangés avec la forme typique.

13. *Saprinus deterius* Illig.

Rh. : Lyon (JJ), Mt-Ceindre (JJ, R), Ecully !. — Is. : Vienne (F).

La forme typique avec ses variétés *Nisetoi* J. Mull., *Martinae* Thérond, *Elainae* Th. et sa race *Fontisbellaquei* Auzat (qui domine dans le Nord de la France) avec ses variétés *Damremi* Auzat et *Navasi* Fuente se trouvent ensemble. Même habitat que le précédent.

14. *Saprinus medionalis* Ihssen = *semistriatus* Scriba partim.

Rh. : Yzeron (RI), Yvours (SZ), St-Fons (X), Ecully !, St-Didier (R), Besse-nay (S), St-Genis-Laval (D). — Ain : (GU), St-Rambert ! — Isère : Solaize (S).

La var. *Fagnezi* Auzat peut se rencontrer avec le type. Dans les fumiers, les bouses, mais surtout sous les cadavres, dans les spathes d'*Arum dracunculus*, pas rare mais cependant moins abondant que le suivant. Commun dans le Midi.

15. *Saprinus punctatostriatus* Mars.

Rh. : Ecully !, Charbonnières (S), Vaulx-en-Velin (R). — Ain : Lent !, Cerdon ! — Isère : Solaize (S).

Se trouve avec le précédent.

16. *Saprinus planiusculus* Mots.

Rh. : Ecully !, St-Didier (R). — Ain : St-Rambert ! — Is. : Solaize (S).

Avec les deux précédents, plus rare.

17. *Saprinus subnitidus* Mars.

Rh. : Ecully !, Ste-Foy-l'Argentière (T). — Ain : Lent !, Cerdon !. — Is. : Vienne (F).

Cadavres en putréfaction, fumiers, spathes d'*Arum*.

La rare variété *Berardi* Thérond peut se rencontrer.

18. *Saprinus politus* Brahm.

Rh. : Lyon (X, R, PN, H, RI), Ecully !, Vaulx-en-Velin (R), Charbonnières, Pierre-Bénite (S). — Ain : (GU). — Is. : Vienne (F).

Sous les cadavres, les excréments surtout humains, en nombre dans les spathes d'*Arum dracunculus*.

La variété *Buyssoni* Auzat peut se rencontrer dans la région lyonnaise.

19. *Saprinus aeneus* F.

Rh. : Beaujolais (Rey), Ecully !, St-Genis-Laval (D), Lyon (PI), Charbonnières (S). — Ain : (GU), Lent !. — Is. : Solaize (S).

Les variétés *fulminea* Koltre, *Thérondi* Auzat et *Garnieri* Thérond peuvent se rencontrer avec le type.

20. *Saprinus lautus* Er.

Rh. : Lyon (Rey), Neuville-sur-Saône (CA).

Dans les champignons et petits cadavres, très rare.

21. *Saprinus virescens* Payk.

Rh. : Lyon (PI, RO, de Marseul, Fairmaire), Inondations du Rhône (J), Yvours (H). — Is. : Vienne (F).

Sur les *Polygonum* attaqués par *Gastroidea* et le cresson où il dévore les larves de *Phaedon*.

22. *Saprinus tenuistrius* Mars., s. sp. *sparsutus* Sols.

Rh. : Lyon (RO), St-Genis-Laval (PN, D), Ecully !, St-Didier (R). — Ain : St-Rambert ! Cadavres, matières en décomposition, spathes d'*Arum*.

23. *Hypocacculus metallescens* Er.

Rh. : Lyon (Rey), Neuville-sur-Saône (CA).

Champignons pourris, excréments dans les lieux sablonneux, spath d'*Arum*.

La variété *Marqueti* Mars., Thér., se rencontre avec le type ; rare.

24. *Hypocacculus rubripes* Er.

Rh. : Lyon (CT, Rey). — Dans les lieux sablonneux, sous les pierres, les débris, les excréments, les spathes d'*Arum*.

Les variétés *granarius* Er., *corsicus* Mars., *Clermonti* Auzat, *arenarius* Mars., sont des accidents qui peuvent se trouver partout avec le type.

25. *Chalcionellus decemstriatus* Rossi = *conjungens* Payk.

Rh. : Lyon (J, NO), Yvours (H), Mts-d'Or ! — Ain : Bugey, le Plantay (GU), Lent ! (P, S).

- Dans les bouses, crottins de cheval, sous les détrit. Rare.
26. **Hypocaccus rugiceps** Duft.
Rh.: Lyon (Rey, FA, NO), Ecully! — Is.: Vienne (F).
Dans les sables, au bord des cours d'eau, sous les détrit. animaux. Rare.
27. **Hypocaccus rugifrons** Payk.
Is.: Vienne. inondations (F).
Rives sablonneuses des cours d'eau. Très rare dans la région lyonnaise.
Les variétés *Barani* Auzat, *girondinus* Auzat, *subpulchellus* Chobaut, *radiosus* Mars., *orphanus* des Gozis peuvent se rencontrer.
28. **Hypocaccus metallicus** Herbst.
Rh.: Lyon (PI). — Ain: Charnoz (GU).
Rives sablonneuses des cours d'eau; très rare.
29. **Hypocaccus crassipes** Er.
Rh.: Lyon inondations du Rhône (Rey, J, CT). — Is.: Vienne inondations (F).
Très rare. Dans les sables, sous les détrit., les pierres, les excréments.
30. **Exaesiopus grossipes** Mars.
Rh.: inondations du Rhône (Rey, CT). — Is.: Vienne (F).
Dans le sable au bord des cours d'eau. Rare.
31. **Gnathoncus Schmidtii** Reitt. = **Buyssoni** Auzat.
Is.: Vienne (F). Rh.: St-Didier (R).
Dans les nids d'oiseaux.
32. **Gnathoncus punctator** Reitt. = **nidicola** Joy.
Is.: Vienne (F).
Dans les nids d'oiseaux.
33. **Gnathoncus nanus** Scriba = **punctulatus** Thms.
Rh.: Lyon (RI, RO), Ecully!, Pierre-Bénite (S), Tarare (P, N), St-Didier (R), Givors (FO). — Ain: (GU), Lent! (TH, P). — Loire: Mt-Pilat (C).
Var. *subsuturalis* Reitt., Lent (P), poulaillers, pigeonniers, fumier de lapins.
34. **Gnathoncus nannetensis** Mars. = **rotundatus** Kl = **conjugatus** Ig.
Lyon (P, Rey, RO), St-Cyr (R), Ecully! — Ain: (GU). — Is.: Vienne (F).
Comme le précédent et avec lui; plus rare.
35. **Myrmex piceus** Payk.
Rh.: Lyon (CT), Vaugneray, St-Laurent-de-Vaux (PN). — Ain: le Plantay (GU). — Is.: Vienne (F).
Dans les nids de fourmis, très rare dans la région lyonnaise.
36. **Dendrophilus punctatus** Herbst.
Rh.: Lyon (RO), Beaujolais (Rey), Givors (MA), St-Didier (R), St-Romain nid de frelons (F), Ecully!, Montchat, Bron (FO). — Ain: le Plantay (GU), les Echets (J), Lent (P), Beynost (Chosson), St-Rambert! — Is.: Vienne (F).
Dans le guano des poulaillers, les terreaux des arbres creux, les nids d'oiseaux et de guêpes, les fourmilières.
37. **Dendrophilus pygmaeus** L.
Rh.: Lyon (PI), St-Romain (F). — Ain: le Plantay (GU), St-André-de-Corcy (J), St-Rambert!
Dans les nids de *Formica*. Rare.
38. **Kissiter minimus** Aubé.
Rh.: Lyon (PI), Caluire (R). — Is.: Vienne (F).
Sous les pierres, les détrit. animaux ou végétaux, avec les *Formicina*. Très rare.
39. **Carcinops pumilio** Er. = *quatuordecimstriatus* Step.
Rh.: Lyon (CO), Ecully! — Ain: Lent (TH), St-Rambert!, Cerdon! — Is.: Décines (Boudet).
Dans les charognes, les fumiers de bergeries, écuries, lapinières, sous les tas de végétaux en décomposition, nids d'oiseaux.
40. **Paromalus complanatus** Paur.
Rh.: Lyon (FA, T), Givors (MA), Yvours (SZ), Irigny (PN). — Is.: Vienne (F).
Sous les écorces des arbres morts. Très rare.
41. **Microlomalus parallelipedus** Herbst.
Rh.: St-Romain (F), Limonest, Thizy (Rey), Villefranche (CH), Vaugneray! (R), Lentilly! (S), Bessenay!, Chaponost! — Ain: Chalamont (GU). — Is.: Vienne (F).
Sous les écorces des pins, très rarement sur d'autres essences, peu commun.

42. *Microlomalus flavicornis* Hobst.
Rh.: Lyon (CO), La Tour-de-Salvagny (RI), les Flachères (VI), St-Didier, Dardilly, Lyon (R), Givors (MA), Ecully!, Lentilly! (S), Charbonnières (S), Vaugneray (PN). Yseron! — Ain (GU), St-Rambert!, Beynost (B). — Is.: Décines (R).

Sous les écorces de différents arbres, chênes, peupliers, saules, etc., peu commun.

43. *Platysoma frontale* Payk.

Rh.: Givors (FA, J), Chaponost (S, D), Marcy (RI), Champagne (R), Tassin (VI), Charbonnières! (S). — Ain: Cerdon!

Sous les écorces des arbres abattus, assez rare.

44. *Platysoma compressum* Hbst.

Rh.: Charbonnières! (R), Vaugneray (PN), Limonest, Lissieux, Dardilly (R), Lyon (Rey), Yvours (SZ), Lentilly (S), Tassin (VI), Amplepuis (Tholin). — Ain: St-Rambert!, Lent!, Chalamont (S), Villebois (GU), le Plantay (GU). — Loire: Mt-Pilat (LV).

Sous les écorces de diverses essences.

La variété *Agnusi* Auzat se trouve avec la forme typique.

45. *Cyclostoma oblongum* Mars.

Rh.: Givors (CO), Lentilly!, Charbonnières, Col de Malval (S), Yseron (RI), Thizy (Pic), St-Genis-Laval (D), Lyon (RO), Irigny (SZ), Vaugneray (PN, R). — Ain: Lent! — Is.: Mens, Marcieu (GE), Vienne (VP). — Loire: Mt-Pilat (F).

Sous l'écorce des pins où la larve vit aux dépens des Ips.

46. *Cyclostoma elongatum* OL.

Rh.: Vaugneray (PN).

Vit sous l'écorce des pins; répandu dans la plus grande partie de l'Europe, rare dans la région lyonnaise, très abondant dans le Midi.

47. *Cyclostoma angustatum* Hoffm.

Rh.: Vaugneray (P), Lyon (RO), Amplepuis (X), Mornant (BE).

Sous l'écorce des pins, rare dans la région lyonnaise, très rare dans le midi.

48. *Ecalohister binotatus* Er.

Rh.: Lyon (RI), Environs de Lyon (RO, PI), St-Alban (JJ). — Ain: le Plantay (GU), Bugey (GU).

v. *Jacqueti* Auzat; Rh.: St-Alban (JJ).

Détritus, bouses. Rare.

49. *Eudiplister lugubris* Truqui.

Rh.: Lyon (PI, RO), Inondations du Rhône (RI), Ecully! — Ain: le Plantay (GU), Charnoz (GU). — Is.: Décines (J. CT), Pont-de-Chéruy (DA).

Dans les bouses.

50. *Grammostethus marginatus* Er.

Rh.: Environs de Lyon (RO). — Ain: Thoissey (F). — Is.: Vienne, Septème (F).

Dans les nids de taupes, terriers et végétaux en décomposition.

51. *Grammostethus ruficornis* Grium.

Rh.: Lyon inondations (RO). — Ain: le Plantay (GU), Tramoye (J).

Plaies des arbres, fourmis, terriers de lapins. Très rare.

52. *Paralister stercorarius* Hoffm.

Rh.: Lyon (H. Bleuze), Ecully!, Lentilly!, Chaponost (S, R), St-Didier (R), Charbonnières (S), St-Genis-Laval (D). — Ain: (GU), St-Rambert!, Lent!, Cerdon! — Is.: Vienne (F).

Dans les bouses, fumiers, terriers de lapin, assez rare. La variété *Gotzelmanni* Bicht peut se trouver avec la forme typique.

53. *Paralister bipustulatus* Schr.

Ain: (GU). Dans les bouses, crottins, etc. Très rare en France.

54. *Paralister purpurascens* Herbst.

Rh.: Lyon inondations du Rhône, la Pape (RI), Yvours (FO), Givors (CT), Ecully!, Pierre-Bénite (S), Grand Camp (R). — Ain: le Plantay (GU). — Is.: Vienne (F), Décines (CT).

v. *niger* Schm.; Pierre-Bénite (S), Charbonnières (S).

Un exemplaire ayant les caractères de v. *niger* et v. *strioliger* Bi a été pris à Pierre-Bénite!

Les autres variétés, *Pueli* Chobaut, *brunneus* Herb., *Mesmini* Auzat peuvent se rencontrer avec la forme typique.

Bouses et fumiers, peu commun dans la région lyonnaise.

55. *Paralister neglectus* Germ.

Rh. : Lyon (RO), Ecully !, Ain : le Plantay (GU).

Sous les écorces, dans les terreaux des arbres creux, sous les détritux végétaux, nids de pigeons, etc.

Un exemplaire trouvé dans le Rhône (PN) a la strie subhumérale divisée en deux tronçons, l'un huméral, l'autre apical.

56. *Paralister ventralis* Mars.

Rh. : Lyon (PI), Ecully ! — Ain (GU), Cerdon ! — Is. : Vienne (F). — Loire : Mt-Pilat (F).

Dans les fumiers, détritux végétaux, champignons pourris.

57. *Paralister carbonarius* Illig.

Commun partout dans les bouses et les fumiers.

Les variétés *Chapmani* Auzat et *satanus* Auzat doivent se rencontrer.

58. *Paralister stigmomus* de Marseul.

Rh. : Morgon (PI), le Poirier (X). — Ain : le Plantay (GU). — Is. : Cessieu (GE).

Dans les bois, sous les mousses en Automne, bolets pourris, rarement dans les bouses de vaches (GU).

59. *Paralister ignobilis* de Mars.

Rh. : Lyon (PI), Ecully !, Pierre-Bénite, Ampuis, Charbonnières (S), St-Didier (R), St-Genis-Laval (D). — Ain : (GU), Lent (S). — Is. : Décines (CT).

Dans les bouses, fumiers, stercus humanum, sous les cadavres, les champignons pourris, les nids de mulots et spathes d'Arum.

Variété : *Clermonti* Auzat peut se rencontrer.

60. *Pachylister inaequalis* Ol.

Rh. : St-Romain (F), Lyon (PI), Frontenas (CH). — Ain : la Pape (F), Pont-d'Ain (GE), la Valbonne (GU), Lent !

Bouses de vache, crottins de cheval, rarement sous les cadavres. Rare.

61. *Hister quadrimaculatus* L.

Un peu partout sans être très commun.

Variétés rencontrées :

v. *reniformis* Ol. ; Rh. : St-Genis-Laval (Rey), Charbonnière (S). C'est la forme la plus commune.

v. *humeralis* Fisch. ; Rh. : Lyon, inondations du Rhône (RO). Ain : St-Paul-de-Varax (RB).

v. *gagates* Illig. ; Environs de Lyon, tout l'Ain (GU).

v. *pustulifer* Bick ; St-Genis-Laval (D).

62. *Hister unicolor* L.

Commun partout dans les fumiers, les déjections d'animaux, arbres pourris, etc.

ab. *obsoletus* Rey. Lyon (Rey).

63. *Hister striola* Sahlb.

Ain : Cerdon ! — Is. : Vienne (F).

v. *Gavoyi* Auzat peut se rencontrer.

Dans les plaies des arbres, les champignons pourris. Très rare.

64. *Hister merdarius* Hoffm.

Rh. : Environs de Lyon (T, RO, RI), Ecully !, Charbonnières (S), Lyon (P), St-Cyr, Caluire (R), St-Didier (R), St-Genis-Laval (D). — Ain : (GU), Lent ! (TH). — Is. : Marcieu (GE), Vienne (F).

Dans toutes sortes de débris et matières stercorales, poulaillers, nids d'oiseaux, etc.

65. *Hister cadaverinus* Hoffm.

Commun dans toutes matières stercorales ou en putréfaction, nids de taupe, en nombre dans les spathes d'Arum.

Les variétés *ambiguus* Auzat et *incompletus* Roub. se rencontrent avec le type.

66. *Hister quadrinotatus* Scriba.

Rh. : Lyon (GV, RI), Ecully (S), Pierre-Bénite (S). — Ain : (GU), Miribel (S), Lent !, les Hôpitaux ! — Is. : Décines (RI).

Bouses et fumiers, assez rare.

Var. *Barthei* Auzat avec la forme typique.

67. *Hister uncinatus* Illig.

Rh. : Lyon (CT), Ecully !, Chaponost, Charbonnières (S), Irigny (PN), Lentilly (S, X), St-Genis-Laval (D), Thurins (S), Montagny (S), Col de Malval

(S), Vaugneray (VI). — Ain: (GU), Lent!, les Hôpitaux! — Is.: Viègne (Méquignon), Décines!

Bouses, fumiers; assez commun.

68. *Hister helluo* Truqui.

Rh.: Lyon (RO), crués du Rhône (CT). — Ain: le Plantay (GU). Très rare dans la région; bouses, crottins, mais surtout sur les aulnes où il chasse les larves d'*Agelastica alni*.

69. *Hister funestus* Er.

Rh.: Lyon (PI). — Ain: St-Rambert! Argis (R), Cerdon!

Bouses sèches et fumiers. Très rare, mais assez fréquent dans les tas de fumiers ayant passé l'hiver auprès des vignes à St-Rambert et la vallée de l'Albarine!

70. *Hister bissexstriatus* F.

Rh.: Lyon (RO). — Ain: Cuisiat (CA), St-Rambert! — Is.: Vienne (F), Cornillon (PI).

Dans les fumiers, très rare.

71. *Peranus bimaculatus* L.

Rh.: Lyon (RI), Charbonnières (S). — Ain: le Plantay (GU), St-Rambert!, Cerdon!

var. *morio* Schm.; Lyon-Perrache (CT).

La variété *striatus* Rey peut se rencontrer également.

Bouses et fumiers. peu commun dans la région.

72. *Atholus duodecimstriatus* Schrk.

Commun partout.

var. *14-striatus* Gull.; Rh.: Ecully!, Bron (JJ). — Is.: Décines!

v. *narbonnensis* Auzat; Rh.: Lyon (CT), très rare.

Matières stercorales, végétaux en décomposition, nids d'oiseaux.

73. *Atholus praetermissus* Peyron.

Rh.: Lyon (RO), Morgon (Rey). — Ain: le Plantay (GU). — Loire: Mt-Pilat (F).

Dans les cadavres en décomposition; très rare.

74. *Atholus corvinus* Germ.

Rh.: Lyon (CT), Dardilly (RI), Ecully!, Charbonnières! (S), St-Cyr, Limonest (R), St-Genis-Laval (D), Montagny, Chaponost (S), Inondations du Rhône (RI). — Ain: (GU), St-Rambert!, Cerdon!, Lent (S). — Is.: Vienne (F), Clonas (Georgel).

Dans les champignons, bouses, matières stercorales; assez commun.

75. *Hetaerius ferrugineus* Ol.

Rh.: Lyon (X, PI), les Essarts (FO), Mts du Lyonnais (RO, BE), Irigny (SZ), Mornant (BT, Guedel). — Ain: St-André-de-Corcy (JJ), le Plantay, Villebois (GU). — Is.: Vienne (F).

Dans les nids de fourmis; assez rare.

Espèces probables dans la région lyonnaise :

Plegadurus dissectus Er.

Saprinus chalcites Illig.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 11 Février 1950.

BIBLIOGRAPHIE

Léon SCHAEFER. — *Les Buprestides de France*. Supplément à *Miscellanea Entomologica*. Editions scientifiques E. Le Moul, 4, rue Duméril, Paris.

Ce beau volume de plus de cinq cents pages, accompagnées de vingt-cinq planches hors-texte, se place, sans contredit, au tout premier rang des ouvrages de faunistique qui ont été publiés sur les Coléoptères de France au cours du demi-siècle qui prend fin.

Cette affirmation n'étonnera certes pas les naturalistes qui savent avec quelle maîtrise M. L. SCHAEFER étudie nos Buprestides depuis plus de quinze années. Chasseur incomparable, observateur perspicace, descripteur clairvoyant et précis, systématicien à l'esprit critique, mais sans parti-pris, notre Collègue a accumulé patiemment une masse énorme de documents de toutes sortes et soigneusement vérifiés.