

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Abonnement
annuel } 10 francs.SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

1816 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux
c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRE DU JOUR

DE LA

*Séance générale du Lundi 14 Mai 1923, à 20 heures*1^o Vote sur la candidature de :

MM. Micaud, Vion-Delphin, Hallet, Imbard, Homberg, d'Auferville, Dumortier, et de : M. Michel (Julien), 19, rue des Deux-Frères, Villeurbanne (Rhône), parrains MM. Bouvard et Pouchet. — M. Jacquet (Victor), Pouilly-sous-Charlieu (Loire), parrains MM. Chaverot et Usueli. — M. Demurger-Duffy, Pouilly-sous-Charlieu (Loire), parrains MM. Tuloup et Usueli. — M. Beaulieu (M. de), villa « les Iris », boulevard Carnot, Cannes (Alpes-Maritimes), *Lépidoptères*. — M. Louvet (G.), 18, rue Cuvier, Paris (V^e). *Carabidæ paléarctiques*. — M. Gruvel (A.), professeur au Muséum d'Histoire naturelle, 57, rue Cuvier, Paris (V^e), *Cirrhipèdes, Pêches et Productions coloniales d'origine animale*. — M. Hérouard (Edgard), professeur à la Faculté des Sciences, 9, rue de l'Eperon, Paris (VI^e), *Entomologie générale, Crustacés*, parrains MM. Riel et Nicod. — M. Hoschedé (J.-P.), 18, rue de la Station, Vernon (Eure), *Botanique*, parrains MM. Riel et Pétrequin. — M. Bergroth (Dr E.), Ekenäs (Finlande), *Entomologie générale, principalement Hémiptères*, parrains MM. les D^{rs} Bonnamour et Riel.

2^o Présentation de :

M. Bladier (Charles), 5, rue Mazard, Lyon, *Mycologie*, par M. Riel et Nicod. — M. Tabusteau (Abbé Henri), curé de Sainte-Eulalie, par

d'*Alecto*) : « Quelquefois deux petits yeux apicaux à peine visibles. » Mais malheureusement les auteurs de son époque n'étaient pas pénétrés comme nous de l'importance des variations des espèces et de leur distribution géographique, il ne dit rien sur la provenance de ces échantillons, n'en donne aucune figuration ni description précise et ne dit même pas s'il les a vus lui-même.

Le très regretté Muschamp (*Soc. l'ép. de Genève*, vol. I, fasc. III, p. 256) donne des détails plus précis : « Une ♂ pourtant montre des points noirs sur le dessous des ailes seulement. Serait-ce une forme atavique ? nous sommes tentés de le supposer ». Mais il parle de points noirs non pupillés et son observation ne se rapporte pas à la race *Duponcheli*.

D'autres auteurs, toujours sous le nom faux d'*Alecto*, parlent de formes ocellées de *glacialis*, mais leurs indications sont vagues et se rapportent, non à la race *Duponcheli* des Basses-Alpes, mais à des races de la Suisse ou de l'Europe centrale.

Notons en passant que le nom d'*Alecto* Hübner doit s'appliquer exclusivement, ainsi que l'a démontré M. le comte Emilio Turati, à l'espèce désignée par tous les auteurs sous le nom de *Merine* Freyer. L'examen des figures 515-516 d'Hübner ne laisse subsister aucun doute sur l'exactitude de l'opinion de notre savant collègue italien. Ces figures ayant la priorité à la fois sur les figures 528-529 du même auteur et sur la description de *Merine* par Freyer, cette dernière dénomination doit disparaître de la nomenclature, ainsi que celle d'*Alecto*, en tant que variété ou forme de *glacialis*. *Alecto* n'a donc, comme on le voit, aucun rapport avec notre aberration.

Nous ne saurions trop engager tous nos collègues à chasser avec une inlassable persévérance, et à décrire, s'il y a lieu, les aberrations, car nous avons l'intime conviction que leur étude, qui semblent n'avoir aucune importance lorsqu'elles sont considérées isolément, réservent au contraire à la biologie de l'avenir des découvertes d'une très grande portée, lorsque celle-ci connaîtra et saura réaliser les conditions qui permettent ou favorisent la réapparition des caractères ancestraux. Notons à ce sujet, sans attacher à ces faits plus d'importance qu'ils n'en ont peut-être, que notre échantillon aberrant était le plus grand de tous, quoique avec une différence de taille très minime et qu'il présentait près du bord des ailes inférieures, en dessus, une légère trace de la fascie rougeâtre du type *glacialis*. Notons aussi qu'un autre échantillon de la même récolte, le second en taille, présente, exactement à la même place de chacun des yeux de l'aberration pupillée, une très petite macule rougeâtre, mais sans pupille blanche ni cercle noir, formant ainsi un passage entre l'aberration ci-dessus décrite et les échantillons normaux.

SECTION BOTANIQUE

Séance du 24 Avril

La séance s'ouvre par la présentation et la détermination de plusieurs espèces de la région lyonnaise, apportées par plusieurs membres.

M. Pouzet présente les plantes suivantes, des environs de Saint-Germain-Laval (Loire), *Saxifraga hypnoides*, *Scutillaria minor*, *Lathræa squamaria*, *Gladiolus illyricus*, *Carex digitata*.

A propos du *Lathræa*, M. le Dr MAGNIN rappelle les discussions soulevées, il y a quelques années, au sujet de la possibilité du développement de ce parasite sur les racines de la vigne, indiquée seulement dans quelques florés, comme Grenier, Rouy, etc. M. MAGNIN a donné quelques renseignements sur ce sujet dans les *Archives de la Flore jurassienne* (avril 1906, p. 26).

M. COUTAGNE présente plusieurs espèces du Var, parmi lesquelles : *Ranunculus muricatus*, *Anemone hortensis*, *Cistus monspeliensis*, *Lavandula strachas*, *Cylinus hypocistis*, *Iris olbiensis* Hénon, *Aceras longibracteata*, *Serapias neglecta*. Notre confrère indique par quels caractères *Iris olbiensis* se différencie d'une espèce voisine également méditerranéenne, *Iris Chamæris* Bert.

M. MAGNIN complète l'intéressante communication de M. Coutagne, en montrant et en faisant circuler les magnifiques aquarelles de Mme Hénon, représentant les *Iris* rapportés de Provence et étudiés par notre confrère.

M. TIMÉBAUT présente un balai de sorcière sur épine-vinette, provenant de Marsannay (Côte-d'Or), et provoqué par les écidés du *Puccinia Arrhenatheri*.

M. MAGNIN donne ensuite lecture d'une partie du *Mémoire sur les Mycologues lyonnais*, qu'il a présenté à la Société Mycologique de France, lors de la session tenue à Lyon, au mois d'octobre dernier, particulièrement les chapitres concernant les observations de Hénon dans la région lyonnaise. Il signale également quelques-unes des introductions de plantes, notamment d'iris, de narcisses, etc., dues à ce botaniste, question sur laquelle il reviendra plus tard à cause de son importance.

ÉCHANGES, OFFRES ET DEMANDES

M. BATAILLE (Fréd.), 14, rue de Vesoul, Besançon (Doubs), dispose des ouvrages suivants, lui faire offre :

FRIÈS, *Systema mycologicum* (3 vol. cartonnés).

BIGEARD et GUILLEMAIN, *Flore des Champignons supérieurs de France* (3 vol., 490 p.).

LANESSAN, *Flore générale des Champignons*, broché.

JAILLARD-HARTMANN, *Iconographie des Champignons supérieurs* (250 pl. coloriées, reproduisant 2.381 espèces d'après les figures originales, 5 vol. encartonnés, état neuf).

DELACROIX et MAUBLANC, *Maladies des Plantes cultivées* (1 vol. broché, bon état).

DEBEAUX, *Flore de la Kabylie et du Djurdjura*, 1894 (1 vol. broché, bon état).

BATTANDIER, *Supplément aux Phanérogames de la Flore de l'Algérie*, broché, neuf.

Ch. CONTEJEAN, *L'Etage kimméridien* (1 vol., relié).

A. VEZIAN, *Etudes géologiques sur le Jura* (1 vol. relié).

Frédéric BATAILLE, *Œuvres poétiques* (2 beaux vol. in-12, reliés toile ornée, avec portrait et préface d'Eugène Manuel, ensemble franco, 11 fr.).

M. BLANC, naturaliste, Tunis, avise les personnes qui lui ont écrit au sujet d'un voyage projeté dans le Sud tunisien, qu'il n'a pu le faire,