

**BULLETIN BI-MENSUEL**

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Abonnement  
annuel } 10 francs.SIEGE SOCIAL A LYON :  
33. Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

2135 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux  
c/c Lyon. 101-98

MM. les Membres du Conseil d'administration sont priés de bien vouloir assister à la Reunion annuelle du Conseil, Lundi 12 Novembre, à 17 heures.

**PARTIE ADMINISTRATIVE****ORDRE DU JOUR**

DE LA

*Séance générale du Lundi 12 Novembre 1923, à 20 heures*1<sup>o</sup> Vote sur la candidature de :

M<sup>llo</sup> Chavanon, MM. Espagnol, Verlaine, Bézier, Accary, Robin, M<sup>me</sup> Desnuelle, MM. Desautel, Fressonnet, Chamussy, Baumié, Raphard, Roué, M<sup>mes</sup> Bagne, Mury, M<sup>lle</sup> Mury, MM. Pras, Barraud, Thivollier, Gayet, Crozier, Donat, Bernaud, Marat, Joubia, M<sup>lle</sup> Biansqui, MM. Lena, Gourland, M<sup>me</sup> Chapuis, MM. Pâtissier, Boré, M<sup>me</sup> Wœrner, M<sup>lle</sup> Harvaux, et de : M. Chappet (le chanoine Camille), 4, place Saint-Jean, Lyon, parrains MM. Bonnamour et Dejoux. — M. Jouffray (Joanny), Craponne (Rhône). — M<sup>me</sup> Laguerre (V<sup>ve</sup> Odette), Don, par Artemare (Ain). — M. Forgeot (Eugène), directeur des Services Vétérinaires du Rhône, Préfecture, Lyon. — M. Billard (Jean), sous-chef de bureau Lyon-Perrache, 1, rue Tramassac, Lyon. — M. Villard (Albert), 7, rue des Archers, Lyon. — M. Crozet (Marius), la Vautière, Saint-Symphorien-d'Ozon (Isère), parrain le Bureau. — M<sup>me</sup> Tisseur (V<sup>ve</sup> M.-Louise), 10, quai Claude-Bernard, Lyon, parrains MM. Fagot et Nicod. — M. Grandehamp (Charles), 36, rue de la Gare, Villeurbanne (Rhône). — M. Besson (Marius), 11, rue de la Quarantaine, Lyon. — M. Sage (Aimé), agent d'assurances, 44, place de la République, Lyon. —

la seconde (médiane) est plus recourbée et plus élargie en dedans en finissant par une partie arrondie (pas par un point presque isolé), atteint le second tiers de l'élytre, sans toucher le bord ni la suture; la troisième, très anguleusement dilatée à sa partie moyenne, arrive jusqu'au bord postérieur de l'élytre et se prolonge vers la suture où elle se termine par une partie arrondie dans l'angle apical. La deuxième et la troisième lunules sont unies par une large bande.

Cette aberration est presque semblable à l'ab. *subulicola* Waltl. (fig. 1), mais elle en diffère par sa liaison entre la seconde et la troisième bande plus large et par ses lignes de points subsuturales de la même coloration que les bandes (fig. 2).

## SECTION MYCOLOGIQUE

Séance du 15 Octobre

M. JOSSEBRAND fait un exposé des mycosymbioses et des mycoparasitismes. Il examine le cas des Lichens et des Orchidées.

M. POUCHET communique une self expérience qui démontre la non toxicité de *Volvaria volvacea* et de *V. gloiocephala*.

Notons parmi les espèces présentées : *Armillaria aurantia*, *Entotoma lividum*, *Ent. madidum* (Saint-Quentin-Fallavier), *Inocybe cincinnata* (la Tour-de-Salvagny).

## SECTION BOTANIQUE

Séance du 23 Octobre

M. CHASSIGNOL fait présenter un cas d'hémisyncarpie, ou soudure partielle de deux gousses de haricots récoltées à la Boulaye (Saône-et-Loire).

M. l'abbé MONNET a recueilli à Chevillard (Ain), entre 800 et 900 mètres d'altitude, une forme de *Gentiana flava* (*G. obtusifolia* var. *flava*, Cariot et St-L.) présentant, sur les mêmes pieds, des fleurs tétramères et pentamères. On sait que *G. Germanica*, auquel les auteurs rattachent généralement *G. obtusifolia*, est à fleurs pentamères, alors que *G. campestris*, espèce voisine, présente des fleurs tétramères. Notre collègue a pu remarquer qu'on trouve de temps en temps, sur *G. campestris*, cinq sépales à la fleur du sommet, dont deux très développés comme dans le type tétramère normal. Cette fleur ressemble à celles qui sont les plus nombreuses sur *G. flava*, où deux sépales prédominent, mais moins fortement. Dans l'une et l'autre espèce l'importance relative des deux grands sépales diminue à mesure qu'on descend le long de la tige, et dans *G. flava* on finit par trouver quatre ou cinq sépales à peu près égaux, à lobes lancéolés aigus dans les fleurs les plus basses, et c'est un point de ressemblance avec *G. Germanica*.

### Sur la présence de « *Collomia grandiflora* » Dougl., dans la vallée de la Loire

PAR M. F. CHASSIGNOL

Le Groupe de Roanne (*Bulletin* n° 6, du 22 mars 1923, p. 36) dit que cette plante est abondamment naturalisée à Roanne. Il invite les botanistes à surveiller son extension et à noter de nouvelles stations.

Or, depuis 1912, je constate sa présence à Bourg-le-Comte (S.-et-L.), sur