

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOUT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES

et de leur GROUPE DE ROANNE

Secrétaire général : M. LOCQUIN, 76, bd des Belges, 6^e. Trésorier : H. GRAVEL, 1, rue Bellecour, 2^eSIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet, 6^e (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL C/C P Lyon 101-08	}	France et Colonies Françaises.	100 francs
		Etranger	200 —

La SOCIÉTÉ LINNÉENNE vient de subir une perte immense en la personne du D^r Stéphane BONNAMOUR, membre d'Honneur de notre Société, qu'une longue maladie retenait éloigné de nos séances depuis plusieurs mois. Dans les diverses fonctions qu'il a occupées depuis son admission en 1912, il a fait preuve d'un dévouement de tous les instants, qui a atteint un maximum rarement dépassé pendant la longue période où il remplissait simultanément les charges de *Secrétaire général* et de *Bibliothécaire*.

En attendant qu'une notice plus détaillée rappelle son œuvre de naturaliste, la SOCIÉTÉ LINNÉENNE a le pénible devoir de présenter à Madame BONNAMOUR et à toute sa famille ses condoléances attristées.

8. Var. *Trabutii* Maire in *Bull. Soc. hist. nat. Afr. N.*, XXXIII, 96 (1942) = *N. unilateralis* var. *montana* (Boiss.) Trab. in Batt. et Trab. *Fl. Alger*, 101 (1884) = *N. montanius* Trab. in Batt. et Trab. *Fl. Alger.* (Monoc.), 234 (1895); non Boiss. et Reut.

Race nord-africaine (montagnes du S. Oranais, Moyen Atlas, Rif) différant du var. *aristatus* par les glumelles plus longues, 4, 5-5 mm. (et non 3-4 mm.), par l'épi ordinairement plus court, à épillets moins apprimés.

♂¹. *Subvar. leianthus* Maire, *l. c.*

♂². *Subvar. dasyanthus* Maire, *l. c.*

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 12 mai 1945

ÉTUDE SUR LA FLORE DU MASSIF DES AIGUILLES D'ARVES

Par G. NÉTIEN

L'article publié en 1945 n^o 2, p. 30 ; 3, p. 63 ; 4, p. 65 se terminera par la liste des espèces au cours de l'année 1946.

ERYTHRUS ATRIPENNIS PIC Ab. PICI

Par M. DAYREM

Diffère du Type par la présence, de chaque côté de l'étui, d'une grande tache humérale rouge de forme arrondie, envahissant l'épipleure jusqu'à l'extrême rebord.

Un sujet reçu d'Hoa-Binh, Tonkin.

ÉTUDES LÉPIDOPTÉROLOGIQUES (VIII) (1)

Révision du Catalogue des espèces françaises du genre *EREBIA*.

(Lépidopt. *Satyridae*)

(Suite du Mémoire du D^r Philibert RIEL).

Par Henri TESTOUT (Lyon).

Notre regretté Président, le D^r RIEL, enlevé trop tôt à l'affection de ses collègues, n'a pu malheureusement terminer la révision des *Erebia* français, dont il avait commencé la publication dans notre Bulletin.

Conformément au désir qu'il a exprimé, nous essayerons de terminer cette révision dans le même esprit que celui que lui avait donné notre regretté Maître, c'est-à-dire de permettre aux lépidoptéristes français la détermination et la classification des nombreuses formes d'*Erebia* qui vivent dans nos régions et qui sont complètement ignorées des ouvrages généraux ou

(1) Voir VII, in *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon*, XI (9), p. 133, nov. 1942.