

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX: ROANNE, BOURGÔIN, VALENCE, etc.

Secrétaire général: M. J. FIASSON, 48, rue Tête-d'Or, Lyon 6^e.Trésorière: Mlle M. FRÈREJEAN, 14, rue Général-Plessier, Lyon 2^e.SIEGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet, 6^e (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises	200 francs
C/C. P. Lyon 101-98	Etranger	400 —

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : Mardi 8 Juin, à 21 h., au siège

Approbation des comptes et du bilan de l'exercice 1947

Rapport du censeur. — Nomination du censeur.

CONSEIL D'ADMINISTRATION : Mardi 8 Juin, à 20 h. 15

Vote sur l'admission de :

M. Ladislav LIZEC, Praha Brevnov, Palm 10, Tchécoslovaquie, parrains MM. Coquillat et Denninger. — M. le Prof. Dr. G. KOLOSVARY, Museum Korut, Budapest VIII (Hongrie), parrains MM. Coquillat et Fiasson. — M. Albert STAIB, 43, rue Victor-Hugo, Fontaine (Isère), parrains MM. Rey et Martin. — M. JOUSSEAU Claude, 23, rue Montgolfier, Lyon, parrains MM. Coquillat et Ponchon.

Questions diverses.

SECTION ENTOMOLOGIQUE : Mercredi 9 Juin, à 20 h. 15H. de LESSE : *Hipparchia fagi* Scop. et *H. aelia* (*Satyrus hermione* L. et *S. alcyone* Schiff.). (Lépidoptères).

Compte-rendu de l'excursion de Mai 1948, en Dombes.

Présentation d'insectes. — Questions diverses.

SECTION BOTANIQUE : Samedi 12 Juin, à 16 h. 30M. CHOISY : Causerie sur la classification des Lichens (*suite*).L. BOUDET : Quelques remarques sur les verticilles floraux (*causerie*).

Présentation de plantes. — Questions diverses.

SECTION GENERALE (Anthropologie, Biologie, Sciences naturelles) :**Samedi 19 Juin, à 16 heures**P. RÉMY : Description de *Sphaeronicola cebenica* n. sp., Ostracode Cytheride commensal de l'Isopode Cirrolanide cavernicole *Sphaeronides Raymondi* Dollfus.

A. COLLET : Note sur les dépôts de calcite dans les fentes des roches éruptives et cristallophylliennes.

Questions diverses.

le bord interne diffus par suite de l'absence de la ligne brune, le cercle jaune des ocelles plus vif et par le dessous des post. qui est presque unicolore, les lignes dentées étant absentes ou presque invisibles.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE : *Hautes-Pyrénées* : Gèdre (FOULQUIER). — Gavarnie, Col de Riou, Oulettes du Vignemale (ÖBERTHÜR). — Vallée de l'Iléou, Plateau de Culaous (RIEL).

Cette forme, très particulière, possède une armure génitale sensiblement différente de celle de *pandrose*, mais WARREN ne conclut pas à une séparation spécifique de *sthenny*, car il a rencontré tous les passages entre ces deux armures.

Présenté à la Section entomologique en sa séance du 11 Février 1948

(à suivre)

UNE NOUVELLE ESPECE FRANÇAISE DE BUPRESTIDE

par Léon SCHAEFER

Phænops sumptuosa Abeille de Perrin, *Bol. real Soc. esp. Hist. nat.* (1904), p. 214.

Très proche de *Formaneki*. Forme un peu plus allongée en moyenne, plus parallèle. Aspect plus luisant, sculpture moins accusée, plus régulière. Pubescence moins développée.

Articles antennaires plus longs, 8-10 une fois 1/2 à une fois 3/4 plus longs que larges, le 11^e plus petit que le 10^e.

Pronotum sinué sur les côtés avant la base, les angles postérieurs moins arrondis, moins saillants, par suite l'angle pronoto-élytral moins marqué. Ponctuation plus régulière, les points arrondis sur le disque où ils ne forment pas de rides sensibles ; côtés sans nervures longitudinales (rapprochement vers *Formaneki* f. typ.), à points plus serrés, un peu allongés. Ecusson environ 2 fois plus large que long, sans coulisse.

Elytres subparallèles sur les 2/3 basaux, non ou très faiblement élargis au 2^e tiers ; surface aussi convexe et aussi peu inégale ; denticulation apicale plus prononcée. Points et rides moins accusés. Pubescence moins longue, presque indistincte sur le 1^{er} tiers, sauf parfois vers les épaules. Pulvérulence assez visible.

Longueur : 6,75 - 10 mm.

Dessus vert doré ou bronzé doré léger, mais le plus souvent avant-corps plus ou moins vert doré et élytres variant du cuivreux doré clair au cuivreux pourpré ; plus rarement dessus entièrement cuivreux doré ou pourpré. Dessous, antennes et pattes vert doré obscur ou vert bleuâtre.

♂. Moitié apicale des métatibias denticulée intérieurement. Dépression du sternite IX en ellipse transverse beaucoup plus accusée et mieux délimitée.

Genitalia semblable, peu chitinisé. Pénis à sillon dorsal bien plus creusé, la pointe moins large et moins arrondie ; extrémité des paramères concolore, non roussâtre.

♀. Métatibias inermes. Antennes un peu plus courtes que chez le ♂, les articles terminaux plus rectangulaires. Sternite apical et oviscapte comme chez *Formaneki*.

Cette espèce se distingue sans peine de *cyanea* par la sculpture pronotale, le corps plus parallèle, les élytres moins inégaux avec l'apex

plus fortement denticulé, la forme des antennes, la coloration, la structure du dernier sternite et du genitalia ♂, etc.

La description que je viens de donner concerne les individus dont il est question plus loin, que, d'après la diagnose originale, je rapporte avec une grande probabilité au *Ph. sumptuosa* Ab. Les circonstances actuelles ne permettent pas de recourir au type qui se trouve au Muséum de Madrid, mais d'après des renseignements qui m'ont été communiqués, l'identité paraît certaine. En tout cas les termes d'ABEILLE s'appliquent bien à mes exemplaires; notamment la sculpture régulière du pronotum est très caractéristique.

Le type a été décrit d'Espagne: La Sagra, une ♀ (DE LA ESCALERA). A ma connaissance aucune capture n'a été signalée depuis la description d'ABEILLE. J'ai découvert cette remarquable espèce dans les Pyrénées-Orientales: Vernet-les-Bains, une ♀; 6-1945. J'y ai repris une petite série en 6-1947 dans les mêmes conditions.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 12 Mai 1948.

NOUVEAUX GALERUCIDES DE MADAGASCAR

(Col. Phytophaga)

par Jan BECHYNE (Prague)

Genre *Hildebrandtina* Weise

Les espèces de ce genre forment les passages entre les familles de *Galerucidae* et de *Halticidae*. Quelques-unes ont les cuisses postérieures robustes, les autres les ont grêles. D'après les observations signalées par M. F. HEIKERTINGER (Kol. Rundsch., 26. 1940, p. 68) le genre *Hildebrandtina* doit prendre place parmi les *Galerucides*.

1 (6) Cuisses postérieures robustes, élytres sans tubercules, régulièrement ponctués-striés.

2 (5) Elytres partout régulièrement ponctués-striés.

3 (4) Prothorax, avant l'impression transversale antérieure, rugueusement ponctué. Semblable à la suivante, plus sombre, élytres bruns, chacun orné de deux grandes taches discales, oblongues, pâles. Tête inégale, munie de rugosités irrégulières. Prothorax fortement ponctué-rugueux, muni seulement d'une impression transversale en avant, côtés peu atténués vers la base. Long. 2, presque 3 mm. Hab. Rég. Maroantsetra: Mahakiry, 11. 1948 (V.*); Sahantaha, 11. 1938 (V.); Nandihizina, 12. 1938 (V.) *H. similis* n. sp.

4 (3) Prothorax lisse avant l'impression transversale antérieure. Dessous d'un brun de poix, dessus avec les pattes et les antennes (plus sombres vers le sommet) testacé, les côtés du pronotum, la suture, les bords latéraux des élytres, trois bandes transversales (postbasale, médiane et antéapicale) sur chacun, dont la première et la troisième irrégulières et interrompues, d'un brun plus ou moins sombre. Tête brune, rugueuse sur le vertex; les rugosités sont transversales, vers les tubercules frontaux, plus obliques. Front profondément sillonné longitudinalement (comme chez les autres espèces). Prothorax ayant la plus grande largeur avant le milieu, rugueusement ponctué, muni de deux impressions transversales, dont la basale peu profonde; côtés atténués vers la base. Long. 2,5 mm. Hab. Rég. Maroantsetra: Mahakiry, 11. 1938 (V.) *H. halticoides* n. sp.

5 (2) Elytres à séries de points peu régulières et plus ou moins dédoublées en avant, intervalles peu convexes.

Testacé, dessous plus ou moins brun de poix, les bords du pronotum, écusson, et les taches des élytres d'un brun profond: une tache humérale, une autre allongée postbasale sur le quatrième intervalle, une petite posthumérale et une bande arquée transversale derrière le milieu, n'atteignant ni la suture ni le bord latéral. La marge externe d'un brun de poix. Tête finement rugueuse. Prothorax inégal, lisse avant l'impression transversale antérieure qui est profonde et ponctuée. Elytres peu régulièrement ponctués en avant, très régulièrement vers l'extrémité, les intervalles discaux à peine, les latéraux sensiblement