

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, etc.

Secrétaire général: M. J. FIASSON, 48, rue Tête-d'Or, Lyon 6^e.
Trésorier: M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon 6^e.

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet, 6^{me} (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises	300 francs
C. C. P. Lyon 101-98	Etranger	600 —

PARTIE ADMINISTRATIVE

EXPOSITION GENERALE D'HISTOIRE NATURELLE

9 - 12 Juin 1949

Salle des Fêtes de l'A. I. C. A., 26, Place Tolozan

L'ouverture aura lieu le jeudi 9 Juin à 14 heures et la fermeture le dimanche 12 Juin à 18 heures.

L'installation se fera le mercredi 8 Juin à partir de 8 heures et devra être terminée à l'ouverture bien que les échantillons puissent être reçus encore durant l'exposition et jusqu'au samedi soir.

Nous renouvelons notre appel pour que tous nos membres et leurs amis participent personnellement à cette manifestation en nous apportant les échantillons, objets et documents de toute nature ayant rapport avec l'Histoire Naturelle et les plus aptes à retenir l'attention du public et à faire connaître notre activité. Nous recherchons :

Collections de plantes sèches en herbier, de plantes fraîches indigènes ou exotiques, fruits, cas tératologiques et de parasitisme, Mousses, Lichens, Algues, Hépatiques, Champignons, etc...

Collections d'insectes de tous ordres: Lépidoptères, Coléoptères, Hémiptères, Névroptères, Diptères, Orthoptères, Hyménoptères; Arachnides, Myriapodes, Présentations en groupes biologiques, élevages.

Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Poissons, animaux aquatiques, naturalisés et surtout vivants.

Echantillons de roches et fossiles, particulièrement de la région lyonnaise.

Echantillons préparés pour examen sous loupe ou microscope avec cartons explicatifs. Microphotographies. Appareils anciens ou modernes.

Tous montages démonstratifs ou curieux, fixes ou animés, réalisés par nos sociétaires qui auront la faculté de les installer et les présenter personnellement ou de nous les confier.

Tous objets de collections ou curieux se rapportant aux sciences naturelles, à l'Anthropologie, la Biologie; coquilles, squelettes, moulages, armes, outils, parures, etc...

Tous documents curieux, artistiques ou instructifs, tableaux, cartes, graphiques, photographies, peintures, livres, etc... susceptibles de garnir nos tables, d'orner la salle ou de venir à l'appui des échantillons présentés.

**DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DE QUELQUES TABANIDAE
DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE. — LOCALITE NOUVELLE
DE *CYRTOPOGON MEYERDURI* (DIPTERES ORTHORHAPHES)**

par le D^r E. ROMAN.

En dépit de leurs habitudes hématophages, les Tabanidae retiennent peu l'attention des entomologistes et des parasitologues Français ; presque tout ce qui est connu de leur répartition géographique dans notre pays a été rassemblé par E. SÉGUY (1926) dans le fascicule 16 de la Faune de France, dont je suivrai dans les grandes lignes la classification. L'étude de mes récoltes, des collections lyonnaises et de matériaux communiqués par des collègues obligeants, que je me plais à remercier ici, me permet d'ajouter quelques renseignements nouveaux sur plusieurs espèces peu répandues.

Chrysoops parallelogrammus Zell. — (Lyon M.) Montessuy près Cauire (Rhône) ¹, une femelle capturée par GRILAT le 28-VIII-1910 et conservée dans la collection CÔTE-GRILAT au Muséum de Lyon. Cet exemplaire est en assez mauvais état, mais la détermination de GRILAT est certaine. En France, l'espèce n'était jusqu'à présent connue que de l'Anjou.

Chrysozoni grandis Macq. - J'ai signalé en 1947 la capture de femelles de cette espèce à Crémieu (Isère) par le très regretté Victor BATTETTA. Notre jeune collègue J. DAVID m'a remis depuis deux individus du même sexe capturés non loin de Nîmes sur la route d'Alès (1948) ; leur taille est sensiblement plus petite que celle des exemplaires de la région lyonnaise. A part la coloration des pattes antérieures, ils correspondent d'une manière satisfaisante à la description de *C. Lambi* établie par J. VILLENEUVE (1921) d'après des femelles prises au Beausset (Var). Si cette interprétation est exacte, il convient de réunir cette unité à *C. grandis*, dont elle représente peut-être une petite race de la région méditerranéenne.

Tabanus (Szyladinus) luridus Fall. (non Loew). — Le 30 avril 1943, j'ai recueilli à Coise, hameau du Puits (Savoie), une femelle de cette espèce très rare en France. E. SÉGUY ne la signale que de la Haute-Saône et des Landes.

Tabanus (Straba) paradoxus Jaennicke. — Ce grand Diptère très localisé dans le sud-est de la France est cité par E. SÉGUY de Grenoble, des Cévennes du Gard et de Cavalaire (Var) ; F. VAN GAVER et J. TIMON-DAVID (1928) le signalent de La Viste près de Marseille. Il est assez fréquent au mois d'août aux environs de Crest (Drôme) dans les communes d'Aouste et de Piégros-la-Clastre sur le versant nord de la montagne de Rochecolombe ; j'ai trouvé les deux sexes pendant la journée sur le sable humide au bord de ruisseaux à cours rapide ; j'ai capturé une femelle gorgée de sang sur un bœuf le 20 août 1943 vers 11 heures du matin ; d'autres se sont fait prendre à la tombée de la nuit dans des locaux d'habitation.

Tabanus (Straba) rectus Loew — Notre distingué collègue L. SCHAEFER m'a communiqué deux femelles de ce bel insecte capturées à

1. Cf. L. BERLAND, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1926, p. 178.

Vienne (Isère) en août 1946. C'est une espèce méridionale et occidentale signalée de Grenoble par J. VILLENEUVE (1904), mais qui n'était pas encore citée de la région lyonnaise.

Tabanus (Theriopectes) gigas Herbst. — J'ai déjà fait connaître (1946) la capture dans les Monts du Lyonnais d'un mâle de ce magnifique Tabanidae toujours rare et disséminé. J'ai depuis trouvé une femelle de la même espèce le 27 mai 1947 à Champagne (Rhône) dans le vallon du ruisseau de Limonest. Chez ces deux individus, la fourrure jaune recouvre les deux premiers tergites abdominaux.

Je profite de l'occasion pour publier la capture que j'ai faite au cours de l'excursion de la Linnéenne en Queyras d'un Asilidae à peine connu de France. Cet insecte de sexe femelle que je n'avais pas réussi à identifier a été déterminé récemment *Cyrtopogon Meyerduri* par le très éminent Diptériste du Muséum de Paris, M. E. SÉGUY, que je tiens à remercier très cordialement. Sa localité d'origine, le col de Furfande près Arvieux (Hautes-Alpes) (20 juillet 1947), n'est distante que d'une quinzaine de kilomètres de St-Véran, sa seule station dans notre pays (R. BENOIST legit 6-VIII, d'après E. SÉGUY, 1927). Cette espèce alpestre reste donc actuellement très localisée dans un territoire restreint proche de la frontière italienne.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 13 Avril 1949.

EUPHORBIA MACULATA L. ADVENTICE A VILLEURBANNE (Rhône)

par L. BOUDET.

J'ai trouvé cette rare espèce dans la corbeille de plantes artificielles, sur la tombe de mon frère, au cimetière de Cusset (nouveau), le 15 août 1948.

Elle est de taille minime et rampe à terre, ce qui lui donne l'aspect d'un minuscule pourpier.

Elle se rapproche beaucoup pour la forme d'*E. Chamaesyce*, près de laquelle elle est ordinairement classée, ou encore d'*E. pepelis*, sa voisine de forme.

Ce qui la distingue surtout ce sont ses petites fleurs axillaires et une tache généralement en forme de fer de flèche, d'un pourpre noir, sur la face supérieure des feuilles et qui lui a valu son nom.

Non signalée par CARIOT (*Flore du Bas. Moyen du Rhône et de la Loire*), ni par BONNIER et LAYENS (*Flore portative de France*), on en trouve une description, sommaire il est vrai, mais suffisante, dans: *Les quatre Flores de France* de P. FOURNIER, (page 266, n° 1206 bis).

On la trouve aussi dans BINZ et THOMMEN (*Flore de Suisse*), page 239, près d'*E. Nutans* Lag., et dans l'Atlas de la même Flore, page 137, n° 1730, assez bien, quoique sommairement figurée.

Cette plante nord-américaine, suivant FOURNIER, se répand çà et là en France, ce dernier auteur la signalant d'Alsace, de l'Ouest, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, etc...

C'est la première fois que je la rencontre dans la région lyonnaise depuis que j'herborise. Je serais reconnaissant aux collègues qui l'ont récoltée dans notre région de bien vouloir, me signaler leurs récoltes.

Une bonne description de cette plante est donnée dans *Bull. Soc. Bot. de France*, T. 83, année 1936, page 232, par G. GUINET, dans son étude sur la Flore adventice de la région parisienne.

Présenté à la Section Botanique en sa Séance du 12 Février 1949.

77^{me} Session extraordinaire de la Société Botanique de France

Cette session se tiendra dans les Alpes-Maritimes du 17 au 29 Juillet prochain. Le programme détaillé est envoyé sur demande à la Société Botanique, 4, avenue de l'Observatoire à Paris.