

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE
DE LYON

Fondée le 10 Février 1881

TOME DIX-SEPTIÈME

1898

LYON
H. GEORG, LIBRAIRE
PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU, 36-38

PARIS
MASSON & C^{ie}, LIBRAIRES
120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

1899

CLV^e SÉANCE. — 12 Février 1898.

Présidence de M. LESBRE, Ancien président.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

CORRESPONDANCE

M. L. Guinard, secrétaire général adjoint, donne lecture d'une lettre de M. Dor, qui, indisposé, ne peut venir présider la séance, et présente divers ouvrages offerts par leur auteur, M. Ory, récemment élu membre titulaire de la Société d'anthropologie.

OUVRAGES OFFERTS

- Annuaire statistique de la ville de Paris*, 16^e année, 1895.
Tableaux mensuels de statistique municipale de la ville de Paris, août 1897.
Bulletin hebdomadaire de statistique municipale, 18^e année, n^o 52, 1897.
Annales du Musée Guimet, t. XXVI, n^{os} 2, 4 et 5, 1898.
Revue de l'Histoire des Religions, t. XXXVI, n^o 1, juillet-août 1897.
L'Anthropologie, t. VIII, n^o 6, 1898.
L'Intermédiaire de l'Asie, t. III, février 1898.
Revue mensuelle de l'École d'anthropologie 3^e année, n^o de janvier, 1898.
Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, t. III, fascicule 4.
Compte rendu des séances de la Société géologique de France, n^{os} 1, 2, 3, 1898.
Bulletin de la Société de géographie, 7^e série, 3^e trimestre, 1897.
Comptes rendus des séances de la Société de géographie, n^{os} 16, 17, 18, 19 et 20, 1897.
Société de Borda, Dax (Landes), 22^e année, 1897.

- Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France*, 4^e trimestre, 1897.
- Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Tarare*, 3^e année, n^o 1, 1898.
- Société de géographie commerciale de Bordeaux*, 20^e année, n^{os} 23 et 24, 1897, 21^e année, n^{os} 1, 2 et 3, 1898.
- Société languedocienne de géographie*, bulletin 20^e année, 1897.
- Société d'histoire naturelle d'Autun*, 9^e bulletin.
- M. Joseph Ory, *La production chevaline en France. — De l'élevage du cheval. — Des effluves ou émanations paludéennes. — Des revendications agricoles et vétérinaires en France. — Histoire du cheval dans le Forez.*
- Société royale belge de géographie*, 21^e année, n^o 2, 1897.
- Atti della reale Accademia dei Lincei, rendiconti classe di scienze fisiche, matematiche e naturali*, vol. VII, fascicules 1 et 2, 1898.
- Rendiconti della reale Accademia dei Lincei, classe di scienze morali storiche e filologiche*, vol. VI, fascicule 2, 1897.
- Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft, in Wien*, t. XXVII, 1897.
- Finsktmuseum*, IV, 1897.
- Suomen Museo*, IV, 1897.
- Samfundet for Nadiska Museets*, 1897.
- Proceedings of the royal Irish Academy*, décembre 1897.
- Proceedings of the American Association*, avril 1897.
- Bulletin of the United States Geological Survey*, n^{os} 127, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 1896; n^o 87, 1897.
- United States Geological Survey*, Annual report, 1895-96. — Monographies, XXV, XXVI, XXVII et XXVIII. — Atlas accompagnant le tome XXVIII.
- Annual report of the bureau of Ethnology*, 1892-1893, 1893-1894, 1894-1895.
- Memoirs Reabody Museum*, vol. 1, n^o 2 et 3.

ÉLECTIONS

M. le D^r Vauthey, de Vichy, présenté par MM. Dor, Guinard, Lesbre, est élu membre titulaire.

PRÉSENTATIONS

M. F.-X. Lesbre présente deux omoplates de chien. Ces pièces anatomiques proviennent d'un chien ectromèle que *M. Lesbre* avait présenté en la séance du 8 mai 1897¹.

Le présentateur se proposait de faire de ce chien une étude anatomique complète; malheureusement il est mort pendant les vacances dernières, et on n'a pu rechercher les lésions qui, dans les centres nerveux, pouvaient accompagner l'absence des membres antérieurs.

Le squelette ne présentait pas d'autre anomalie; les omoplates sont presque normaux, un peu incurvés sur le plan latéral du thorax. Tout en regrettant que les résultats anatomiques espérés n'aient pas été obtenus, on peut trouver dans ces pièces de squelette une preuve nouvelle que le développement de la ceinture scapulaire est indépendant de celui des membres qui s'y attachent.

M. Lesbre attire ensuite l'attention sur deux nouveaux cas qui montrent d'une façon très nette l'influence d'un premier mâle géniteur dans l'imprégnation de la femelle.

M. Lesbre a communiqué à la Société, en 1896, un travail relatif à cette question de la *télégonie*¹, et c'est pourquoi il apporte aujourd'hui la relation de deux cas nouveaux, d'une authenticité incontestable, qui viennent s'ajouter à ceux rapportés dans son mémoire.

Le premier est signalé par *M. Bathiat-Lacoste*, bien connu par son bel élevage de saints-germains.

¹ Présentation d'un chien de six mois né sans membres thoraciques (*Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon*, t. XVI, p. 339, 1897. Discussion p. 341-343).

¹ Contribution à l'étude de la télégonie (*Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon*, t. XV, p. 36-47, 1896. Discussion, p. 47-49 et 104-106).

« Il y a près de vingt-cinq ans, écrit-il, habitant Douai, je possédais une chienne d'arrêt griffon poil dur, orange et blanc, âgée de quatre ans, répondant au nom de *Sapho*, que je fis couvrir par un splendide braque café au lait, poitrail et pattes blanches, appartenant à M. Landry, de Douai. *Sapho* eut une portée de sept petits : quatre griffons et trois poils-ras ressemblant au père. Un an plus tard, *Sapho* était couverte par un griffon semblable à elle ; la portée comprenait neuf chiots : six griffons, un demi-griffon et deux poils-ras exactement semblables au chien de M. Landry. Il était impossible de ne pas les reconnaître. »

Le deuxième cas est une véritable expérience due à M. le professeur Ewart, de l'Université d'Edimbourg.

Ayant fait s'accoupler un zèbre et une jument, il en naquit un petit mulet dûment zébré comme son père.

La jument fut unie ensuite à un étalon arabe, et la mise-bas vient d'avoir lieu.

« Le poulain, fils de l'arabe et de la jument anglaise, est bai foncé. Les deux ou trois premiers jours qui suivirent sa naissance rien ne le distinguait de tous les autres poulains ; à partir du troisième jour, des raies transversales commencèrent à se montrer, et le neuvième (date de la lettre), elles étaient très apparentes. Les bandes qui existent sur la croupe, sur les flancs, sont exactement les mêmes, occupent les mêmes places que chez l'hybride issu du croisement antérieur. L'intensité des bandes semble augmenter de jour en jour. »