

# BULLETIN

DE LA

# SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE

DE LYON

Fondée le 10 Février 1881

---

TOME VINGT-CINQUIÈME

---

1906

---

LYON

H. GEORG, LIBRAIRE

PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU, 36-38

PARIS

MASSON & C<sup>ie</sup>, LIBRAIRES

120, BOULEVARD SAINT-GERMAIN

1907

# SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE

## DE LYON

---

CCVIII<sup>e</sup> SÉANCE. — 13 Janvier 1906

Présidence de M. DEPÉRET, président

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

### INSTALLATION DU BUREAU

L'installation du Bureau pour l'année 1906 se fait très simplement, et, après quelques mots de M. Etienne Martin, président sortant, et une courte réponse du nouveau président, M. Depéret, la séance est ouverte.

### COMMUNICATION

#### **SIGNIFICATION ANATOMIQUE ET VALEUR MÉDICO-LÉGALE DU « POINT DE RÉCLARD »**

*(Point d'ossification de l'extrémité inférieure du fémur.)*

PAR M. LE D<sup>r</sup> ETIENNE MARTIN

*Le texte de cette communication n'ayant pas été remis au secrétariat ne peut être publié ici. En voici le résumé sommaire :*

Béclard, en 1819, dans un mémoire remarquable sur l'ostéose ou la nutrition des os, a décrit ainsi le point qui porte son nom :

« A la naissance, il y a un point osseux, pyriforme, dans

le centre du cartilage qui forme l'extrémité inférieure du fémur ; ce point commence à s'ossifier environ quinze jours avant la naissance. »

Il est parfaitement confirmé que la date d'apparition du point de Béclard se fait en moyenne vers huit mois et demi, mais que, sur les nouveau-nés à terme, la recherche de ce point n'est pas toujours positive. Le point de Béclard est inconstant ; ses diamètres sont excessivement variables et ses variations sont dues probablement, soit à des modifications de la nutrition, soit à des influences diathésiques.

Le développement du point de Béclard n'est pas absolument symétrique et l'on trouve des variations assez grandes chez le même fœtus d'un fémur à l'autre, avec prédominance des diamètres du côté gauche.

L'établissement de la respiration chez le nouveau-né n'a aucune influence sur le développement du point de Béclard et il ne saurait être considéré comme une preuve de vie : c'est simplement un témoin de maturité du fœtus.

#### DISCUSSION

*M. le Dr Depéret.* — Dans quelle partie exacte du fémur trouve-t-on ce point ?

*M. le Dr Martin.* — C'est le point médian épiphysaire qui se trouve au niveau de la poulie intercondylienne.

*M. le Dr Lacassagne.* — M. Rollet a pu dire que l'homme est droitier pour le membre supérieur et gaucher pour le membre inférieur, ce qui explique ce fait de l'apparition plus précoce du point de Béclard sur le fémur gauche. Du reste, le côté gauche a d'autres particularités intéressantes : c'est ainsi que le testicule gauche descend plus bas que le droit. Un médecin militaire dont le nom lui échappe a montré que les poils de l'aisselle gauche se développent avant ceux de l'aisselle droite.