

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, etc.

Secrétaire général : M. J. FIASSON, 48, rue Tête-d'Or, Lyon 6^e.
Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon 6^e.

SIEGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet, 6^{me} (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises	400 francs
C. C. P. Lyon 101-98	Etranger	600 —

PARTIE ADMINISTRATIVE

COMPTE-RENDU MORAL DU PRESIDENT POUR 1950

par J. VIRET.

S'il y a lieu de se réjouir de la situation financière de la Société qui a permis de faire paraître la moitié des numéros de notre Bulletin sur 32 pages, nous devons cependant nous garder de nous reposer sur nos lauriers. Nous irions tout droit à la paralysie, contre laquelle cet arbuste serait impuissant et les fustigations d'ortie seul remède efficace.

Sans doute les grandes sections ont eu chacune leur activité propre. Il m'est cependant agréable de mettre au tableau d'honneur celle de Mycologie qui a fait preuve d'un dévouement remarquable, a multiplié les sorties, et a connu avec son exposition d'octobre un succès mérité. Celui-ci s'est traduit par un nombre appréciable d'adhésions nouvelles. Je ne pense pas que parmi les nouveaux membres, il en est qui aient été poussés par le démon de la gourmandise ; mais quand même cela serait, il nous suffit de savoir que les Muses savent se servir de moyens détournés pour attirer à elles de nouveaux adeptes.

Nous sommes heureux de constater la vitalité du groupe de Roanne. La création d'un Musée d'Histoire Naturelle dans cette ville en est certainement la conséquence ; elle sera pour nos collègues un encouragement. Nous saluons aussi la naissance prochaine du groupe de Saint-Etienne. La grande cité industrielle du Jarez, bien placée au centre d'un bassin houiller important, à proximité du Pilat, des gorges de la Loire ou des plaines du Forez, se doit de rattraper son retard. Il importe que les amateurs éclairés qui s'y trouvent, se groupent pour coordonner leurs efforts et accroître leur rayonnement.

Le but fondamental de notre Société, ne l'oublions pas, est de développer le goût des Sciences naturelles dans le grand public. Ceci nécessite un effort de notre part, car ce penchant est moins inné dans les pays latins que chez les peuples anglo-saxons. Il y a un courant à créer, affaire de patience et de persévérance. Le Muséum de Lyon s'efforce d'y faire face dans la mesure des crédits modestes mis à sa disposition. Son action serait certainement plus efficace

Lioran, assez souvent de teinte notablement foncée, lorsqu'on se rapproche du sommet, au voisinage des tourbières, à l'altitude 1700 m. Même tendance chez la même sous-espèce au Sancy également; enfin à Pierre-sur-Haute.

L'espèce *C. arvensis* présente à Pierre-sur-Haute un pourcentage considérable d'individus mélanisants (altitude 1500-1600 m.).

Carabus monilis nous donne dans cette dernière station une riche gamme de coloris où les exemplaires nigrescents ne sont pas rares. Enfin l'espèce *Carabus cancellatus*, de teine normale bronzée, cuivreuse ou verte, donne lieu à un mélanisme très poussé dans le cas de certaines colonies de haute altitude (2.000 à 2.300 m.): exemplaires des Alpes du Dauphiné.

2. — Causerie très documentée de M. DIEUDONNÉ sur la spore et la graine avec schémas à l'appui.

3. — M. LARUE présente de beaux cristaux de quartz améthyste et de quartz fumés trouvés dans le ruisseau de Ris-Cros, dans le massif du Montoncel, à environ 2 km. du Col de la Charme. Les filons de quartz ont été repérés, en direction Ouest, à environ quinze cents mètres de l'endroit où la route de St-Priest-La-Prugne à Arconsat traverse le ruisseau.

Assemblée générale du 11 Décembre 1950.

Après l'approbation du compte-rendu moral et financier, le bureau pour 1951 a été constitué de la façon suivante :

Président d'Honneur: MM. BERTRAND, LARUE, Charles MURY, anciens président; Président: M. DIEUDONNÉ; Secrétaire: M. LARUE; Trésorier honoraire: M. Alphonse MURY; Trésorier: M. DECORE; Bibliothécaire: Madame FONTAINE; Conservateurs: MM. BONNOT, POPIER; Membres: Madame BOUCHUT, MM. BOULAN, CARD, GAULT, GUILLAND, KOSTIUK, Alfred LEFÈVRE, Mlle PASCAL, M. VOGEL.

Ont été prévues trois grandes excursions: Le Mont Boussièvre; Le Tourvéon, Avenas et Beaujeu; Le Pic de Thignor, région de Thiers. D'autres excursions auront lieu dans les environs immédiats de Roanne.

PARTIE SCIENTIFIQUE

NOUVELLES FORMES DE BUPRESTIDES DE CORSE

par Léon SCHAEFER.

Durant mon dernier voyage en Corse, en juin dernier, j'ai capturé d'assez nombreux exemplaires d'*Acmæodera Prunneri* s. sp. 18-*punctata* Gory, parmi lesquels un certain nombre se rapportent à des formes nouvelles que je décris ci-après. Pour l'étude variétiste de l'espèce, je renvoie à mon travail sur les Buprestides de France, p. 57-62, où l'on trouvera en outre les explications nécessaires concernant les signalements abrégés. Dans ces nouvelles formes, parfois dissymétriques, les 10 taches élytrales élémentaires sont présentes (comme dans toutes les formes connues d'ailleurs), je ne les énumérerai donc pas dans les diagnoses et mentionnerai seulement leur réunion en fascies. Les provenances sont: Ajaccio, collines près de la plage du Scudo (Barbicaja), et golfe de Porto-Vecchio vers l'embouchure du Stabiaccio.

f. **degeneroides** nov.

a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Une tache dans les angles postérieurs du pronotum. — Porto-Vecchio, 1 ex.

f. **unicincta** nov.

f, a, 1, 2, 3, 4, 5+10, 6, 7, 8, 9.

Une tache frontale, une pronotale postérieure; les 5^e suturale et

latérale des élytres réunies en fascie. — Porto-Vecchio, 1 ex.

f. **immaculifrons** nov.

a, 1, 2, 3, 4+9, 5+10, 6, 7, 8.

Une tache pronotale postérieure ; 4^e tache suturale reliée à la 4^e latérale ; 5^e suturale reliée à la 5^e latérale. — Porto-Vecchio, 1 ex.

f. **biinterrupta** nov.

a, 1, 2, 3+8, 4, 5+10, 6, 7, 9.

Une tache pronotale postérieure ; 3^e tache suturale et 3^e tache latérale réunies, de même que les 5^e suturale et latérale. — Porto-Vecchio, 1 ex.

f. **bicineta** nov.

f, a+b, 1, 2+6, 3, 4, 5+10, 7, 8, 9.

Une tache frontale, une bordure pronotale ; 2^e tache suturale unie à la 2^e latérale, et la 5^e suturale à la 5^e latérale. — Ajaccio, 1 ex.

f. **Ajax** nov.

f, a+b, 1, 2+6, 3, 4+8, 5+10, 7, 9.

Une tache frontale, une bordure pronotale ; 2^e, 4^e et 5^e taches suturales unies respectivement aux 1^e, 3^e, 5^e latérales. — Ajaccio.

f. **dispar** nov.

f, a+b, 1, 2+6, 3+7, 4+8, 5+10, 9.

Une tache frontale et une bordure pronotale ; 2^e, 3^e, 4^e, 5^e taches suturales unies respectivement aux 1^e, 2^e, 3^e, 5^e latérales. — Ajaccio, 1 ex.

f. **Suzannæ** nov.

f, a, 1, 2, 3+8, 4+9, 5+10, 6, 7.

Une tache frontale, une pronotale postérieure ; 3^e, 4^e, 5^e taches suturales unies respectivement aux 3^e, 4^e, 5^e latérales. — Porto-Vecchio, 1 ex.

f. **stabiaccensis** nov.

f, a+b, 1, 2+6, 3+8, 4, 5+10, 7, 9.

Une tache frontale, une bordure pronotale ; 2^e, 3^e, 5^e taches suturales unies respectivement aux 1^e, 3^e, 5^e latérales. — Porto-Vecchio.

f. **insularis** nov.

f, a+b, 1, 2+6, 3, 8+4+9, 5+10, 7.

Une tache frontale, une bordure pronotale ; 2^e et 5^e taches suturales unies respectivement aux 1^e et 5^e latérales ; 4^e suturale unie d'une part à la 3^e latérale et d'autre part à la 4^e latérale. — Ajaccio, 1 ex.

f. **Ariadne** nov.

f, a+b, 1, 2+6, 3+8+4, 5+10, 7, 9.

Une tache frontale, une bordure pronotale ; 2^e, 3^e, 5^e taches suturales unies respectivement aux 1^e, 3^e, 5^e latérales, la 3^e latérale unie en outre à la 4^e suturale. — Ajaccio, 1 ex.

f. **Agnusi** nov.

f, a+b, 1+1, 2+6, 3+8, 4+9, 5+10, 9.

Une tache frontale, une bordure pronotale ; les 1^{es} taches suturales réunies derrière l'écusson ; 2^e, 3^e, 4^e, 5^e suturales unies respectivement aux 1^e, 3^e, 4^e, 5^e latérales. — Ajaccio, 1 ex. Dédiée à la mémoire du Colonel A. Agnus, en souvenir de ses deux voyages entomologiques en Corse.

f. **anomala** nov.

f, a+b, 1, 2+6, 3+7+8+3, 4+9, 5+10.

Une tache frontale, une bordure pronotale ; 2^e, 4^e, 5^e taches suturales unies respectivement aux 1^e, 4^e, 5^e latérales ; 3^e suturale unie à la 2^e latérale laquelle est unie à la 3^e latérale qui s'unit à son tour à la 3^e suturale. — Ajaccio, 1 ex.

***Anthaxia dimidiata* ab. *scudensis* nov.**

Forme cyanescente. Fond de l'avant-corps bleu. Zone scutellaire des élytres allant du vert bleu au bleu violacé, la partie postérieure dorée ou doré cuivreux, la zone de transition verdâtre. — Ajaccio, oliveraie anciennement en partie incendiée à proximité de la plage du Scudo, plusieurs ex. ♂, ♀.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 11 Octobre 1950

**Une aberration nouvelle du *PACHYTODES CERAMBYCIFORMIS* Schr.
(Col., Cerambycidae)**

par Léon SCHAEFER.

ab. *vesubiensis* nov. — Forme mélanique. La coloration noire domine sur les élytres, où la coloration testacée est réduite à une tache scutellaire, une infrahumérale, une étroite fascie médiane et une autre postérieure, ce qui rapproche l'insecte de certains spécimens de son congénère *erratica* Dalm. — Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie, vallée du Boréon, un ♂, 4-7-1948.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 11 Octobre 1950

CAMPODEIDES DE LA GROTTTE DE LA BALME

par B. CONDÉ.

La petite collection de Campodéidés étudiée ici comprend 23 exemplaires recueillis par M. R. GINET, pendant l'hiver 1949-1950 et le printemps 1950, en de nombreux points de la grotte de La Balme, commune de ce nom, canton de Crémieu (Isère)¹. Ce sont les premiers représentants du groupe cités de cette vaste cavité, de 1000 à 1200 m. de développement total, dont la faune terrestre n'avait pas encore fait l'objet de recherches méthodiques.

Trois espèces, réparties entre deux genres, ont été reconnues.

1. *Campodea* (*Campodea*) *Wallacei* Bagnall 1918 : 2 ♂ jeunes.

Cette forme endogée n'avait jamais été trouvée dans une grotte. Le contenu intestinal de ces individus, constitué en grande partie par des débris d'insectes (fragments de cuticule, poils, écailles, etc.) atteste un régime plus carnassier que celui des *C. Wallacei* vivant dans l'humus.

Décrite d'Angleterre, l'espèce a été signalée de Suède et de France où elle est fréquente de la Lorraine à la Méditerranée.

2. *Plusiocampa* cf. *humilis* Condé 1948 a : 1 ♀.

Cet unique exemplaire a été récolté à 200 m. de l'entrée, sur le fond humide et limoneux d'un grand gour en période de non activité, parmi des pierres (GINET, *in litt.*, 8-III-50).

Il s'écarte des types par les soies latérales de la marge postérieure des tergites thoraciques qui sont plus courtes et plus épaisses ; d'autre part, les antennes et les cerques, qui donnent de précieux renseignements taxonomiques, ont été brisés lors de la capture. Pour ces raisons,

1. Le village de La Balme, dans lequel s'ouvre la grotte, est situé sur le flanc O. de la partie N. du massif sud-jurassien dit de « l'île Crémieu », à 50 km. environ à l'E. de Lyon.