

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

## SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, etc.

Secrétaire général : M. J. FIASSON, 48, rue Tête-d'Or, Lyon 6<sup>e</sup>.Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon 6<sup>e</sup>.SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet, 6<sup>me</sup> (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises .....	400 francs
C. C. P. Lyon 101-98	Etranger .....	600 —

## PARTIE ADMINISTRATIVE

## ORDRES DU JOUR

## CONSEIL D'ADMINISTRATION : Mardi 11 Septembre, à 20 h. 15

Admission de :

Mme VALET, 342, rue Boileau, Lyon, parrains MM. Coquillat et Fiasson. — M. Pierre BEL, expert-comptable, 36, rue Thomassin, Lyon, parrains MM. Coquillat et Viret. — M. le Docteur François DE MOURGUES, 25, quai St-Vincent, Lyon, parrains MM. Dr Morel et Coquillat. — M. Michel TOMACHOT, 25, boulevard des Belges, Le Coteau (Loire), parrains MM. Dieudonné et Gault. — M. Jean ROBINER, Lycée de Garçons, Roanne (Loire), parrains MM. Decore et Larue. — M. Bernard MARCHAND, 6, rue St-Marc, Le Coteau (Loire), parrains MM. Popier et Larue. — Mme M.-L. CHAMBARLHAC, 42, quai Fulchiron, Lyon, parrains MM. Ponchon et Pouchet. — Mlle Geneviève BERNARD, 34, rue de l'Hôtel-de-Ville, Lyon, parrains Mlle S. Thovert et Mlle J. Croissant. — Mlle Xénia KOLENKINE, 48, rue Raulin, Lyon, parrains Mlle S. Thovert et Mlle J. Croissant. — *Réintégrations* : M. Albert CARIFFA, 42, rue Franklin, Lyon ; M. le Médecin-Commandant MARTIN-BARBAZ, Service de Santé à Agadir (Maroc).

Proposition de fixation de la cotisation 1952. — Bibliothèque.

Questions diverses.

## SECTION ENTOMOLOGIQUE : Mercredi 12 Septembre, à 20 h. 15

P. RÉAL : Trois espèces nouvelles de *Cnephasia* (Lép. *Tortricidae*) du Sud-Est de la France.J. BECHYNÉ : Nouveaux Eumolpides de Madagascar (Col. *Phytophaga*).

Présentation d'insectes. — Questions diverses.

## SECTION BOTANIQUE : Samedi 8 Septembre, à 17 heures

A. QUENEY : Florule du plateau de Montessuy.

H. ROSSAT : Sur les Nématophytes.

Présentation de plantes. — Questions diverses.

On aura intérêt à noter aussi séparément dans les diagnoses les trois rapports :  $\frac{L}{R}$ ,  $\frac{h}{R}$ ,  $\frac{d}{L}$ , en les faisant figurer à côté des mesures en valeurs absolues habituelles.

On peut étendre cette formule aux carpophores apodes en faisant une convention : en effet L devient nul et le rapport L/R devient nul aussi ; le rapport d/L prend une valeur indéterminée ; si on pose alors par définition ce rapport égal à zéro, la formule  $\Phi$  se réduit à :

$$\Phi = + 5 \frac{h}{R}$$

que l'on peut choisir comme représentant dans ce cas le port du champignon.

Présenté à la Section Mycologique en sa séance du 19 février 1951

## SUR QUELQUES NOCTUELLES DÉCRITES PAR GUENÉE (1852-1854)

par P. VIETTE.

Dans la même revue (*Bull. Soc. Linn. Lyon*, 19, n° 9, 1950, p. 201), nous avons donné la liste des espèces de Géométrides décrites par GUENÉE (1857), existant encore au Muséum National de Paris et fixé pour chacune d'elles un lectotype, si plusieurs exemplaires existent dans la description originale (cf. *Bull. Zoolog. Nomenclat.*, 4, 1950, p. 73). Dans le travail qui suit on trouvera la liste des Noctuelles décrites par GUENÉE [*Species génér. des Lépid.*, vol. 5, 6 et 7 (Noctuérites, vol. 1, 2 et 3), 1852 et vol. 8 (Deltoides et Pyralides), 1854] se trouvant encore au Muséum National. La plupart des spécimens vus par GUENÉE (pour la plupart plus que centenaires) étaient perdus dans la masse des collections des Noctuelles du Muséum sans aucune indication. Seule l'écriture de GUENÉE, se trouvant sur une petite étiquette sur chaque exemplaire, nous a permis de retrouver le type ou les exemplaires typiques. Ceux-ci appartiennent au Muséum comme l'indique GUENÉE par M. N., à la collection FEISTHAMEL (une partie de celle-ci ayant été achetée aux enchères publiques le 26 mai 1851) et à la collection GUÉRIN (très peu d'exemplaires de cette collection existent encore).

Nous avons, dans la mesure des renseignements retrouvés, précisé ceux donnés par GUENÉE (localité, nom du collecteur... ou du marchand et l'année de récolte... ou de l'entrée au Muséum).

Comme pour les Géométrides, pour chacune des espèces de Noctuelles citées ci-dessous, un lectotype (lorsqu'il existe plusieurs exemplaires dans la description originale) a été choisi ; de préférence un exemplaire ayant son abdomen, et si possible un ♂. Les holotypes ou lectotypes se trouvent au Muséum National de Paris.

### Volume 5

- 42 — *Prometopus inassueta* Gn. Nouvelle-Hollande. Lectotype ♂. (espèce type du genre).  
 55 — *Acronycta lepusculina* Gn. Sans origine (Amérique N. ?). Lectotype ♂.  
 77 — *Acronycta xylinoides* Gn. Géorgie. Lectotype ♀ (sans abd.) désigné par HAMPSON, vol. 8, p. 157.  
 91 — *Leucania claudicans* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Holotype ♀ (sans abd.).  
 104 — *Leucania extranea* Gn. Montévidéo (coll. Feisthame!). Lectotype ♀.  
 Var. B. Nouvelle-Hollande. Lectotype ♀.  
 116 — *Leucania insulicola* Gn. Ile Maurice (Desjardins, 1840). Lectotype ♀.  
 117 — *Leucania impuncta* Gn. Chili (Gay, 1843). Holotype ♀ (sans abd.).  
 132 — *Leucania torrentium* Gn. Madagascar. Lectotype ♂.

- 133 — *Leucania amens* Gn. Cap de Bonne-Espérance (Verreaux, 1837). Lectotype ♂.
- 136 — *Leucania phragmitidicola* Gn. New York. Lectotype ♂.
- 137 — *Leucania humidicola* Gn. Cayenne (coll. Feisthamel). Lectotype ♀.
- 139 — *Leucania tayaudi* Gn. Montévidéo (coll. Feisthamel). Lectotype ♀.
- 176 — *Nonagria senegalensis* Gn. Sénégal (coll. Feisthamel). Lectotype ♀.
- 206 — *Scolecocampa ligni* Gn. Amérique N., Santa Cruz. Lectotype ♂. (espèce type du genre).
- 210 — *Axylia putrefacta* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Lectotype ♂.
- 211 — *Axylia sicca* Gn. Bombay (Rousseau, 1841). Holotype ♀ (et non ♂).
- 212 — *Axylia tabida* Gn. Sénégal (coll. Feisthamel). Holotype ♀.
- 222 — *Xylophasia denterna* Gn. Montévidéo (coll. Feisthamel). Lectotype ♀.
- 238 — *Xylomiges sumia* Gn. Ile St-Thomas (Hornbeck, 1840). Holotype ♂.
- 244 — *Spodoptera abyssinia* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Lectotype ♂ et allotype.
- 250 — *Laphygma cycloides* Gn. Le Cap (Verreaux, 1836). Lectotype ♀.
- 251 — *Laphygma macra* Gn. Colombie (Parzudacki, 1840). Lectotype ♀.
- 262 — *Prodenia testaceoides* Gn. Ile Maurice (Desjardins, 1840). Lectotype ♂.
- 289 — *Crymodes gelida* Gn. Islande (Expédition de la « Recherche ») (Gaimard, 1837). Lectotype ♂.
- 297 — *Mamestra decolora* Gn. Colombie (Parzudacki, 1842). Lectotype ♂ (et non ♀).
- 317 — *Mamestra sepultrix* Gn. Nouv.-Hollande (coll. Feisthamel). Lectotype ♀.
- 318 — *Mamestra nigerrima* Gn. Nouvelle-Hollande. Lectotype ♀.
- 319 — *Dasygaster hollandiae* Gn. Tasmanie (Verreaux, 1844). Lectotype ♂.
- 321 — *Dasygaster epundoïdes* Gn. Tasmanie (Verreaux, 1844). Lectotype ♂.
- 334 — *Apamea inferior* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Holotype ♂.
- 335 — *Apamea saliaris* Gn. Tasmanie (Verreaux, 1844). Lectotype ♀.
- 336 — *Apamea spumigera* Gn. Tasmanie (Verreaux, 1844). Lectotype ♀.
- 342 — *Miana adactricula* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Holotype ♂ (et non ♀).
- 357 — *Amphia hepialoides* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Lectotype ♀.
- 363 — *Perigea circumta* Gn. Ile St-Thomas (Hornbeck, 1840). Holotype ♂.
- 367 — *Perigea apameoides* Gn. Ile St-Thomas (Hornbeck, 1840). Lectotype ♂. (*P. segetioides* Gn. M. S.).
- 372 — *Perigea abstemia* Gn. Mexique (Deyrolle, 1842). Lectotype ♀. (sans abd.).
- 391 — *Caradrina torpens* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Holotype ♀.
- 394 — *Caradrina ignava* Gn., Ile Maurice (Desjardins, 1840). Lectotype ♂.
- 407 — *Caradrina atriluna* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Lectotype ♂.
410. — *Agrotis porphyricollis* Gn. Australie. Lectotype ♂.
- 416 — *Agrotis radians* Gn. Australie. Lectotype ♂.
- 425 — *Agrotis spiculifera* Gn. Pays des Namaquois (Afrique S.-E.) (coll. Feisthamel). Lectotype ♂.
- 433 — *Agrotis spina* Gn. Australie. Lectotype ♂.
- 437 — *Agrotis capularis* Gn. Australie (Verreaux, 1847). Lectotype ♂. Le type de la variété A existe aussi au Muséum.
- 438 — *Agrotis atra* Gn. Australie. Lectotype ♀. Le type de toutes les formes citées existent également au Muséum.
- 439 — *Agrotis tibiata* Gn. Australie. Lectotype ♂.
- 456 — *Agrotis cinchonina* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Holotype ♀.
- 459 — *Agrotis pesronii* Gn. Détroit de Magellan (coll. Feisthamel). Holotype ♂.
- 467 — *Agrotis bilitura* Gn. Chili (Gay, 1843). Holotype ♂.
- 473 — *Agrotis gypaetina* Gn. Montévidéo (coll. Feisthamel). Lectotype ♂.
- 476 — *Agrotis hispidula* Gn. Chili (Gay, 1843). Holotype ♀.
- 498 — *Agrotis photophila* Gn. Algérie (coll. Feisthamel). Holotype ♀.
- 521 — *Agrotis separata* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Holotype ♂.
- 566 — *Noctua intermixta* Gn. Patrie ? (Australie). Holotype ♀.
- 574 — *Ceramica exusta* Gn. Amérique N. Lectotype ♂.
- 575 — *Ceramica maryx* Gn. Nouvelle-Hollande (Gory, 1835). Holotype ♀.
- 664 — *Mesogona madida* Gn. Mexique (Deyrolle, 1842). Holotype ♀.

Volume 6.

- 749 — *Charidea elegantissima* Gn. Le Cap (Verreaux, 1836). Lectotype ♂. (Espèce type du genre).

- 777 — *Hadena aplectoides* Gn. Nouvelle-Hollande (Gory, 1835). Holotype ♂.  
 800 — *Hadena expulsa* Gn. Nouvelle-Hollande. Holotype ♀.  
 802 — *Hadena lutra* Gn. Nouvelle-Hollande (Gory, 1835). Lectotype ♂.  
 831 — *Cloantha ramosula* Gn. Géorgie : Savannah. Lectotype ♂.  
 832 — *Cloantha composita* Gn. Tasmanie (Craunster, 1840). Lectotype ♀.  
 928 — *Heliothis assulta* Gn. Ile de la Société : Tahiti (Vesco, 1845). Lectotype ♂.  
 964 — *Heliodes tortriciformis* Gn. Australie (Verreaux, 1841). Lectotype ♂.  
 (appartient au genre *Hypertropha* Meyr.)  
 990 — *Acontia erastrioides* Gn. Env. de Philadelphie (Musée de Philadelphie, 1833). Lectotype ♂.  
 993 — *Acontia opalinoides* Gn. Côte de Coromandel (coll. Feisthamel). Lectotype ♂.  
 997 — *Acontia secta* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Holotype ♂.  
 1074 — *Palindia rectimargo* Gn. Montévidéo (coll. Feisthamel). Lectotype ♂ (sans abd.).  
 1076 — *Palindia juncida* Gn. Colombie. Lectotype ♂.  
 1079 — *Palindia superior* Gn. Patrie ? (Amérique S.). Lectotype ♀.  
 1091 — *Emarginea gammophora* Gn. Montévidéo (coll. Feisthamel). Lectotype ♂. (Espèce type du genre).  
 1107 — *Phlegetonia catephioides* Gn. Port Natal (Parzudacki, 1842). Lectotype ♂.  
 1108 — *Phlegetonia carbo* Gn. Australie (Verreaux). Holotype ♀.  
 1111 — *Penicillaria jocosatrix* Gn. Java Lectotype ♀.  
 1139 — *Plusia feisthamelii* Gn. Cayenne (coll. Feisthamel). Holotype ♂.  
 1175 — *Plusia nu* Gn. Montévidéo (coll. Feisthamel). Lectotype ♂.  
 1186 — *Plusia argentifera* Gn. Nouvelle-Hollande (coll. Feisthamel). Lectotype ♀.  
 1203 — *Oraesia emarginata* Gn. Côte de Coromandel (coll. Feisthamel). Lectotype ♀.  
 1211 — *Gonodonta teretimacula* Gn. Cayenne (coll. Feisthamel). Lectotype ♂.  
 1256 — *Cosmophila indica* Gn. Ile Maurice (coll. Guérin). Lectotype ♂.  
 1258 — *Cosmophila auragoides* Gn. Port Natal (Parzudacki, 1842). Lectotype ♂.  
 1260 — *Anomis fornax* Gn. Cayenne (coll. Feisthamel). Lectotype ♂.  
 1263 — *Anomis oedema* Gn. Cayenne (coll. Feisthamel). Lectotype ♂.  
 1264 — *Anomis impasta* Gn. Cayenne (coll. Feisthamel). Lectotype ♀.  
 1265 — *Anomis illita* Gn. Brésil. Lectotype ♀.  
 1269 — *Eriocera mitrula* Gn. Patrie ? Holotype ♀. (Espèce type du genre).  
 1272 — *Gonitis sabulifera* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Holotype ♀.  
 1276 — *Amphipyra sanguinipuncta* Gn. Australie (Verreaux, 1845). Holotype ♂.  
 1308 — *Pantydia sparsa* Gn. Patrie ? (Australie). Lectotype ♂.  
 1317 — *Diatenes gerula* Gn. Australie (Verreaux, 1846). Holotype ♂. (Espèce type du genre).  
 1318 — *Diatenes aglossoides* Gn. Nouvelle-Hollande. Lectotype ♂.

Volume 7.

- 1324 — *Alamis polioides* Gn. Chili (Gay, 1843). Lectotype ♀.  
 1327 — *Alamis ligilla* Gn. Java. Lectotype ♂ (sans abd.).  
 1329 — *Homoptera peruncta* Gn. Patrie ? (Amérique). Lectotype ♀.  
 1330 — *Homoptera fictilis* Gn. Patrie ? (Amérique). Lectotype ♀.  
 1331 — *Homoptera guadulpensis* Gn. Ile de la Guadeloupe. Lectotype ♂.  
 1333 — *Homoptera strigimacula* Gn. Pernambuco. Lectotype ♂.  
 1336 — *Homoptera viridans* Gn. Brésil. Holotype ♀.  
 1337 — *Homoptera exhausta* Gn. Brésil. Lectotype ♂ (sans abd.).  
 1355 — *Praxis porphyretica* Gn. Tasmanie (Verreaux). Lectotype ♂.  
 1356 — *Praxis edwardsii* Gn. Australie (Verreaux). Holotype ♂. (Espèce type du genre).  
 1374 — *Catephia syba* Gn. Ile Maurice (Desjardins, 1840) et non Abyssinie. Holotype ♀. *Nagia megaruna* Joan. 1932 est synonyme de *syba* Gn.  
 1388 — *Lophoptera squammigera* Gn. Australie. Holotype ♂. (Espèce type du genre).  
 1394 — *Bolina acontoides* Gn. Patrie ? (Amérique). Holotype ♂.  
 1395 — *Bolina cinis* Gn. Mexique (Giesbreght, 1842). Lectotype ♀.  
 1400 — *Bolina ochrodes* Gn. Patrie ? (Amérique). Lectotype ♂.  
 1401 — *Bolina contorta* Gn. Ile St-Thomas (Hornbeck, 1840). Lectotype ♂.  
 1404 — *Bolina perpendicularis* Gn. Colombie. Lectotype ♂ (et allotype).

- 1407 — *Bolina marmoraris* Gn. Brésil. Lectotype ♂.  
 1493 — *Miniodes tricolor* Gn. Guinée. Lectotype ♂. (Espèce type du genre).  
 1502 — *Oxyodes tricolor* Gn. Australie (Verreaux, 1846). Holotype ♂.  
 1536 — *Letis nycteis* Gn. Patrie ? (Amérique). Lectotype ♀.  
 1537 — *Letis fusa* Gn. Ile St-Thomas (Hornbeck, 1840). Holotype ♀.  
 1541 — *Letis xylia* Gn. Mexique. Lectotype ♂.  
 1554 — *Anisoneura zeuzeroides* Gn. Patrie ? (région néo-guinéenne). Lectotype ♂. La citation d'HAMPSON (vol. 13) est fautive.  
 1563 — *Sericia spectans* Gn. Tasmanie (Verreaux). Lectotype ♂.  
 1566 — *Dasypodia selenophora* Gn. Tasmanie (Verreaux). Lectotype ♂. (Espèce type du genre).  
 1567 — *Dasypodia cymatodes* Gn. Tasmanie (Verreaux). Lectotype ♀.  
 1580 — *Cyligramma acutior* Gn. Patrie ? (Afrique). Holotype ♂.  
 1589 — *Calliodes orbiger* Gn. Nouvelle-Bretagne (Gory, 1835). Lectotype ♂.  
 1606 — *Entomogramma pardus* Gn. Port Natal (Parzudacki, 1842). Lectotype ♂.  
 1644 — *Ophyx ochroptera* Gn. Australie (Verreaux, 1846). Holotype ♀. (Espèce type du genre).  
 1645 — *Ophyx bipartita* Gn. Australie (Verreaux, 1846). Holotype ♂ (sans abd.).  
 1656 — *Ophisma praestans* Gn. Madagascar. Holotype ♂.  
 1667 — *Achaea catella* Gn. Sénégal. Lectotype ♂.  
 1703 — *Ophiusa torrida* Gn. Ile Maurice (Desjardins, 1837). Lectotype ♂.  
 1704 — *Ophiusa chiliensis* Gn. Chili (Gay, 1843). Holotype ♀.  
 1714 — *Fodina pallula* Gn. Indes. Lectotype ♀.  
 1715 — *Fodina stola* Gn. Indes. Lectotype ♂.  
 1723 — *Trigonodes maxima* Gn. Patrie ? Holotype ♀.  
 1725 — *Trigonodes lucasii* Gn. Patrie ? Holotype ♀.  
 1730 — *Trigonodes exportata* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Lectotype ♂.  
 1748 — *Poaphila deleta* Gn. Géorgie : Savannah. Lectotype ♂.  
 1751 — *Poaphila erasa* Gn. Géorgie : Savannah. Lectotype ♂.  
 1755 — *Poaphila perplexa* Gn. Géorgie : Savannah. Lectotype ♀.  
 1763 — *Phurys garnoti* Gn. Martinique. Lectotype ♂.  
 1776 — *Remigia megas* Gn. Ile St-Thomas (Hornbeck, 1840). Lectotype ♂.  
 1777 — *Remigia marcida* Gn. Géorgie : Savannah. Holotype ♂.  
 1790 — *Panopoda carneicosta* Gn. U. S. A. Holotype ♂ (sans abd.).  
 1795 — *Zethes hesperioides* Gn. Australie : Port Jackson (Sydney). Lectotype ♀ (sans abd.).  
 1800 — *Focilla guerini* Gn. Campèche. Lectotype ♂.  
 1802 — *Lacera capella* Gn. Patrie ? (région australienne). Lectotype ♂. (Espèce type du genre).  
 1838 — *Selenis sueroides* Gn. Martinique (coll. Feisthamel). Lectotype ♀.  
 1843 — *Thyriodes flabellum* Gn. Mexique (Giesbreght, 1842). Lectotype ♂. (Espèce type du genre).  
 1851 — *Gracilodes nysa* Gn. Patrie ? Lectotype ♂. (Espèce type du genre).  
 1853 — *Marmorinia epionoides* Gn. Géorgie : Savannah. Holotype ♀.  
 1868 — *Capnodes linula* Gn. Patrie ? Holotype ♀.  
 1115 bis — *Eurhipia favellatrix* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Holotype ♂.

Volume 8 (Deltoides seulement).

- 14 — *Ceraptilia reniferalis* Gn. Cap de Bonne Espérance (Verreaux, 1837). Lectotype ♂. (Espèce type du genre).  
 15 — *Sarmatia interitalis* Gn. Cap de Bonne Espérance (Verreaux, 1835). Lectotype ♂. (Espèce type du genre).  
 16 — *Hypena derasalis* Gn. Cap de Bonne Espérance (Verreaux, 1837). Holotype ♂ (sans abdomen).  
 43 — *Hypena abyssinialis* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Lectotype ♂.  
 58 — *Simplicia inarcualis* Gn. Abyssinie (Schimper, 1850). Lectotype ♂.  
 78 — *Nodaria externalis* Gn. Côte de Coromandel. Holotype ♂.  
 82 — *Hydrillodes uliginosalis* Gn. Cap de Bonne Espérance (Verreaux, 1835). Lectotype ♂ (et allotype ♀).  
 96 — *Helia phaealis* Gn. Nouvelle Grenade (Musée de Philadelphie, 1833). Lectotype ♂.  
 97 — *Helia carbonalis* Gn. Tasmanie (Verreaux, 1844). Lectotype ♀.

(Laboratoire d'Entomologie du Muséum National, Paris).

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 9 Mai 1951