

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

SECONDE SÉRIE

I

1883



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, rue de la République, 65.

1883

NOUVELLES ET RENSEIGNEMENTS

NÉCROLOGIE. — La Société vient de perdre un de ses membres les plus éminents, M. Antoine CARIOT, curé de Sainte-Foy-lès-Lyon; nous publierons prochainement une notice biographique sur l'auteur de *l'Étude des fleurs*, véritable *Flore de la région lyonnaise*, parvenue à sa sixième édition et qui a été le premier guide de toute la génération actuelle des botanistes lyonnais.

M. l'abbé Cariot est décédé à Sainte-Foy le 22 février dernier, à l'âge de 63 ans; ses funérailles ont eu lieu le samedi 24 février suivant, à 9 heures 3/4. A. M.

ÉTAT DE LA VÉGÉTATION (23 février 1883).

La Scille (*Scilla bifolia*) est en ce moment en pleine floraison dans le vallon de la Cadette, dans les vallons d'Écully, Francheville, Beaunant, etc.

La Corydale (*Corydalis solida*) commence seulement à dérouler sa grappe de fleurs, panachée aujourd'hui de vert et de violet, mais qui dans quelques jours sera du plus beau rose (vallon du Vernay, de Tassin, de Francheville, du Pigeonnier, sous Sainte-Foy, etc.)

C'est aussi le moment d'aller récolter le *Cornus mas* en fleurs, dans les bois de la Pape, de Sathonay, et du Mont-d'Or.

Le botaniste récoltera en même temps toute la phalange des *Pulmonaria tuberosa*, *Primula grandiflora*, *Pr. variabilis*, des Erophiles, etc. A propos du *Pr. grandiflora*, on se souvient qu'à une des séances de la Société botanique, nous avons appelé l'attention sur la dispersion géographique de cette espèce, indiquée comme commune dans tout le Lyonnais (Voy. Cariot, *Étude des fleurs*, p...); elle n'y est en réalité fréquente que dans les environs de Lyon, dans les coteaux du Dauphiné, du Bugey, etc.; dans le Haut-Beaujolais et le Jura, elle est remplacée par le *Pr. elatior*. M. Fray a montré en outre que la limite septentrionale du

Pr. grandiflora, dans les Dombes, suivait une ligne s'étendant de Mogneneins, sur la Saône, à Pont-d'Ain; au nord de cette ligne on ne trouve plus que le *Pr. elatior* (Voy. séances des 28 mars et 25 avril 1882).

Nous engageons vivement nos confrères à profiter de la floraison de ces espèces, pour étudier leurs limites respectives : 1° dans les montagnes du Beaujolais (elle doit passer entre Villefranche et Belleville), et plus à l'ouest, jusque dans le Forez; 2° dans le Bugey septentrional.

Jardin botanique. — On peut étudier actuellement fleuris : *Eranthis hyemalis*, *Helleborus foetidus*, *niger*, *purpurascens* (depuis le mois de janvier); *Hepatica triloba*, *Mahonia Bealii*, *Cornus mas*, *Jasminum nudiflorum*, etc., dans l'École générale; les *Akebia quinata*, *Forsythia viridissima* et *suspensa*, commencent à ouvrir leurs boutons; — *Phajus grandiflorus*, *Monstera Adansonii*, *Amphiscopia Pohliana*, plusieurs espèces de *Begonia* et particulièrement *B. Verschaffelti*, *Bryophyllum calycinum*, un grand nombre de *Mimosa*, des *Echeveria*, *Eriostemon*, *Chorizema*, etc., dans les serres.

Serre des Orchidées. — En outre de nombreux *Crocus*, des Tulipes, signalons les *Cattleya bogotensis*, *C. Wagneri*, *Phalenopsis Schilleriana*, *Ph. amabilis*, *Dendrobium Paxtoni*, *Cypripedium Dayanum*, *Angræcum eburneum*, *Leptotes bicolor*, etc., parmi les Orchidées; — le *Vriesea Lindenii*, l'*Aristolochia Duchartrei*, les *Sonerila Andersonii* var. *metallica* et *argentea* (2° floraison), et surtout l'*Ataccia cristata*, curieux représentant de la rare famille des Taccacées.

A. M.