

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

1873

Année 1873

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME VINGTIÈME

LYON

H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

65, RUE DE LYON

MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS

19, RUE HAUTEFEUILLE

1874

DESCRIPTION
D'UNE ESPÈCE NOUVELLE
DE LA FAMILLE DES CURCULIONITES

PAR

MM. MULSANT ET GODART

Présentée à la Société Linnéenne de Lyon le 13 janvier 1873.

Gymnaetron mixtum

Oblongum, brunneum, pilis depressis pallidis fulvisque et setis albidis erectis variegatum. elytris, antennis, ventre pedibusque ferrugineis. Rostrum apice attenuatum. Prothorax transversum, subconvexum, albido trilineato-pilosum. Elytra dorso subdepressa, apice obtuse rotundata, pygidio conspicuo.

Long., 0,0033 (1 1/2 l.); — larg., 0,0017 3/4 l.)

Corps oblong, brunâtre, peu convexe, revêtu d'une pubescence grossière, serrée, déprimée, entremêlée de poils pâles et d'un fauve plus ou moins obscur et de longues soies redressées et blanchâtres.

Tête à peine plus large que le quart de la base du prothorax, noire, rugueusement ponctuée sur le front et sur le rostre, qui sont hérissés de longs poils d'un fauve obscur et un peu inclinés en arrière, avec les poils de l'extrémité du rostre plus pâles et inclinés en avant. *Vertex* dénudé et simplement chagriné. *Front* déprimé. *Rostre* atténué en cône, à sommet d'un roux de poix.

Yeux subovalaires, noirs.

Antennes courtes, dépassant un peu le bord antérieur du prothorax

quand elles sont renversées en arrière, légèrement pilosellées ; d'un ferrugineux assez clair. *Scapæ* peu allongé, renflé en massue à son sommet. *Funicule* à premier article oblong, assez épais, sensiblement renflé : le deuxième oblong, obconique, beaucoup plus grêle : les trois suivants graduellement plus courts et un peu plus épais. *Massue* assez brusque, très-finement duveteuse, en ovale subacuminé.

Prothorax transverse, beaucoup plus étroit en avant, échancré au sommet, un peu moins large en arrière que les élytres, sensiblement arqué sur les côtés, largement arrondi à sa base ; assez convexe sur son disque ; rugueusement ponctué ; brunâtre, mais revêtu d'une pubescence serrée, déprimée, dirigée en arrière, d'un fauve obscur sur les parties latérales du disque, blanches et formant une ligne longitudinale étroite sur le milieu, de même couleur, mais formant une ceinture large sur les côtés ; paré en outre de longues soies plus ou moins redressées, d'un fauve obscur sur le dos, plus longues et blanchâtres sur les parties latérales.

Écusson revêtu de poils couchés et blanchâtres, voilé à sa base par des poils de même couleur, entre-croisés et émanant du milieu du bord postérieur du prothorax.

Élytres environ trois fois plus longues que le prothorax, à peine arquées sur leurs côtés, obtusément arrondies à leur sommet, qui laisse le pygidium à découvert ; faiblement convexes, mais longitudinalement et simultanément subdéprimées sur le dos vers la suture, au moins sur leurs deux premiers tiers ; assez fortement striées-ponctuées, avec les intervalles distinctement et éparsement ponctués ; d'un roux ferrugineux, avec un trait obscur sur le premier tiers de la suture, et une ligne longitudinale, un peu oblique, obscure, située vers le milieu de chaque étui, confuse, plus apparente en arrière ; revêtues d'une pubescence grossière, assez serrée, déprimée, d'un fauve obscur sur les intervalles des stries, blanchâtres dans le fond de celles-ci, où elles forment comme des lignes pâles, entremêlées en outre de soies semi-redressées, dirigées en arrière, arquées et d'un fauve obscur, et d'autres soies beaucoup plus longues, blanchâtres, tout à fait redressées, principalement reléguées sur les côtés. *Épaulés* largement arrondies, couvertes d'une pubescence blanchâtre, faisant suite à la ceinture latérale du prothorax.

Dessous du corps peu convexe, hérissé d'une longue pubescence pâle ;

rugueusement ponctué ; d'un noir de poix un peu brillant, avec le ventre ferrugineux.

Pieds robustes, rugueux, ferrugineux, hérissés de soies blanches, celles des cuisses couchées, celles de la tranche externe des tibias plus longues et redressées. *Cuisses* inermes. *Ongles* obscurs, ainsi que l'extrême sommet des tibias, surtout intermédiaires et postérieurs.

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs de Narbonne.

Obs. Cette curieuse et intéressante espèce est remarquable par sa pubescence et ses soies en partie blanchâtres, en partie d'un fauve obscur. Elle rentre dans la division des espèces à cuisses inermes et à rostre conique, mais elle est d'une forme plus allongée qu'aucune de celles qui en font partie.