

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937  
 des SOCIETES BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
 REUNIES  
 et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

**Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)**

Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6<sup>e</sup>)

<b>ABONNEMENT ANNUEL</b>	} France et Colonies Françaises .....	<b>600 francs</b>
C. C. P. Lyon 101-98		} Etranger: . . . . .

(= *Thamnolia*) comme un « fossile vivant » dont les descendances sont perdues (*Cladonia*?, *Usneaceae*?, *Roccella*?).

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 8 octobre 1955.

## TABANIDAE (Dipt.) DE FRANCE. — III<sup>1</sup>

par Marcel LECLERCQ.<sup>2</sup>

Cette contribution est basée sur l'étude de récoltes personnelles dans plusieurs départements : Haute-Marne, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Basses-Alpes (Annot, 720 m ; Col d'Allos, 2250 m), Hautes-Alpes (col du Lautaret, 2058 m) et Ain.

A Gorbio (327 m), près de Menton, nous avons récolté des exemplaires de neuf espèces différentes piquant un âne tenu en laisse : *Tabanus apricus* Meigen, *Tabanus glaucopsis* Meigen, *Tabanus miki* Brauer, *Tabanus rectus* Loew, *Tabanus sudeticus* Zeller, *Theriopectes bifarius* Loew, *Theriopectes nemoralis* Meigen, *Atylotus fulvus* Meigen et *Haematopota italica* Meigen.

Leurs piqûres étaient tellement fréquentes que des gouttes de sang perlaient sur le pis, les mamelles, et sous la panse de l'animal. Vers la soirée, les herbes où il pouvait brouter, étaient même souillées de sang !

Un grand nombre d'exemplaires ont été capturés en utilisant une voiture automobile comme piège, plus de 70 *Tabanus apricus* Meigen ont été ainsi récoltés dans les Alpes en une demi-heure.

Nous avons capturé une espèce nouvelle pour la faune française : *Tabanus miki* Brauer, et d'autres espèces intéressantes : *Silvius vituli* Fabricius, *Theriopectes bifarius* Loew, *Theriopectes expollicatus* Pandellé, *Theriopectes nemoralis* Meigen, *Hybomitra rupium* Brauer.

### I. Sous-famille PANGONIINAE.

1. *Silvius vituli* Fabricius. — Ain : Gex, ♀, 29-VII-1955.

### II. Sous-famille CHRYSOPINAE.

2. *Chrysops caecutiens* Linné. — Haute-Marne : Langres, ♂, 17-VII-1955.

### III. Sous-famille TABANINAE.

3. *Tabanus apricus* Meigen. — Alpes-Maritimes : Gorbio, ♀, 24-VII-1955 sur un âne ; Basses-Alpes : Annot, ♀, et col d'Allos, 24 ♀, 27-VII-1955 ; Hautes-Alpes : col du Lautaret, 49 ♀, 28-VII-1955 ; Haute-Marne : Langres, ♀, 17-VII-1955.

4. *Tabanus autumnalis* Linné. — Bouches-du-Rhône : Le Tholonet, ♀, 19-VII-1955, Villeneuve, 8 ♀, et Le Sambuc, 4 ♀, 20-VII-1955.

5. *Tabanus bovinus* Linné. — Bouches-du-Rhône : Villeneuve, ♀, 20-VII-1955.

6. *Tabanus bromius* Linné. — Haute-Marne : Prauthoy, ♀, 17-VII-

1. Pour la première note, voyez : *Bull. Ann. Soc. entom. Belg.*, 1955, XCI, 76-83. Pour la deuxième note, voyez : *Bull. mens. Soc. Linnéenne Lyon*, 1955, 24, 5-6.

2. Lauréat du Concours des Bourses de Voyage du Gouvernement Belge.

1955 ; Vaucluse : Bonpas, 8 ♀, 18-VII-1955 ; Bouches-du-Rhône ; Le Sambuc, 11 ♀, Villeneuve, 20 ♀, Etang de Vaccarès, 2 ♀, 20-VII-1955, Le Tholonet, 11 ♀, 19-VII-1955 ; Basses-Alpes : Col d'Allos, 6 ♀, 27-VII-1955 ; Hautes-Alpes : col du Lautaret, 8 ♀, 28-VII-1955.

7. *Tabanus cordiger* Meigen. — Vaucluse : Bonpas, ♀, 18-VII-1955 ; Bouches-du-Rhône : Villeneuve, 3 ♀, et Le Sambuc, ♀, 20-VII-1955.

8. *Tabanus glaucopis* Meigen. — Alpes-Maritimes : Gorbio, 2 ♀, 24-VII-1955 sur un âne ; Basses-Alpes : col d'Allos, ♀, 27-VII-1955.

9. *Tabanus miki* Brauer. — Espèce nouvelle pour la faune française. Alpes-Maritimes : Gorbio, ♀, 24-VII-1955 sur un âne. Elle est connue de Russie, Europe centrale et septentrionale, Angleterre, Suède méridionale, Bulgarie et Belgique (M. LECLERCQ, 1952).

10. *Tabanus rectus* Loew. — Alpes-Maritimes : Gorbio, ♀, 24-VII-1955 sur un âne ; Bouches-du-Rhône : Villeneuve, 3 ♀, Le Sambuc, 2 ♀, 20-VII-1955.

11. *Tabanus regularis* Jaenicke. — Vaucluse : Bonpas, 6 ♀, 18-VII-1955. Cette espèce est connue d'Europe méridionale, Afrique du Nord, Asie Mineure, Perse, Belutchistan, Mésopotamie et Palestine (O. KRÖBER, 1925).

12. *Tabanus sudeticus* Zeller. — Alpes-Maritimes : Gorbio, ♀, 24-VII-1955 sur un âne ; Bouches-du-Rhône : Le Tholonet, ♀, 19-VII-1955.

13. *Therioplectes bifarius* Loew. — Alpes-Maritimes : Gorbio, 4 ♀, 24-VII-1955, sur un âne. Cette espèce est connue d'Europe centrale et méridionale (O. KRÖBER, 1925).

14. *Therioplectes expollicatus* Pandellé. — Bouches-du-Rhône : Villeneuve, ♀, 20-VII-1955. Cette espèce rare paraît localisée dans le midi de la France (M. LECLERCQ, 1955 et H. HARANT et M. LECLERCQ, 1955) ; elle est aussi connue de Belgique (M. LECLERCQ, 1952).

15. *Therioplectes nemoralis* Meigen. — Alpes-Maritimes : Gorbio, 5 ♀, 24-VII-1955, sur un âne ; Bouches-du-Rhône : ♀, Le Tholonet, 19-VII-1955.

16. *Therioplectes quatuornotatus* Meigen. — Basses-Alpes : col d'Allos, 2 ♀, 27-VII-1955.

17. *Hybomitra aterrima* Meigen. — Basses-Alpes : col d'Allos, ♀, 27-VII-1955 ; Hautes-Alpes : col du Lautaret, ♀, 28-VII-1955.

18. *Hybomitra aterrima* var. *auripila* Meigen. — Basses-Alpes : col d'Allos, 3 ♀, 27-VII-1955.

19. *Hybomitra aterrima* var. *lugubris* Zetterstedt. — Basses-Alpes : col d'Allos, 4 ♀, 27-VII-1955.

20. *Hybomitra montana* Meigen. — Basses-Alpes : col d'Allos, 5 ♀, 27-VII-1955 ; Hautes-Alpes : col du Lautaret, ♀, 28-VII-1955.

21. *Hybomitra rupium* Brauer. — Basses-Alpes : col d'Allos, ♀, 27-VII-1955. Cette espèce rare est connue de France : Hautes-Pyrénées (E. SÉGUY, 1926) ; d'Italie septentrionale (G.-M. GHIDINI, 1937) ; de Suisse (G. BOUVIER, 1945) et d'Europe centrale (O. KRÖBER, 1925).

22. *Hybomitra tropica* Panzer. — Bouches-du-Rhône : Le Sambuc, ♀, 20-VII-1955.

23. *Atylotus fulvus* Meigen. — Alpes-Maritimes : Gorbio, ♀, 24-VII-1955, sur un âne, Menton, ♀, 26-VII-1955.

24. *Atylotus rusticus* Linné. — Haute-Marne : Prauthoy, ♀, 17-VII-1955, sur une vache ; Bouches-du-Rhône : Villeneuve, ♀, 20-VII-1955.

IV. Sous-famille HAEMATOPOTINAE.

25. *Haematopota italica* Meigen. — Alpes-Maritimes : Gorbio, 2 ♀, 24-VII-1955, sur un âne ; Basses-Alpes : Annot, ♀, 27-VII-1955.

26. *Haematopota pluvialis* Linné. — Bouches-du-Rhône : Le Sambuc, ♀, 20-VII-1955 ; Basses-Alpes : col d'Allos, 5 ♀, 27-VII-1955.

BIBLIOGRAPHIE

BOUVIER, G., 1945. — Les Tabanidae de la Suisse. (*Bull. Soc. entom. Suisse*, XIX, 409-446).

GHIDINI, G., 1937. — Tavole per la determinazione dei Tabanidi d'Italia. (*Mém. Soc. entom. Italiana*, XV, 129-175).

HARANT, H. et LECLERCQ, M., 1955. — Tabanidae (Dipt.) de France. II. Récoltes du Département de l'Hérault. (*Bull. mens. Soc. Linnéenne Lyon*, 24, 5-6).

KRÖBER, O., 1925. — Tabanidae in Lindner « Die Fliegen der palaearktischen Region », 19, 146 p.

LECLERCQ, M., 1952. — Introduction à l'étude des Tabanides et révision des espèces de Belgique. (*Mém. Inst. roy. Sc. nat. Belg.*, n° 123, 80 pp.).

— 1955. — Tabanidae (Dipt.) de France. I. (*Bull. Ann. Soc. entom. Belg.*, XCI, 76-83).

SÉGUY, E., 1926. — Faune de France, XIII. (Paris, Lechevalier édit., 119-157).  
Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 8 octobre 1955.

**HYMENOPTERES SPHECIDES DE L'HERAULT**

par Hervé HARANT et Jean LECLERCQ.

Un certain nombre d'Hyménoptères Sphécides ont été récoltés au cours des explorations hebdomadaires organisées depuis plusieurs années par le Laboratoire de Parasitologie et Histoire Naturelle de la Faculté de Médecine de Montpellier. Une collection complémentaire a été faite par l'un de nous à l'occasion d'un séjour au même laboratoire. Il nous a paru intéressant de publier la liste de ces insectes déterminés et classés pour une part dans les collections du laboratoire précité, pour le reste dans celles de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.

1. *Sphex (Sphex) maxillosus* F. — Bionne, ♂, 19-VII-42 ; Palavas-les-Flots, ♀, 29-VII-42.

2. *Sphex (Sphex) flavipennis* F. — Sète (Corniche), ♀, 27-VII-42 ; Les Baux, ♀, 17-VII-49.

3. *Sphex (Priononyx) subfuscatus* Dahlbom. — Fontcaude, 2 ♂♂ 21-VII-41 ; Paillade, ♀, VIII-49 ; Bionne, ♂, 22-VII-51.

4. *Spex (Palmodes) occitanicus* Lepeltier de Saint-Fargeau et Serville. — Palavas-les-Flots, ♀, 9-VII-37, ♀, 6-VII-41, ♂, 9-VII-42 ; Carnon, ♀, 19-IX-48 ; Castries, ♂, 8-VII-54.

5. *Sphex (Palmodes) strigulosus* Costa. — Montblanc, domaine de Montmarin, ♀, VI, VII-40 (J.-M. DE WIRTE).

6. *Sphex (Priononyx) lividocinctus* Costa. — Maguelonne, ♀, 24-IX-42.

7. *Sphex (Isodontia) splendidus* Costa. — Pont Juvénal, ♀, 16-VI-42.

8. *Sphex (Isodontia) paludosus* Rossi. — Avèze, ♀, 25-IV-40.

9. *Podalonia hirsuta* Scopoli. — Terral, 10-IV-41 ; Lattes, 24-IV-40 ; Counelle, 21-V-44 ; Celleneuve, ♀, 23-IV-44.

10. *Podalonia tydei* Le Guillou. — Maguelonne, ♀, 24-IX-42 ; Palavas-les-Flots, 9-VII-54.

11. *Ammophila apicalis* Brullé. — Palavas-les-Flots, 29-VII-42.