

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937  
 des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
 REUNIES  
 et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

**Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)**

Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6<sup>e</sup>)

<b>ABONNEMENT ANNUEL</b>	France et Colonies Françaises .....	<b>500 francs</b>
C. C. P. Lyon 101-98	Etranger: .....	<b>600 —</b>

## PARTIE ADMINISTRATIVE

**Compte de Profits et Pertes**

RECETTES		DEPENSES	
Cotisations 1954 .....	425.850	Bulletin (288 pages) .....	496.215
Cotisations arriérées .....	3.800	Frais généraux .....	27.227
Cotisation membre à vie .....	12.000	Frais de recouvrement .....	9.261
Dons .....	59.850	Taxe sur publicité .....	15.354
Publicité .....	29.500	Deux lampes épidiastope ....	4.550
Revenus .....	15.477	Dotation .....	13.548
Exposition mycologique .....	20.210	Provision immeuble .....	90.000
Immeubles .....	101.085	Provision publication .....	170.000
Bibliothèque .....	6.991	Excédent 1954 .....	27.809
Divers .....	10.580		
Remboursement de taxes ....	168.621		
	<hr/>		<hr/>
	853.964		853.964
	<hr/>		<hr/>

Le Trésorier : A. PONCHON.

Certifié conforme,  
Le Censeur : G. DEROZIER.

**GROUPE DE ROANNE**

*Séance du 12 Septembre.* — Présentation de plantes en provenance de la Pierre du Charbonnier (1100 m). La présence de notre collègue, M. BONNOT, a donné un intérêt tout particulier à cette présentation. M. DIEUDONNÉ en a profité pour lui adresser, au nom des membres du groupe, des félicitations pour son beau succès à l'agrégation des sciences naturelles.

M. BORRON présente six œufs de Poule d'eau et donne des explications sur la ponte d'un certain nombre d'oiseaux de la région roannaise.

M. DIEUDONNÉ fait observer une collection de dents pharyngiennes de poissons d'eau douce.

En souvenir de son mari, Mme CARD a fait don de mille francs à notre groupe ; nos vifs remerciements.

**PARTIE SCIENTIFIQUE**

**DESCRIPTION DE DEUX GENRES NOUVEAUX (Lep. Phal.)**

(CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DES « AGROTIDAE » - TRIFINAE, LXXII) <sup>1</sup>  
(Note préliminaire).

par Charles BOURSIN.

**Ammopolia** n. gen.

Générotipe : « *Orthosia* » *witzenmanni* Stdf.  
(Mitt., VIII, p. 233, 1890).

Se différencie essentiellement des genres *Agrochola* Hb. et *Spudaea* Snell. (*Cuculliinae*) par la présence d'épines en nombre irrégulier aux tibias postérieurs et par la constitution de l'armure génitale, dont les valves, en forme de coquilles bombées et coudées, larges et arrondies à l'extrémité, et portant une encoche distale, sont d'un type très différent. L'uncus et le pénis présentent de leur côté des caractères qui les rap-

1. Voir LXXVI, in « Zeitschr. d. Wien. ent. Ges. », 1955.

prochent de ceux que l'on rencontre chez plusieurs espèces d'*Antitype* Hb. Ce nouveau genre, jusqu'à présent monotypique, appartient, d'après l'ensemble de ces caractères, à la sous-famille des *Cuculliinae* et non à celle des *Phalaeninae* (*Agrotinae*) et cela malgré la présence d'épines aux tibias, la constitution générale de l'espèce-type ne présentant en effet aucun rapport, même lointain, avec les différents genres de la sous-famille des *Agrotinae*. Il se rapproche en réalité du complexe *Antitype-Ammoconia-Eumichtis-Bryopolia* et doit se placer dans la classification après le genre *Ammoconia* Led. Il présente en commun avec ce dernier le caractère des épines aux tibias postérieurs, mais le type de l'armure génitale est très différent.

**Bryonycta** n. gen.

Générotype : « *Bryophila* » *pineti* Stgr.  
(Stett. ent. Z., p. 212, 1859).

Se distingue essentiellement du genre *Cryphia* Hb. par le type de l'armure génitale qui se rapproche, bien qu'avec certaines différences, de celui des *Apatele* Hb. (*Acronycta* Tr.) sensu lato, notamment par la forme des valves et la constitution du pénis et s'éloigne ainsi nettement de celui des *Cryphia* Hb. La chenille, en outre, présente des caractères particuliers qui la séparent à la fois des *Cryphia* Hb. et des *Acronycta* Tr. sensu lato. Je dois ces renseignements à l'amabilité du D<sup>r</sup> H. CLEU qui l'a élevée et décrite<sup>2</sup>. Celle-ci est glabre et le D<sup>r</sup> CLEU ne l'a jamais trouvée sur les lichens des troncs ou des branches de pin, sur lesquels il considère comme improbable qu'elle vive, mais seulement vers l'extrémité des branches, aux points proches des bourgeons, où les aiguilles sont particulièrement tendres. Ceci laisserait donc en effet supposer qu'elle ne vit par sur les lichens. Du reste, l'indication figurant dans la littérature, que la chenille de *pineti* Stgr. se nourrirait des lichens du pin, ne repose que sur une pure supposition, le premier exemplaire de l'espèce (imago) ayant été trouvé par STAUDINGER sur un tronc de pin en Espagne. En outre, et contrairement aux *Cryphia* Hb., dont la vie larvaire s'écoule en mai-juin, la chenille de *pineti* Stgr., comme celles des *Acronycta*, vit à la fin de l'été et ne se chrysalide qu'à la fin de septembre ou au début d'octobre. Tous ces caractères rapprochent nettement *pineti* Stgr. des *Acronycta* sensu lato, dont elle présente par ailleurs, le type de dessin, et l'éloignent des *Cryphia* Hb.

Le nouveau genre forme un terme de transition entre les *Apatele* et les *Cryphia* et doit se placer entre les genres *Cranioophora* Snell. (*Cranionycta* de Lattin, *Miracopa* Drdt.) et *Cryphia* Hb.

Le fait, en outre, que les espèces-types, uniques jusqu'à présent, de ces deux genres, en dehors de leurs caractères morphologiques et biologiques, ont une distribution typiquement atlanto-méditerranéenne et ne se rapprochent nettement d'aucune autre espèce paléarctique, est un argument de plus pour les placer dans des genres à part.

Je me propose, dans un travail ultérieur, de faire figurer les armures génitales de ces deux espèces par comparaison avec celles des genres voisins.

Présenté à la Section entomologique en sa séance du 14 septembre 1955.

2. Voir D<sup>r</sup> H. CLEU, « Description d'une forme alpine de *Bryophila pineti* Stgr. et de sa chenille » in « Lepidoptera ». 3/4, p. 145, 1927).