

DICTIONNAIRE

CLASSIQUE

D'HISTOIRE NATURELLE,

PAR MESSIEURS

AUDOUIN, ISID. BOURDON, AD. BRONGNIART, DE CANDOLLE, G. DELAFOSSE, DESHAYES, E. DESLONCHAMPS, DRAPIEZ, DUMAS, EDWARDS, H.-M. EDWARDS, A. FÉE, GEOFFROY SAINT-HILAIRE, ISID. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, GUÉRIN, GUILLEMIN, A. DE JUSSIEU, KUNTH, LATREILLE, LESSON, C. PRÉVOST, A. RICHARD, et BORY DE SAINT-VINCENT.

Ouvrage dirigé par ce dernier collaborateur, et dans lequel on a ajouté, pour le porter au niveau de la science, un grand nombre de mots qui n'avaient pu faire partie de la plupart des Dictionnaires antérieurs.

TOME QUATORZIÈME.

PLA-ROY.

PARIS.

REY ET GRAVIER, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

Quai des Augustins, n° 55 ;

BAUDOUIN FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

Rue de Vaugirard, n° 17.

~~~~~

SEPTEMBRE 1828.

calicinal; l'ovaire est sessile, ovoïde, uniloculaire, contenant deux ovules suspendus et collatéraux; le style se termine par un stigmate simple, et le fruit est une drupe, à peau lisse glabre, toujours glauque, contenant un noyau osseux, rugueux, comprimé, et ayant son bord aigu, creusé d'un sillon. Les Pruniers sont des Arbres ou des Arbrisseaux à feuilles alternes pétiolées, simples, munies de deux stipules à leur base. Les fleurs sont blanches, s'épanouissant avant les feuilles, et portées sur des pédoncules axillaires et uniformes. Parmi les espèces de ce genre, nous mentionnerons ici les suivantes, qu'on voit le plus souvent figurer dans nos jardins:

**PRUNIER ÉPINEUX** ou **PRUNELLIER**, *Prunus spinosa*, L. Cette espèce est extrêmement commune dans nos haies et nos bois. Ses fleurs sont petites, très-nombreuses, ses rameaux terminés en pointe roide et aiguë; ses fruits sont petits et excessivement âpres. C'est avec ces fruits non mûrs que l'on prépare en Allemagne un extrait astringent connu sous le nom d'*Acacia nostras*.

**PRUNIER DE BRIANÇON**, *Prunus Brigantia*, Vill., Fl. Dauph., 3, p. 555. Cette espèce, qui croît dans les Alpes du Dauphiné, a ses fruits jaunâtres, fades et peu agréables; on retire de leur amande une huile grasse, légèrement amère, et qu'on emploie aux mêmes usages que l'huile d'olive: elle est connue sous le nom vulgaire d'*Huile de Marmotte*.

**PRUNIER CULTIVÉ**, *Prunus domestica*, L. C'est un Arbre de moyenne grandeur qui paraît originaire de la Syrie, mais qui est naturalisé en Europe depuis un temps immémorial, et qui par suite de la culture a produit dans nos vergers un grand nombre de variétés, relatives à la forme, au volume, à la couleur et à la saveur des fruits. Ces variétés sont à fruits violacés ou à fruits jaunâtres ou verdâtres; parmi les premières nous distinguerons: la Prune de Monsieur, le gros Damas, la Reine-Claude violette, la Royale de Tours, la Couets-

chen, etc. Au nombre des secondes on trouve: la Reine-Claude, la Mirabelle, la Sainte-Catherine, etc. Le Prunier est un Arbre assez rustique, qu'on s'accommode des différentes sortes de terrains, pourvu qu'il ne soit pas trop glaiseux ni trop sablonneux. De même que la plupart des autres Arbres fruitiers, une terre franche et légère est celle où il prospère le mieux; l'exposition du levant ou même celle du midi sont celles qui lui sont le plus favorables. Les Pruniers se multiplient de deux manières, par les semis ou par le moyen des rejetons qui se développent auprès des vieux pieds. Toutes les variétés se conservent et se propagent par la greffe.

Lorsque les Prunes sont parvenues à leur maturité parfaite, les bonnes variétés, comme la Reine-Claude, la Mirabelle, la Sainte-Catherine, forment un des meilleurs fruits de nos climats; leur saveur douce et sucrée est rendue encore plus agréable par un arôme délicat, aussi en fait-on une très-grande consommation pendant les chaleurs de l'été. Cependant, mangées en trop grande quantité, elles finissent par devenir laxatives, et occasionent souvent des diarrhées opiniâtres. Ces fruits ont le très-grand avantage de pouvoir être conservés pendant l'hiver; séchés au soleil, après avoir été passés au four, ils forment les Pruneaux qui sont à la fois un aliment et un médicament; ceux qu'on prépare avec les grosses espèces, comme la Sainte-Catherine, la Reine-Claude, la Couetschen, ont une saveur agréable et sucrée, et on les sert sur nos tables au dessert. Les meilleurs viennent de la Touraine et des environs d'Agen. Leur usage est permis aux convalescens, et précède en général celui des alimens plus substantiels tirés du règne animal. Mais quand les Pruneaux ont été faits avec la petite Prune de Damas, ils ont une saveur moins sucrée, un peu âpre, et ils agissent comme laxatifs; on les donne fréquemment aux enfans pour les purger doucement, ou leur décoction sert d'exci-

Bridel francise de la sorte le nom du genre *Gymnostomum*. V. GYMNOSTOME. (B.)

RASUTIUS. OIS. (Klein.) Syn. de *Ramphastos Pittacus*, L. V. TOUCAN. (B.)

RAT. *Mus*. MAM. Genre de Mammifères de l'ordre des Rongeurs à clavicules complètes. Ce nom de Rat a été appliqué à un grand nombre de petits Animaux formant aujourd'hui pour les naturalistes des genres distincts de la même famille, qui sont les *Sacomys*, *Pseudostoma*, *Cynomys*, *Geomys*, *Diplostoma*, *Cricetus*, *Heteromys*, *Otomys*, *Arvicola*, *Sigmodon*, *Neotoma* et *Ctenomys*. V. ces mots dans le Dictionnaire ou au Supplément. Les caractères principaux, qui isolent le genre *Mus* des autres Rongeurs, sont tirés des dents. Celles-ci sont au nombre de seize, c'est-à-dire quatre incisives et douze molaires. Ces dernières ont leur couronne tuberculeuse. Les autres caractères sont : quatre doigts et un vestige de pouce aux pattes antérieures; cinq doigts non palmés aux pieds de derrière; queue plus ou moins longue, presque nue, et présentant des rangées transversales très-nombreuses de petites écailles, de dessous lesquelles sortent les poils, quelquefois floconneux au bout; poils des parties supérieures quelquefois roides et plats ou épineux. Les mamelles sont au nombre de quatre ou de douze. La taille est toujours médiocre et le plus souvent petite. Les Rats sont omnivores et essentiellement destructeurs. L'espèce la plus commune semble avoir suivi l'Homme dans tous les établissemens qu'il a formés. Leur appétit les porte à s'entre-détruire lorsqu'ils sont pressés par la faim. Leur ardeur à l'époque du rut est extrême, et leur génération très-féconde. Ils sont répandus dans toutes les parties du globe et dans les îles les plus reculées du grand Océan. Il paraît cependant que le Rat noir est originaire de l'Amérique, et qu'il a été introduit en

Europe à l'époque des premières navigations européennes. Les anciens ne connaissaient que la Souris, ou le *Mus musculus*. La plupart des espèces de Rats sont très-mal décrites, et leur synonymie est très-embrouillée. Ce genre aurait besoin d'une révision accompagnée de figures, et surtout de détails anatomiques. Les Animaux reconnus pour appartenir au genre *Mus* des zoologistes actuels, sont :

† RATS SANS ÉPINES.

α De l'ancien continent.

RAT GÉANT, *Mus giganteus*, Hardw., Desm.; *Mus setifer*, Horsf., jeune âge; *Mus malabaricus*, Pennant. Ce Rat a le pelage d'un brun obscur sur le dos, gris sous le ventre; les extrémités noires, et la queue peu couverte de poils; se creuse des terriers dans les jardins, et habite la côte du Malabar, le Bengale et l'île de Java. Le corps seul a de longueur un pied un pouce sans y comprendre la queue qui est de même dimension.

RAT DE SUMATRA, *Mus sumatrensis*, Raffles. Ce Rat a dix-sept pouces de longueur, sans y comprendre la queue qui en a six. Celle-ci est nue, écailleuse et terminée en pointe, mousse; le corps est couvert de poils roides, gris et brun sur le dos; la tête est courte, d'une teinte plus claire. Vit dans les haies de Bambous dont il mange les racines, à Sumatra.

RAT DE JAVA, *Mus javanus*, Desm., Herm. Cette espèce est de la taille du Rat de Sumatra; elle est d'un brun roux en dessus; les quatre pieds blancs; la queue, plus courte que le corps, est assez couverte de poils. Habite l'île de Java.

RAT CARACO, *Mus Caraco*, Pallas, Desm. Est voisin par sa taille du Surmulot; a le dos mélangé de roussâtre et de gris foncé, plus clair sur les flancs; le ventre est d'un cendré blanchâtre; les pieds d'un blanc sale à demi palmés. Se tient dans l'intérieur des maisons, aussi dans le voi-

## RAT

sinage des eaux, en Sibérie et en Mongolie.

**RAT SURMULOT**, *Mus decumanus*, Pallas; le Surmulot et le Pouc, Buff., pl. 27, Desm. Cette espèce, plus grande que le Rat noir, a le pelage gris, brun en dessus et blanc en dessous; queue presque de la longueur du corps. Il nage avec facilité, quoique ses pieds ne soient pas palmés; est vorace et vit de tout. Originaire de l'Inde, il a été introduit en France en 1650, et est extraordinairement commun dans les ports de mer.

**RAT A BANDES**, *Mus lineatus*, Eversm. Ce Rat a la queue aussi longue que le corps; une raie étroite et noire est placée sur le dos depuis la nuque jusqu'à la queue, deux autres lignes latérales moins foncées l'accompagnent en biaisant un peu; le pelage est en général d'un brun gris; les oreilles sont d'un gris jaune, avec une grande tache noire près de chacune; le ventre est d'un gris clair. Il a été trouvé près du ruisseau de Ouzounbourgthe, entre Oiembourg et Bukkara.

**RAT DE L'INDE**, *Mus indicus*, Geoff., Desm. Est gris roussâtre en dessus et grisâtre en dessous; la queue est un peu moins longue que le corps; ses oreilles sont grandes et presque nues. Il est de la taille du Surmulot et habite Pondichéry.

**RAT D'ALEXANDRIE**, *Mus alexandrinus*, Geoff., Desm. A le pelage d'un gris roussâtre en dessus, cendré en dessous; la queue d'un quart plus longue que le corps; les poils du dos les plus longs sont aplatis, fusiformes et striés sur une face. Habite l'Égypte.

**RAT NOIR**, *Mus Rattus*, L. Ce Rat, qui vit dans nos maisons, est noirâtre en dessus et cendré foncé en dessous; des petits poils blanchâtres couvrent le dessus des pieds. Il est quelquefois atteint d'albinisme; il est courageux, omnivore, et habite toute l'Europe et l'Amérique.

**RAT D'ISLANDE**, *Mus islandicus*, Thien. Cette espèce, décrite récem-

## RAT

475

ment par Thienemann, est noirâtre sur le dos et grise sur tout le reste du corps. On observe des taches jaunes sur les flancs; la queue est presque nue, à écailles verticillées, et à peine plus longue que le corps. Habite l'Islande.

**RAT MULOT**, *Mus sylvaticus*, L. Le Mulot est un peu plus gros que la Souris; il est gris roussâtre sur le dos, et le ventre est blanchâtre; sa queue est un peu plus courte que le corps; sa multiplication est parfois étonnante; il ravage alors des provinces entières. Il est de toute l'Europe.

**RAT CHAMPÊTRE**, *Mus campestris*, Fr. Cuv., Dict. Sc. nat.; le Mulot nain ou Mulot des bois, de Dautenton. La queue est plus longue que le corps de quatre lignes; les poils sont gris ardoisés à leur naissance et sauves à leur extrémité; tout le dessous du corps et les quatre pieds sont blancs; les moustaches sont noires. Habite les champs non loin des villages de France, et d'une grande partie de l'Europe tempérée.

**RAT SOURIS**, *Mus Musculus*, L. La Souris est le commensal de toutes nos demeures; elle est d'un gris uniforme en dessus, passant au cendré en dessous; sa queue est à peu près aussi longue que le corps; elle est assez velue. Ce petit Animal offre plusieurs variétés dans les teintes de son pelage. Il habite toute l'Europe et toutes les parties du monde où se sont établis les Européens.

**RAT DES MOISSONS**, *Mus messorius*, Shaw, Desm. A le pelage d'un gris de Souris mêlé de jaunâtre en dessus, blanc en dessous; les pieds sont de cette dernière couleur; la queue de très-peu plus courte que le corps, qui est de deux pouces trois lignes. Vit dans les endroits rocailleux, les champs cultivés en Angleterre.

**RAT SITNIC**, *Mus agrarius*, Pallas, Gmel. Le Rat à barbe noire est gris ferrugineux en dessous, avec une ligne dorsale noire et étroite; sa queue a un peu plus de la moitié de la longueur totale du corps, qui est de

deux pouces dix lignes. Il ravage les moissons dans le nord de l'Allemagne, la Russie et la Sibérie.

**RAT SUBTIL**, *Mus subtilis*, Pallas; *Mus vagus*, Pallas; le Sikistan ou Rat vagabond. Son pelage est fauve ou cendré en dessus, avec une ligne dorsale noire; les oreilles sont plissées, et la queue est plus longue que le corps; il ressemble un peu au Rat fauve de Sibérie, mais il a les oreilles et la queue plus longues. On connaît deux ou trois variétés dans les couleurs du pelage, ce qui porta Pallas à le nommer *Mus vagus* et *Mus betulinus*. Il grimpe aisément dans les arbres, et est très-commun en Sibérie et surtout en Tartarie.

**RAT DE DONAVAN**, *Mus Donavani*. Ce Rat, figuré dans la 26<sup>e</sup> livraison du Magasin du Naturaliste, a une queue médiocre, légèrement pointue, ayant une teinte générale sur le corps d'un fauve noir varié de cendré, sur lesquels tranche sur le dos trois lignes plus claires. Il habite le cap de Bonne-Espérance.

**RAT STRIÉ**, *Mus striatus*, L. Le *Mus orientalis* de Séba a le pelage d'un gris roux en dessus, et marqué d'une douzaine de lignes longitudinales et de petites taches blanches; sa queue est de la longueur du corps, et sa taille un peu moindre que celle de la Souris. Habite les Indes-Orientales.

**RAT DE BARBARIE**, *Mus barbarus*, L. A le pelage brun en dessus, et marqué de dix lignes longitudinales blanchâtres; les pieds de devant n'ont que trois doigts; il est plus petit que la Souris commune. Habite l'Amérique septentrionale. Cette espèce est douteuse dans le genre qu'elle occupe.

**RAT NAIN**, *Mus soricinus*, Herm. Le Rat à museau prolongé est gris jaunâtre en dessus, blanchâtre en dessous; son museau est très-aigu; ses oreilles sont orbiculaires et velues; la queue est aussi longue que le corps; diffère du Rat des moissons par la forme de son museau. Habite les environs de Strasbourg.

**RAT FAUVE**, *Mus minutus*, Pallas, Desm. Le Rat ferrugineux a, comme son nom l'indique, le pelage de cette couleur en dessus et blanchâtre en dessous; le museau peu prolongé, et la queue plus courte que le corps; il est de moitié moins grand que la Souris, et vit dans les champs; se réunit en grande société sous les gerbes de blé, en Russie et en Sibérie.

**RAT A QUEUE BICOLORE**, *Mus dichrurus*, Rafin. Le Rat de Sicile est encore très-mal connu; il a huit pouces; le pelage fauve, mélangé de brunâtre en dessus et sur les côtés; la tête marquée d'une bande brunâtre; le ventre blanchâtre; la queue de la longueur du corps, annelée, ciliée, brune en dessus, blanche en dessous et un peu tétragone. Habite les champs de la Sicile.

β *Rats du nouveau continent.*

**RAT ANGOUYA**, *Mus Angouya*, d'Azzara, Desm. C'est le *Mus brasiliensis* de Geoffroy, mais non celui décrit sous ce nom par Desmarest; il est d'un brun fauve en dessus, blanchâtre en dessous, mais plus clair sous la tête, et plus foncé sous la poitrine; la queue est un peu plus longue que le corps; les oreilles sont arrondies et moyennes. Il habite le Paraguay.

**RAT ROUX**, *Mus rufus*, d'Azzara, Desm. Le Rat cinquième de d'Azzara est généralement d'un fauve rousâtre, plus terne et plus foncé sur la tête et sur le dos; le ventre est jaunâtre; la queue a la moitié de la longueur du corps. Habite le voisinage des eaux au Paraguay.

**RAT DU BRÉSIL**, *Mus brasiliensis*, Desm., Dic. Sc. nat. Est de la taille du Rat commun, auquel il ressemble par ses formes, mais sa tête est plus courte et ses oreilles sont moins longues; son pelage est ras et doux, d'un brun fauve sur le dos, fauve sur les flancs, et gris sous le ventre; sa queue est un peu plus longue que le corps, et ses moustaches sont noires. Habite le Brésil.

# RAT

**RAT A GROSSE TÊTE**, *Mus cephalotes*, Desm. Ce Rat est remarquable par la grosseur de sa tête, par son museau court, son pelage brun en dessus, plus clair sur les côtés, blanchâtre, tirant un peu sur le fauve en dessous; la queue est de la longueur du corps; vit dans les terres labourées, y creuse des terriers. Habite les alentours de l'Assomption au Paraguay.

**RAT OREILLARD**, *Mus auritus*, Desm. Le Rat quatrième de d'Azzara a aussi une grosse tête; les oreilles très-longues; le pelage généralement gris de Souris en dessus et blanchâtre en dessous; la queue plus courte que le corps. Habite les Pampas de Buenos-Ayres.

**RAT BLEU**, *Mus cyaneus*, Gmel. Le Guanque de Molina, dont le genre est douteux; il ressemble au Mulot; ses oreilles sont plus arrondies; sa queue est de médiocre longueur et presque en entier poilue; son pelage, blanc en dessous, est d'un gris bleu en dessus; il se creuse des terriers et vit en famille dans le Chili.

**RAT DES CATINGAS**, *Mus pyrrhorhinus*, Wied Neuwied, It. Ce Rat, de la grosseur du Lérot, a la queue très-longue; le corps gris brunâtre sale; les oreilles grandes et presque nues; les cuisses, la région anale et la base de la queue d'un rouge brun. Cet Animal habite souvent la partie inférieure des nids de la Fauvette à front roux, tandis que cet Oiseau occupe le nid supérieur, sur les frontières de Mina-Geraës, au Brésil.

**RAT AUX TARSES NOIRS**, *Mus nigripes*, Desm. Le Rat sixième de d'Azzara a la tête grosse; les oreilles courtes et arrondies; le pelage d'un brun fauve en dessus, blanchâtre en dessous; les extrémités des pieds de couleur noire très-foncée; la queue plus courte que le corps; a cinq pouces onze lignes de longueur totale en y comprenant la queue. Habite les terres cultivées au Paraguay.

**RAT PILORIS**, *Mus Pilorides*, Desm., Dict. Sc. nat. Ce Rat est le Piloris des créoles des Antilles; il est presque aussi grand que le Surmulot;

son pelage est en entier d'un beau noir lustré, à l'exception du menton, de la gorge et de la base de la queue, qui sont d'un blanc pur. Ce n'est point le Piloris de la Martinique dont parle Rochefort. Habite les Antilles.

**RAT LAUCHA**, *Mus Laucha*, Desm. Le Rat septième de d'Azzara a la tête peu large, mais le museau pointu; son pelage est d'une couleur plombée en dessus et blanchâtre en dessous; ses moustaches sont fines et blanches; les tarsi sont blancs en dessous; la queue est un peu plus courte que le corps. Habite les Pampas de Buenos-Ayres.

**RAT AUX PIEDS BLANCS**, *Mus leucopus*, Rafin. Ce Rat n'a que cinq pouces de longueur du bout du museau à l'origine de la queue; il est fauve brunâtre en dessus, blanc en dessous; il a la tête jaune; les oreilles sont larges; la queue, d'un brun pâle en dessus et grisâtre en dessous, est aussi longue que le corps. Habite les États-Unis.

**RAT NOIRÂTRE**, *Mus nigricans*, Rafin. Cette espèce, admise par Desmarest dans sa Mammalogie, et par Harlan dans sa Faune d'Amérique, p. 151, est au moins bien voisine du *Mus Rattus*, si elle ne l'est pas; elle a six pouces de longueur; le corps est noirâtre en dessus et gris en dessous; la queue est plus forte que le corps et noire. Habite l'Amérique septentrionale.

## †† RATS ÉPINEUX.

**RAT PERCHAL**, *Mus Perchal*, Gmel.; *Echimys Perchal*, Geoff.; le Rat Perchal de Buffon, pl. 69. A les oreilles nues; le pelage d'un brun roussâtre en dessus, parsemé de poils roides, gris en dessous; les moustaches noires; la queue ayant neuf pouces de longueur, et le corps quinze pouces. Habite les maisons à Pondichéry, et sa chair y est estimée.

**RAT DU CAIRE**, *Mus cahirinus*, Geoff., Egypte, pl. v, fig. 1. Cette espèce a le pelage d'un gris cendré uniforme, plus clair et plus doux sur les côtés et sur le dos, et composé de

poils roides presque épineux. La queue et le corps ont chacun quatre pouces de longueur. Ce Rat habite l'Égypte. (Less.)

On a étendu le nom de Rat à beaucoup d'Animaux divers, souvent très-différens du genre qui vient de nous occuper, et on a appelé :

RAT (Moll.), une Coquille du genre Cône.

RAT D'AFRIQUE (Mam.), le Cayopolin.

RAT AILÉ (Mam.), les Polatouches.

RAT ALLIAIRE (Mam.), le Campagnol.

RAT LAPIN (Mam.), le Cobaye.

RAT ARAIGNÉE (Mam.), la Musaraigne.

RAT BARABA (Mam.), un Hamster.

RAT BERNARD (Ois.), le Grimpeur.

RAT BIPÈDE (Mam.), la Gerboise.

RAT BLANC (Mam.), le Lérot.

RAT DE BLÉ (Mam.), le Hamster.

RAT A BOURSE (Mam.), le Phascolome.

RAT DU BRÉSIL (Mam.), le Cobaye et le Paca.

RAT BUFFOU (Mam.), le Lérot.

RAT DES CHAMPS (Mam.), la Marmotte de Circassie, le Campagnol, le Mulot, etc.

RAT COMPAGNON (Mam.), un Campagnol.

RAT CRICET (Mam.), le *Batyergus Cricet*.

RAT D'EAU (Mam.), espèce du genre Campagnol. *V.* ce mot.

RAT D'ÉGYPTÉ (Mam.), la Gerboise.

RAT FÉGOULE (Mam.), le Campagnol économe.

RAT FLÈCHE (Mam.), l'Alagtaga.

RAT DES FLEUVES (Mam.), le Myopotame.

RAT JIRD (Mam.), la Gerbille.

RAT DE LABRADOR (Mam.), un Campagnol.

RAT LIRON (Mam.), le Loir en vieux français.

RAT DE MADAGASCAR (Mam.), le Galago.

RAT MARPOURI (Mam.), le Cabiay.

RAT MANICOU (Mam.), la Marmose.

RAT MARIN, *Mus marinus* (Pois.), vieux nom du *Balistes Capriscus*, L. *V.* BALISTE.

RAT MAULIN (Mam.), espèce de Marmotte du Chili.

RAT DE MER (Rept. et Pois.), le Chélide Luth (*V.* TORTUE) et l'Uranoscope.

RAT DE MONTAGNE (Mam.), la Marmotte.

RAT MUSQUÉ (Mam.). Ce nom a été donné à plusieurs espèces des genres *Mus*, *Mygale* et *Sorex*.

RAT MUSQUÉ DU CANADA (Mam.), syn. d'Ondatra. *V.* CAMPAGNOL.

RAT DU NORD (Mam.), le Soulik. *V.* MARMOTTE.

RAT DE NORVÈGE (Mam.), le Lemming.

RAT DE PALETUVIER (Mam.), le Crabier.

RAT PALMISTE (Mam.), un Écureuil.

RAT DE PHARAON (Mam.), la Mangouste.

RAT PENNADE (Mam.), les Chauve-Souris.

RAT DE PONT (Mam.), l'Écureuil gris.

RAT POURCEAU (Mam.), le Cobaye.

RAT PUANT (Mam.), l'Ondatra.

RAT SABLÉ (Mam.), le Hamster.

RAT SAUTEUR (Mam.), la Gerboise et la Gerbille.

RAT SAUVAGE (Mam.), le Didelphe quatre-œil.

RAT DE SCYTHIE (Mam.), le Polatouche.

RAT DE SURINAM (Mam.), le Phalanger.

RAT DE TARTARIE (Mam.), le Polatouche.

RAT-TAUPE (Mam.). *V.* ASPALAX, ORYCTÈRE et BATHYERGUE au Supplément.

RAT DE TERRE (Mam.), syn. de Géomys. *V.* ce mot.

RAT VERDATRE (Mam.), syn. d'Agouti.

RAT VEULE (Mam.), le Lérot.

RAT VOLANT (Mam.), diverses Chauve-Souris et les Polatouches.

# RAT

RAT VOYAGEUR (Mam.), les Campagnols et autres Rongeurs sujets aux émigrations.

RAT ZIBETH ou ZIBETHIN (Mam.), l'Ondatra, etc. (B.)

\* RATA. POIS. (Delaroché.) Syn. d'*Uranoscopus scaber*, L., aux îles Baléares. V. URANOSCOPE. (B.)

RATANIAH. BOT. PHAN. Nom donné par les Péruviens aux racines de plusieurs espèces du genre *Krameria* qu'ils emploient en médecine, surtout contre les diarrhées. V. KRAMERIE. (A. R.)

RATATE ou RATE. OIS. Noms vulgaires du Grimpereau commun. (B.)

RATE. ZOOL. Ce viscère fait partie de l'appareil digestif, mais ses usages ne sont pas encore bien connus. Il existe dans tous les Animaux vertébrés; mais dans les Oiseaux il est déjà moins développé que dans les Mammifères, et dans les Reptiles et les Poissons, il devient souvent presque rudimentaire. Dans l'Homme la Rate occupe l'hypocondre gauche, et se trouve placée entre le rein, le diaphragme et l'estomac. Sa forme est à peu près prismatique, et il est recouvert par une tunique fibro-celluleuse. Son tissu est brun rougeâtre, spongieux, et paraît avoir de l'analogie avec celui des organes érectiles. En effet, un nombre très-considérable de vaisseaux sanguins s'y distribuent et communiquent librement avec les cellules dont ce viscère est composé. Dans les autres Animaux vertébrés, le volume, la forme et même la position de la Rate varient beaucoup. Dans les Mammifères carnassiers il est en général étroit, long et prismatique; chez les Ruminants il est le plus souvent large et mince; enfin dans le Marsouin et le Dauphin ce viscère est formé de sept petits corps arrondis et parfaitement distincts, tandis que dans les autres Mammifères il est unique. Le volume de la Rate diminue aussi; car dans les deux Animaux dont nous venons

# RAT

479

de parler les sept Rates réunies n'égalent point en grosseur celui d'un autre Quadrupède. Dans les Oiseaux cet organe est en général très-petit et ovalaire; enfin dans les Reptiles et les Poissons sa forme varie considérablement. La position de la Rate, relativement à l'estomac, et les relations de ses vaisseaux sanguins avec cet organe, présentent aussi de grandes différences à mesure que l'on descend de l'Homme vers les Poissons. Ainsi dans la Grenouille on le trouve au milieu du mésentère près du rectum, tandis qu'en général il est rapproché de l'estomac. V. l'article DIGESTION au Supplément. (H.-M. E.)

RATEAU. CONCH. Espèce du genre Huitre. V. ce mot. (B.)

RATEAU. BOT. PHAN. Nom vulgaire du *Bisserula Pelicinus*, L., et de la Lusérne. V. ce mot et BISSERULE. (B.)

RATEL. *Mellivora*. MAM. Tous les auteurs placent dans le genre Glouton, *Gulo*, un Animal du cap de Bonne-Espérance, dont Storr a fait le type de son genre *Mellivora*. Ce Ratel, décrit par Sparmann et par Lacaille sous le nom de Blaireau puant, est la *Viverra Mellivora* de Linné, le *Gulo capensis* de Desmarest. Ses caractères génériques ne diffèrent point de ceux du Glouton; seulement le système dentaire présente quelques dissemblances. V. GLOUTON. (LESS.)

RATELAIRE. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de l'Aristoloché Clématite. (B.)

\* RATEPENNADE ou RATTEPENNADE. POIS. L'un des noms vulgaires du *Raya Pastinaca*. V. RAIE. (B.)

RATEREAU. OIS. L'un des noms vulgaires du Troglodyte. (B.)

RATIER. OIS. L'un des noms vulgaires de la Cresserelle. V. FAUCON. (B.)

RATILLON. OIS. Même chose que Ratereau. V. ce mot. (B.)