

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6^e)

ABONNEMENT ANNUEL	} France et Colonies Françaises	500 francs
C. C. P. Lyon 101-98		

PARTIE SCIENTIFIQUE

DIAGNOSES PROVISOIRES DE NOUVEAUX DYTISCIDES DU MAGYAR NEMZETI MUZEUM

par le D^r F. GUIGNOT.

Dans un important matériel de Dytiscides, envoyé pour étude par le Magyar Nemzeti Muzeum de Budapest, se trouvaient trois espèces et une sous-espèce nouvelles. Leur description ne devant paraître que bien plus tard dans les Annales de ce musée, je viens en donner dès aujourd'hui une diagnose sommaire. Les types de ces nouveautés se trouvent dans la collection entomologique du Magyar Nemzeti Muzeum.

Ilybius (Agabidius) mandsuricus, n. sp.

♀. Long. 8,5 mm. Ressemble beaucoup comme forme et dessin à *Ilybius (Agabidius) apicalis* Sharp, mais s'en distingue absolument, ainsi que de tous les autres *Agabidius*, par la sculpture des élytres qui consiste seulement en une microréticulation et un pointillé, sans grande réticulation.

Mandchourie. Type unique.

Rhanthus hispanicus ssp. pericaspicus, n. ssp.

Long. 9,2-9,5 mm. Sous-espèce caractérisée par la taille légèrement plus faible que la forme typique, le pronotum concolore ou orné seulement de la bordure antérieure noire mais plus étroite, chez le ♂ par les ongles des protarses non subfalciformes, seulement très faiblement arqués, et par le pénis un peu moins aminci dans sa moitié apicale.

Régions péricaspiennes : Guberti (type), Ouralsk, Oural, Caucase.

Cybister (Melanectes) papuanus, n. sp.

Long. 22,5-23 mm. Voisin du *Cybister (Melanectes) sugillatus* Er., dont il diffère par la forme plus épaisse, plus convexe, non dilatée en arrière ou à peine, l'apophyse prosternale non élargie à la base, le ♂ à deux premiers articles des mésotarses pourvus d'une petite semelle pubescente étroitement triangulaire, à pénis, vu dorsalement, moins allongé, plus large, avec la tige terminale un peu plus courte et bien moins grêle.

Nouvelle-Guinée : île Yulé.

Cybister (Meganectes) yulensis, n. sp.

Long. 30-32 mm. Assez semblable au *Cybister (Meganectes) hypomelas* Rég., mais un peu plus grand, à bande submarginale jaune très légèrement plus large et en général plus nette, à dessous noir varié de testacé sur les mésoépimères, la moitié basale des ailes métatarsales, les métacoxas et faiblement sur les pattes, avec l'apophyse prosternale subplane, élargie et fovéolée à la base dont le bord antérieur est subrectiligne et assez net, le ♂ à palettes prosternales assez grandes, subovales, à pénis avec un faible étranglement médian entre deux portions subrenflées et le sommet tronqué avec les angles latéraux droits, enfin la ♀ aciculée sur le pronotum et presque entièrement striolée sur les élytres.

Nouvelle-Guinée : île Yulé.