

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
**DE LYON**

---

*Année 1875*

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME VINGT-DEUXIÈME

---

**LYON**  
**H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR**  
65, RUE DE LYON  
MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

**PARIS**  
**J. B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS**  
19, RUE HAUTEFEUILLE

1876



CATALOGUE  
DES  
OISEAUX-MOUCHES  
OU COLIBRIS

PAR  
M. E. MULSANT

---

**Première Tribu : les TROCHILIENS**

PREMIÈRE DIVISION

PREMIÈRE BRANCHE : LES GRYPAIRES

Genre *Eutoxeres*, REICHENBACH.

*aquila*, BOURCIER. — Équateur, Colombie, Nouvelle-Grenade,  
Guatemala, Costa-Rica.

*Condamini*, BOURCIER. — Équateur.

Genre *Grypus*, SPIX.

(Sous-genre *Androdon*.)

*aequatorialis*, GOULD. — Équateur.

(Sous-genre *Grypus*.)

*naevius*, DUMONT. — Brésil.

*Spixi*, GOULD. — Brésil.

Genre *Glaucis*, BOIÉ.

(Sous-genre *Glaucis*.)

*hirsutus*, GMELIN. — De Panama au Brésil.

Var. *Mazeppa*, LESSON. — Panama, Nouvelle-Grenade, Cayenne, Tabago, la Trinité, Brésil.

Var. *aeneus*, LAWRENCE. — Costa-Rica.

Var. *lanceolatus*, GOULD. — Para (Brésil.)

Var. *affinis*, LAWRENCE. — Équateur.

Var. *melanura*, GOULD. — Bords du Napo, du Rio Negro.

*Dohrni*, BOURCIER et Mulsant. — Brésil.

*Antoniae*, BOURCIER et Mulsant. — Guyane.

Genre *Threnetes*, GOULD.

*Ruckeri*, BOURCIER. — Équateur, Nouvelle-Grenade, Costa-Rica, Veragua.

Var. *Fraseri*, GOULD. — Équateur.

*leucurus*, LINNÉ. — Guyane, bords du Napo.

Var. *cervinicauda*, GOULD. — Guyane.

#### DEUXIÈME BRANCHE : LES PHAËTORNAIRES

Genre *Phaetornis*, SWAINSON.

(Sous-genre *Toxoteuches*.)

*Yaruqui*, BOURCIER. — Équateur.

*Guyi*, LESSON. — Trinidad, Venezuela.

Var. *Emiliae*, BOURCIER et Mulsant. — Costa-Rica, Venezuela, Colombie.

(Sous-genre *Phaetornis*.)

*superciliosus*, LINNÉ. — Guyane, Amazone, Colombie, Équateur.

Var. *fraterculus*, GOULD.

Var. *consobrinus*, BOURCIER.

Var. *Moorei*, LAWRENCE.

*Cephalus*, BOURCIER et Mulsant. — Mexique, Amérique centrale, Colombie, Équateur occidental.

Var. *bolivianus*, GOULD. — Panama, Nicaragua, Nouvelle-Grenade, Guatemala.

*syrrhatophorus*, GOULD. — Équateur, Pérou, Bolivie, Colombie.

*hispidus*, GOULD. — Amazone supérieur, Colombie.

(Sous-genre *Anisoterus*.)

*Pretrai*, LESSON et DELATTRE. — Brésil.

*Augusti*, BOURCIER et Mulsant. — Venezuela, Colombie, Vallée de la Magdalena.

(Sous-genre *Milornis*.)

*squavidus* (NATTERER) TEMMINCK. — Brésil.

*Eurynome*, LESSON. — Brésil.

*anthophilus*, BOURCIER et Mulsant. — Nouvelle-Grenade, Venezuela.

(Sous-genre *Ametornis*.)

*Bourcieri*, LESSON. — Amazone supérieur, Guyane.

*Phillipii*, BOURCIER et Mulsant. — Bolivie, Pérou.

Genre *Pygmornis* (BONAPARTE.)

(Sous-genre *Pygmornis*.)

*Idaliae*, BOURCIER et Mulsant. — Brésil.

*longuemareus*, LESSON. — La Guyane, la Trinité, Venezuela.

*striigularis*, GOULD. — Nouvelle-Grenade, Équateur.

(Sous-genre *Eremita*.)

*griseogularis*, GOULD. — La Nouvelle-Grenade.

*Adolphi*, (SALLÉ) GOULD. — Mexique, Amérique centrale, jusqu'à Panama.

*pygmaeus*, SPIX. — Brésil, Guyane.

*nigricinctus*, LAWRENCE. — Équateur orient., parties supérieures de l'Amazone, Pérou.

TROISIÈME BRANCHE : LES CAMPYLOPTÉRAIRES

Genre *Eupetomena*, GOULD.

*macroura*, Gmelin. — Guyane, Brésil, bords de l'Amazone.

Genre *Sphenoproctus*, CABANIS et HEINE.

*pampa*, LESSON. — Guatemala, Nouvelle-Grenade.

*curvipennis*, LICHTENTEN. — Mexique.

Genre *Campylopterus*, SWAINSON.

*largipennis* (BUFFON), BODDAERT. — Guyane.

Var. *obscurus*, GOULD. — Bords de l'Amazone.

Var. *aequatorialis*, GOULD.

{ *ensipennis*, SWAINSON. — Tabago, Trinité, Venezuela.  
 { *splendens* ♀, LAWRENCE.

*Delattrei*, LESSON. — Mexique, Amérique centrale jusqu'à Veragua.

*Villavicencii*, BOURCIER. — Bords du Napo, Équateur oriental.

*lazulus*, VIEILLOT. — Venezuela, Colombie, Nouvelle-Grenade,  
 Équateur.

*rufus*, LESSON. — Guatemala.

*hyperythrus*, CABANIS. — Guyane anglaise.

(Sous-genre *Crinis*.)

*calosoma*, ELLIOT. — Nouvelle-Grenade.

Genre *Phaeochroa*, GOULD,

*Cuvieri*, DELATTRE et BOURCIER. — Venezuela, Nouvelle-Grenade,  
 Panama, Costa-Rica.

*Roberti*, SALVIN. — Guatemala.

Genre *Aphantochroa*, GOULD.

*cirrhochloris*, VIEILLOT. — Brésil.

*hyposticta*, GOULD. — Équateur.

(Sous-genre *Placophorus*.)

*gularis*, GOULD. — Amazone supérieur.

#### QUATRIÈME BRANCHE : LES LAMPORNAIRES

Genre *Lampornis*, SWAINSON.

*veraguensis*, GOULD. — Veragua, Porto-Rico.

*gramineus*, GMELIN. — Saint-Domingue, Trinité, Guyane, Brésil,  
 Venezuela.

*aurulentus*, VIEILLOT. — Saint-Domingue, Saint-Thomas, Porto-  
 Rico.

Var. *virginalis*, GOULD. — Saint-Thomas.

*mango*, LINNÉ. — Brésil, Guyane, Antilles, bords de l'Amazone,  
 Venezuela, Colombie et Panama.

*Prevosti*, LESSON. — Mexique, Amérique centrale jusqu'à Costa-Rica.  
*porphyrorus*, SHAW. — La Jamaïque.

Genre *Chalybura*, REICHENBACH.

(Sous-genre *Methon*.)

*caeruleiventris*, REICHENBACH. — Colombie.

(Sous-genre *chalybura*.)

*Buffoni*, LESSON. — Nouvelle-Grenade, Venezuela.

*viridis*, VIEILLOT. — Porto-Rico.

*melanorrhoea*, SALVIN. — Costa-Rica, Veragua.

*urochrysa*, GOULD. — Panama.

Genre *Hypuroptila*, GOULD.

*Isaurae*, GOULD. — Costa-Rica, Veragua.

Genre *Sternoclyta*, GOULD.

*cyaneipectus*, GOULD. — Venezuela.

Genre *Urochroa*, GOULD.

*Bougueri*, BOURCIER. — Équateur.

Genre *Coeligena*, LESSON.

(Sous-genre *Coeligena*.)

*Clemenciae*, LESSON. — Mexique.

(Sous-genre *Himelia*.)

*Henrici*, LESSON et DELATTRE. — Mexique, Guatemala.

*viridipallens*, BOURCIER et MULSANT. — Mexique, Guatemala.

Genre *Oreopyra*, GOULD.

*leucaspis*, GOULD. — Volcan de Chiriqui.

*hemileuca*, SALVIN. — Costa-Rica.

*calolaema*, SALVIN. — Costa-Rica, Veragua.

*cinereicauda*, LAWRENCE. — Costa-Rica.

## CINQUIÈME BRANCHE : LES LEUCOLIAIRES

## PREMIER RAMEAU : LEUCOLIATES

Genre *Doleromya* (BONAPARTE).(Sous-genre *Doleromya*.)*fallax*, BOURCIER et Mulsant. — Venezuela.Var. *cervina*, GOULD.(Sous-genre *Phaeoptila*.)*sordida*, GOULD. — Mexique.Var. *zonura*, GOULD. — Mexique.Genre *Cyanomya* (BONAPARTE).*cyanicollis*, GOULD. — Pérou.*violiceps*, GOULD. — Mexico.*quadricolor*, Vieillot. — Mexico.*franciae*, BOURCIER et Mulsant. — Mexique, Guatemala, Colombie.*cianocephala*, Lesson. — Mexique, Guatemala.Var. *Faustinae*, BOURCIER.*guatemalensis*, GOULD. — Guatemala.Genre *Leucolia*, Mulsant et Verreaux.*viridifrons*, Elliot. — Mexique.*Milleri* (Loddiges), BOURCIER. — La Nouvelle-Grenade, la Colombie.*niveipectus*, Cabanis et Heine. — Trinité, Guyane, Venezuela.*viridiceps*, GOULD. — Équateur.*leucogaster*, Gmelin. — Le nord du Brésil, Guyane, bords de l'Amazone.*candida*, BOURCIER et Mulsant. — Mexique, Amérique centrale, Nicaragua.Genre *Thaumatias* (BONAPARTE).*nitidifrons*, GOULD. — ?*caeruleiceps*, GOULD. — Nouvelle-Grenade,

*Luciae*, LAWRENCE. — Honduras.

*brevirostris*, LESSON. — Brésil.

*compsa*, HEINE (an *brevirostris*, var. ?). — Brésil.

*albiventris*, VEUILLOT. — Brésil.

*Linnaei*, GOULD. — Amazone, Guyane, Trinité, Venezuela.

Var. *malvina*, REICHENBACH. — Trinité, Guyane, nord du Brésil, bords de l'Amazone, Venezuela.

*maculicauda*, GOULD. — Nord du Brésil, Guyane.

*apicalis*, GOULD. — Nouvelle-Bretagne.

*terpna*, HEINE. — Bogota.

*fluviatilis*, GOULD. — Parties supérieures de l'Amazone, bords du Napo.

*Bartletti*, GOULD. — Bords de l'Ucayali, parties supérieures de l'Amazone.

Genre *Leucippus* (BONAPARTE).

*chlorocercus*, GOULD. — Parties supérieures de l'Amazone.

*chionogaster*, TSCHUDI. — Bolivie, Pérou.

*pallidus*, TACZANOWSKI. — Pérou central.

Genre *Leucochloris* (REICHENBACH).

*albicollis*, VIEILLOT. — Brésil.

Genre *Elvira*, MULSANT et VERREAUX.

*hemileucura*, GOULD. — Équateur.

*chionura*, GOULD. — Veragua, Panama.

*caeruleiceps*, LAWRENCE. — Costa-Rica.

Genre *Euphrerusa*, GOULD.

(Sous-genre *Clotho*.)

*nigriventris*, LAWRENCE. — Costa-Rica.

(Sous-genre *Eupherusa*.)

*poliocerca*, ELLIOT. — Mexique.

*eximia*, DELATRE. — Guatemala.

*egregia*, SCLATER et SALVIN. — Costa-Rica, Veragua.

Genre *Chrysobronchus* (BONAPARTE).

*virescens*, DUMONT. — Trinité, Brésil, Venezuela.

*viridissimus*, VIEILLOT. — Guyane, Venezuela.

*leucorrhous* (SCLATER et SALVIN), GOULD. — Amazone supérieur.

DEUXIÈME RAMEAU : AMAZILIATES

Genre *Amazilia*, REICHENBACH.

(Sous-genre *Eranna*.)

*cinnamomea*, LESSON. — Costa-Rica, Guatemala.

*Graysoni*, LAWRENCE. — Ile des Trois-Maries.

(Sous-genre *Amazilia*.)

*Dumerili*, LESSON. — Équateur.

*alticola*, GOULD. — Équateur.

*leucophaea*, REICHENBACH. — Pérou.

*Lessoni*, Mulsant et Verreaux. — Pérou et Équateur.

*yucatanensis*, Cabot. — Yucatan, Mexique méridional et oriental.

*cerviniventris*, GOULD. — Mexique.

Genre *Pyrrophaena*, CABANIS et HEINE.

*iodura* (SAUCEROTTE) CABANIS et HEINE. — Colombie.

*castaneiventris*, GOULD. — Colombie.

*Ocai*, GOULD. — Mexique méridional.

*beryllina*, LICHTENSTEIN. — Mexique.

*Devillei*, Bourcier et Mulsant. — Guatemala.

*cyanura*, GOULD. — Nicaragua, Guatemala.

Genre *Leucodora*, Mulsant.

(Sous-genre *Hemistilbon*.)

*Norrisi*, Bourcier. — Équateur, Bolanos (Mexique).

(Sous-genre *Leucodora*.)

*Edwardi*, Delattre et Bourcier. — Panama, Costa-Rica, Veragua.

*niveiventris*, GOULD. — Veragua, Panama.

Genre *Ariana*, Mulsant et Verreaux.

(Sous-genre *Ariana*.)

*Riefferi*, Bourcier et Mulsant. — Amérique centrale, Équateur

Var. *jucunda*, Heine.

Var. *suavis*, Cabanis et Heine.

Var. *Aglaiæ*, BOURCIER et Mulsant.

*viridigaster*, BOURCIER et Mulsant. — Colombie.

(Sous-genre *Erythronota*.)

*erythronota*, LESSON. — Tabago, Trinité, Venezuela.

*Feliciae*, LESSON. — Venezuela, Brésil septentrional.

(Sous-genre *Lisoria*).

*Warszewiczi*, CABANIS et HEINE. — Veragua, Nouvelle-Grenade.

*Sophiae*, BOURCIER et Mulsant. — Costa-Rica, Veragua.

Var. *caligata*, CABANIS et HEINE. — Nouvelle-Grenade.

*Saucerottei*, DELATTRE. — Colombie.

(Sous-genre *Hemithylaca*).

*cyanifrons*, BOURCIER et Mulsant. — Colombie.

Genre *Aithurus*, CABANIS et HEINE.

*polytmus*, LINNÉ. — Jamaïque.

TROISIÈME RAMEAU : HYLOCHARATES

Genre *Heliopaedica*, GOULD.

*Xanthusi*, LAWRENCE. — Mexique.

*leucotis*, VIEILLOT. — Mexique, Guatemala.

Genre *Chrysuronia* (BONAPARTE).

*chrysuræ*, LESSON. — Brésil méridional, Paraguay, République argentine.

*Oenone*, LESSON. — Venezuela, Colombie.

*Josephinae*, BOURCIER et Mulsant. — Amazone supérieur.

Var. *neera*, DELATTRE et LESSON.

*Eliciae*, BOURCIER et Mulsant. — Guatemala, Amérique centrale.

*Humboldti*, BOURCIER et Mulsant. — Équateur.

Genre *Hylocharis*, BOIÉ.

*sapphirina*, GMELIN. — Brésil, bords de l'Amazone.

*cyanea*, VIEILLOT. — Brésil.

*lactea*, LESSON. — Brésil.

Genre *Panterpe*, CABANIS et HEINE.

*insignis*, CABANIS et HEINE. — Costa-Rica, Chiriqui.

Genre *Eucephala* (REICHENBACH).

*chlorocephala* (BOURCIER), GOULD. — Équateur.

*caerulea*, VIEILLOT. — Trinité, Guyane, Venezuela, bords de l'Amazonie.

*scapulata*, GOULD. — Guyane.

*subcaerulea*, ELLIOT. — Brésil?

*hypocyanea*, GOULD. — L'intérieur de la Guyane.

*caeruleo-lavata*, GOULD. — Brésil.

Genre *Ulysses*, MULSANT et VERREAUX.

*Grayi*, DELATTRE et BOURCIER. — Équateur.

Genre *Circe*, GOULD.

*Doubledayi*, BOURCIER. — Mexique.

*latirostris*, SWAINSON. — Mexique.

*magica*, MULSANT et J. VERREAUX. — Basse-Californie.

Genre *Polyerata*, HEINE.

*amabilis*, GOULD. — Costa-Rica, Nouvelle-Grenade, Colombie, Équateur.

Genre *Damophila* (REICHENBACH).

*Juliae*, BOURCIER. — Panama, Colombie, Équateur.

*Feliciana*, LESSON. — Équateur.

QUATRIÈME RAMEAU : CHLOROLAMPATES

Genre *Emilia*, MULSANT et VERREAUX.

*Goudoti*, BOURCIER et MULSANT. — Colombie.

*luminosa*, LAWRENCE. — Nouvelle-Grenade.

Genre *Lepidopyga* (REICHENBACH).

*caeruleogularis*, GOULD. — Amérique centrale, Veragua.

Genre *Sporadinus* (BONAPARTE).

(Sous-genre *Sporadinus*.)

*elegans*, AUDEBERT et VIEILLOT. — Saint-Domingue.

*Ricordi*, GERVAIS. — Cuba.

*incertus* (*elegans*), GOULD. — ?

(Sous-genre *Marsyas*.)

*Maugaei*, VIEILLOT. — Porto-Rico.

Genre *Chlorolampis*, CABANIS et HEINE.

*auriceps*, GOULD. — Mexique.

*Carniveti*, LESSON. — Mexique.

Var. *Osberti*, GOULD.

Var. *Salvini*, CABANIS et HEINE.

Genre *Smaragdochrysis*, GOULD.

*iridescens*, GOULD. — Brésil.

Genre *Ptochoptera*, ELLIOT.

*iolaema* (NATTERER) PELZELN. — Brésil.

Genre *Chlorostilbon*, GOULD.

{ *splendidus*, VIEILLOT. — Bolivie, République argentine, Chili,  
Pérou.

{ *Phaëton*, BOURCIER et Mulsant.

Var. *flavifrons*, GOULD.

*Pucherani*, BOURCIER et Mulsant. — Brésil.

Var. *igneus*, GOULD.

Var. ? *egregius*, HEINE.

*Haerberlini*, REICHENBACH. — Colombie, Venezuela, Panama.

Var. *nitens*, LAWRENCE.

*insularis*, LAWRENCE. — Ile des Trois-Maries (Mexique).

Genre *Chrysomirus*, Mulsant.

{ *angustipennis*, FRASER. — Équateur, Colombie.

{ *chrysoaster*, BOURCIER et Mulsant. — Venezuela, Panama.

Var. *phaeopygus*, TSCHUDI.

Var. *smaragdinus*, CABANIS et HEINE.

Var. *pumilus*, GOULD.

*Atala*, LESSON. — Trinité, Guyane.

Var. *caribaeus*, LAWRENCE.

*Prasinus*, LESSON. — Brésil, Guyane, Venezuela, Vallée de l'Amazone, Pérou.

Var. *brevicaudatus*, GOULD. — Cayenne.

Var. *napensis*, GOULD. — Bords du Napo.

Var. *peruanus*, GOULD. — Pérou.

Var. *daphne*, BOURCIER et Mulsant. — Pampas del Sacramento.

Var. *igneus*, GOULD. — Pérou.

CINQUIÈME RAMEAU : PANICHLORATES

Genre *Panychlora*, CABANIS et HEINE.

*Poortmanni*, BOURCIER et Mulsant. — Nouvelle-Grenade.

Var. ? *euchloris*, REICHENBACH.

Var. ? *aurata*, HEINE. — Pérou.

*Aliciae*, BOURCIER et Mulsant. — Venezuela, Colombie.

*stenura*, CABANIS et HEINE. — Nouvelle-Grenade, Venezuela.

DEUXIÈME DIVISION

PREMIÈRE SECTION

PREMIÈRE BRANCHE : LES TROCHILAIRES

Genre *Trochilus*, LINNÉ.

*pella*, LINNÉ. — Guyane, nord du Brésil, Vallée de l'Amazone.

*pyra*, GOULD. — Guyane, bords du Rio-Negro.

DEUXIÈME BRANCHE : LES EULAMPAIRES

Genre *Eulampis*, BOIÉ.

*angularis*, LINNÉ. — Petites-Antilles.

(Sous-genre *Sericotes*.)*holoscericeus*, LINNÉ. — Petites-Antilles.

## TROISIÈME BRANCHE : LES IOLÉMAIRES

Genre *Iolaema*, GOULD.

{ *Schreibersi* (LODDIGES), BOURCIER. — Équateur, bords du Rio-  
 Negro et des parties supérieures de l'Amazone.

{ *frontalis*, LAWRENCE.

*Whitelyana*, GOULD. — Pérou.

## QUATRIÈME BRANCHE : LES PÉTASOPHORAIRES

Genre *Petasophora*, G. R. GRAY.*anis*, LESSON. — Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou.

Var. *iolata*, GOULD.

Var. *corruscans*, GOULD.

*thalassima*, SWAINSON. — Mexique, Guatemala.*cyantotis*, BOURCIER et MULSANT. — Costa-Rica, Veragua, Nouvelle-Grenade, Équateur.*serrirostris*, VIEILLOT. — Brésil.*Delphinae*, LESSON. — Guatemala (Amérique centrale).

## CINQUIÈME BRANCHE : LES OROTROCHILAIRES

Genre *Orotrochilus*, CABANIS et HEINE.*Pichincae*, BOURCIER et MULSANT. — Équateur.*chimborazi*, BOURCIER. — Équateur.*Estellae*, LAFRESNAYE et d'ORBIGNY. — Bolivie.*leucopleurus*, GOULD. — Chili.*Adelae*, LAFRESNAYE et d'ORBIGNY. — Bolivie.*melanogaster*, GOULD. — Pérou.

## SIXIÈME BRANCHE : LES FLORISUGAIRES

Genre *Florisuga* (BONAPARTE).

*mellivora*, LINNÉ. — Guatemala, Nouvelle-Grenade, vallée de l'Amazone, Trinité, Tabago, Brésil.

Var. *flabellifera*, GOULD.

*fusca*, VIEILLOT. — Brésil.

## SEPTIÈME BRANCHE : LES EUCLOSIAIRES

Genre *Euclosia*, MULSANT et VERREAUX.

*Lafresnayi*, BOISSONNEAU. — Colombie.

*Gayi*, BOURCIER et MULSANT. — Venezuela.

Var. *Saulae*, BOURCIER.

## DEUXIÈME SECTION. — PREMIÈRE FRACTION. — PREMIER GROUPE

## PREMIÈRE BRANCHE : LES PATAGONAIRES

Genre *Patagona*, G. R. GRAY.

*Gigas*, VIEILLOT. — Chili, Bolivie, Pérou, Équateur.

## DEUXIÈME BRANCHE : LES HÉLIODOXAIRES

Genre *Eugenia*, GOULD.

*imperatrix*, GOULD. — Équateur.

Genre *Lampraster*, TACZANOWSKI.

*Branickii*, TACZANOWSKI. — Pérou.

Genre *Heliodoxa*, GOULD.

*jacula*, GOULD. — Nouvelle-Grenade, Veragua, Costa-Rica.

*Jamesoni*, BOURCIER. — Équateur.

Var. *Henryi*, LAWRENCE. Costa-Rica.

Genre *Hypolia*, MULSANT.

*Otero*, TSCHUDI. — Bolivie, Pérou.

*splendens*, GOULD. — Venezuela.

*Leadbeateri*, BOURCIER et MULSANT. — Nouvelle-Grenade.

Genre *Eugenes*, GOULD.

*fulgens*, SWAINSON. — Mexique, Guatemala.

*spectabilis*, LAWRENCE. — Costa-Rica.

TROISIÈME BRANCHE : LES CLYTOLÉMAIRES

Genre *Lamp. olaema*, REICHENBACH.

*Rhami*, LESSON. — Mexique, Guatemala.

Genre *Phaeolaema*, REICHENBACH.

*rubinoides*, BOURCIER et MULSANT. — Colombie.

*aequatorialis*, GOULD. — Équateur.

Genre *Clytolaema*, GOULD.

(Sous-genre *Polyplancta*.)

*aurescens*, GOULD. — Bords du Rio-Negro, parties supérieures de l'Amazone.

(Sous-genre *Clytomena*.)

*rubinea*, GMELIN. — Brésil.

(Sous-genre *Alosia*, MULSANT.)

*Matthewsi* (LODDIGES), BOURCIER. — Parties orientales de l'Équateur.

Genre *Panoplites*, GOULD.

*Jardini*, BOURCIER. — Équateur.

*flavescens*, BOURCIER. — Équateur, Nouvelle-Grenade.

## DEUXIÈME SECTION. — PREMIÈRE FRACTION. — DEUXIÈME GROUPE

## QUATRIÈME BRANCHE : LES HÉLIOTRIXAIRES

Genre *Heliotrix*, BOÏÉ.

*auritus*, GMELIN. — Nord du Brésil, Guyanes, Venezuela, bords de l'Amazonc.

*auriculatus*, LICHTENSTEIN. — Brésil.

Var. *longirostris*, GOULD.

Var. *phainoleuca*, HARTLAUB. — Bords du Rio-Negro.

Var. *phainolaema*, GOULD.

*Barroti*, BOURCIER et Mulsant. — Guatemala, Costa-Rica, Nouvelle-Grenade, Équateur.

Var. *purpureiceps*, GOULD.

Var. *violifrons*, GOULD.

## DEUXIÈME SECTION. — PREMIÈRE FRACTION. — TROISIÈME GROUPE

## CINQUIÈME BRANCHE : LES CHRYSOLAMPAIRES

Genre *Eustephanus*, REICHENBACH.

*Galeritus*, MOLINA. — Chili, île Juan Fernandez.

*Fernandensis*, KING. — Île Juan Fernandez.

*Leyboldi*, GOULD. — Île Massafuera.

Genre *Chrysolampis*, BOÏÉ.

*Moschitus*, LINNÉ. — Trinité, Brésil, vallée de l'Amazone, Venezuela.

*Chlorolaema*, ELLIOT. — Nouvelle-Grenade?

## SIXIÈME BRANCHE : LES AVOCETTINAIRES

Genre *Avocettula*, REICHENBACH.

*recurvirostris*, SWAINSON. — Guyanes.

Genre *Avocettinus* (BONAPARTE).  
*eurypterus*, LODDIGES. — Colombie.

DEUXIÈME SECTION. — PREMIÈRE FRACTION. — QUATRIÈME GROUPE

SEPTIÈME BRANCHE : LES CALLIPÉDIAIRES

Genre *Heliomaster* (BONAPARTE).

- Constanti*, DELATTRE. — Guatemala, Costa-Rica.  
*albicrissa*, GOULD. — Équateur.  
*pallidiceps*, GOULD. — Mexique, Guatemala, Nicaragua.  
*Leocadiae*, BOURCIER et Mulsant. — Mexique.  
*longirostris*, Vieillot. — Trinité, Guyane, vallée de l'Amazone,  
 Venezuela, Nouvelle-Grenade, Amérique centrale jusqu'à  
 Costa-Rica.  
 Var. *Stuartae*, LAWRENCE.  
 Var. *Sclateri*, CABANIS.

Genre *Lepidolarynx*, REICHENBACH.

*mesoleucus*, TEMMINCK. — Brésil.

Genre *Callipedia*, REICHENBACH.

- { *Regis*, SCHREIBERS. — Paraguay, Brésil méridional.  
 { *Angelae*, LESSON.

DEUXIÈME SECTION. — DEUXIÈME FRACTION

PREMIÈRE BRANCHE : LES DOCIMASTAIRES

Genre *Docimastes*, GOULD.

*ensifer*, BOISSONNEAU. — Colombie, Équateur, Pérou.

Var. *Schliephackei*, HEINE.

## DEUXIÈME BRANCHE : LES DIPHLOGÉNAIRES

Genre *Pterophanes*, GOULD.

*Temmincki*, BOISSONNEAU. — Colombie, Équateur, Pérou.

Genre *Helianthea*, GOULD.

*porphyrogaster* (LICHTENSTEIN). — Nouvelle-Grenade.

*Bonapartei*, BOISSONNEAU. — Nouvelle-Grenade.

Genre *Diphlogena*, GOULD.

*iris*, GOULD. — Bolivie.

*hesperus*, GOULD. — Bolivie, Équateur.

*aurora*, GOULD. — Bolivie, Pérou.

Genre *Galligenia*, MULSANT.

*Lutetiae*, DELATTRE et BOURCIER. — Équateur.

*osculans*, GOULD. — Pérou.

*dicroua* (JELSKI), TACZANOWSKI. — Pérou.

*cos*, GRAY et MITCHELL. — Venezuela.

*violifera*, GOULD. — Bolivie.

Genre *Homophania*, REICHENBACH.

*torquata*, BOISSONNEAU. — Colombie.

*fulgidigula*, GOULD. — Équateur.

*Conradi* (LODDIGES), BOURCIER. — Venezuela.

*inca*, GOULD. — Bolivie, Pérou.

Genre *Eudosia*, MULSANT.

*Traviesi*, MULSANT et VERREAUX.

*Prunelli*, BOURCIER et MULSANT. — Nouvelle-Grenade.

*Wilsoni*, DELATTRE et BOURCIER. — Équateur.

Var. *purpurea*, REICHENBACH. — Pérou.

Genre *Lampropygia*, REICHENBACH.

*caeligena*, LESSON. — Colombie.

*boliviana*, GOULD. — Bolivie, Venezuela.

## DEUXIÈME SECTION. — TROISIÈME FRACTION

## PREMIÈRE BRANCHE : LES DORYFÉRAIRES

Genre *Doryfera*, GOULD.

*Johannae*, BOURCIER. — Colombie.

*Euphrosinae*, MULSANT et VERREAUX. — Nouvelle-Grenade.

*veraguensis*, SALVIN. — Costa-Rica, Véragua.

*Ludovicae*, BOURCIER et MULSANT. — Nouvelle-Grenade.

*rectirostris*, GOULD. — Équateur.

## DEUXIÈME BRANCHE : LES ÉRIOCNÉMAIRES

Genre *Saturia*, MULSANT.

*Isaacsoni*, PAZUDAKI. — Nouvelle-Grenade.

Genre *Eriocnemis*, REICHENBACH.

(Sous-genre *Niche*.)

*D'Orbignyi*, BOURCIER. — Équateur, Pérou, Bolivie.

(Sous-genre *Engyete*.)

*Alinae*, BOURCIER. — Colombie.

(Sous-genre *Eriocnemis*.)

*vestita*, LONGUEMARRE. — Colombie, Venezuela.

*smaragdinipectus*, GOULD.

*Godini*, BOURCIER. — Équateur.

*sapphiropyga*, TACZANOWSKI. — Pérou.

*nigrivestis*, BOURCIER et MULSANT. — Équateur.

(Sous-genre *Nunia*.)

*cupreiventris*, FRASER. — Colombie.

*Luciani*, BOURCIER et MULSANT. — Équateur.

*mosquera*, BOURCIER et DELATTRE. — Colombie.

*chrySORAMA*, ELLIOT. — Équateur.

(Sous genre *Threptria*.)

*Aureliae*, BOURCIER et Mulsant. — Colombie, Équateur.

*russata*. (an *Aureliae* var. ?) GOULD. — Équateur.

*lugens*, GOULD. — Équateur.

*squamata*, GOULD. — Équateur.

(Sous-genre *Phloe.*)

*Dyselina*, ELLIOT. — Équateur.

(Sous-genre *Erebenna.*)

*Dorbyana*, DELATTE et BOURCIER. — Colombie.

THROISIÈME BRANCHE : LES AGLÉACTAIRES

Genre *Aglaeactis*, GOULD.

*cupreipennis*, BOURCIER et Mulsant. — Nouvelle Grenade, Équateur, Pérou.

Var. *olivaceo-cauda*, LAWRENCE.

Var. *aequatorialis*, GOULD.

Var. *parvula*, GOULD.

*caumatonota*, GOULD. — Pérou.

*Castelnaudi*, BOURCIER et Mulsant. — Pérou.

*Pamela*, LAFRESNAYE et d'ORBIGNY. — Bolivie.

QUATRIÈME BRANCHE : LES THALURANIAIRES

Genre *Hylonympha*, GOULD.

*macroura*, GOULD. — Brésil.

Genre *Thaluranina*, GOULD.

*hypochlora*, GOULD. — Équateur.

*glaucopis*, GMELIN. — Brésil.

*Luciae*, LAWRENCE. — Îles des Trois-Maries.

*Watertoni* (LODDIGES), BOURCIER. — Guyane anglaise.

*refulgens*, GOULD. — Trinité.

*columbica*, BOURCIER et Mulsant. — Colombie, Venezuela, Costa-Rica.

Var. *venusta*, GOULD.

*furcata*, GMELIN. — Cayenne.

*furcatoides*, GOULD. — Amazone inférieur.

Var. *subfurcata*.

*nigrofasciata*, GOULD. — Équateur, Pérou.

Var. *Tschudii*, GOULD.

Var. *viridipectus*, GOULD.

*jelskii*, TACZANOWSKI. — Pérou.

*eriphile*, LESSON. — Brésil, vallée de l'Amazone.

Var. *verticeps*, GOULD.

Var. *Fanniae*, GOULD.

*Wagleri*, LESSON. — Brésil.

(Sous-genre *Timolia*.)

*Lerchi*, Mulsant et Verreaux. — Colombie.

#### CINQUIÈME BRANCHE : LES HÉLIANGÉLAIRES

Genre *Heliangelus*, GOULD.

*Clarissae*, LONGUEMARE. — Colombie.

*Strophianus*, GOULD. — Équateur.

*Spencei*, BOURCIER. — Venezuela.

*smaragdularis*, GOULD. — Colombie.

Genre *Peratus*, Mulsant.

*amethysticollis*, LAFRESNAYE et d'ORBIGNY. — Pérou.

*mavors*, GRAY et MITCH. — Colombie.

Genre *Helymus*, Mulsant.

*micraster*, GOULD. — Équateur.

Genre *Heliotrypha*, GOULD.

*Parzudakii*, LONGUEMARE. — Colombie et Équateur.

*viola*, GOULD. — Équateur.

## SIXIÈME BRANCHE : LES UROSTICTAIRES

Genre *Urosticta*, GOULD.

- Benjamini*, BOURCIER. — Équateur.  
*rufocrissa*, LAWRENCE. — Équateur.

## SEPTIÈME BRANCHE : LES ADÉLOMYAIRES

Genre *Lavana*, MULSANT.

- Hedwigae*, TACZANOWSKI. — Pérou.

Genre *Urolampra*, CABANIS et HEINE.

- cupreicauda*, GOULD. — Bolivie.  
*aeneicauda*, GOULD. — Bolivie.  
*primolina*, BOURCIER. — Équateur.

Var. ? *chloropogon*, CABANIS et HEINE.

- Williami*, BOURCIER et DELATRE. — Colombie.

Genre *Metallura*, GOULD.

- thyriantina*, LODDIGES. — Venezuela, Colombie, Équateur.  
*smaragdinicollis*, LAFRESNAYE d'ORBIGNY. — Bolivie, Pérou.

Genre *Anthocephala*, GOULD.

- floriceps*, GOULD. — Colombie

Genre *Adelomya* (BONAPARTE).

- melanogenys*, FRASER. — Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou.  
*cervina*, GOULD. — Colombie.  
*chlorospila*, GOULD. — Équateur, Pérou.  
*inornata*, GOULD. — Bolivie.

## HUITIÈME BRANCHE : LES MICROCHÉRAIRES

Genre *Microchera*, GOULD.

- albocoronata*, LAWRENCE. — Nouvelle-Grenade.

*purvirostris*, LAWRENCE. — Costa-Rica, Nicaragua.

Genre *Klais*, REICHENBACH.

*Guimeti*, BOURCIER et Mulsant. — Venezuela, Colombie.

Var. *Meritti*, LAWRENCE.

Genre *Baucis*, REICHENBACH.

*Abeillei*, DELATRE et LESSON. — Mexique, Amérique centrale,  
Nouvelle-Grenade.

NEUVIÈME BRANCHE : LES SCHISTAIRES

Genre *Augastes*, GOULD.

*lumachellus*, LESSON. — Brésil.

*superbus*, VIELLOT. — Brésil.

Genre *Schistes*, GOULD.

*personatus*, GOULD. — Équateur.

Var. *albigularis*, GOULD.

*Geoffroyi*, BOURCIER et Mulsant. — Colombie.

**Deuxième Tribu : les LOPHORNIENS**

PREMIÈRE DIVISION

PREMIÈRE BRANCHE : LES EUPOGONAIRES

Genre *Ramphomicron*, BONAPARTE.

*microrhynchus*, BOISSONNEAU. — Colombie, Équateur.

*Stanleyi*, BOURCIER et Mulsant. — Équateur.

Var. *Vulcani*, REICHENBACH.

*heteropogon*, BOISSONNEAU. — Colombie.

*olivaceus*, LAWRENCE. — Bolivie.



Genre *Eupogonus*, MULSANT.

*Herrani*, DELATTRE et BOURCIER. — Équateur, Colombie.  
*ruficeps*, GOULD. — Bolivie.

Genre *Oreonympha*, GOULD.

*nobilis*, GOULD. — Pérou.

DEUXIÈME BRANCHE : LES OXYPOGONAIRES

Genre *Oxypogon*, GOULD.

*Guerini*, BOISSONNEAU. — Colombie.  
*Lindeni*, PARZUDAKI. — Venezuela, Nouvelle-Grenade.

DEUXIÈME DIVISION

TROISIÈME BRANCHE : LES BELLONAIRES

Genre *Cephallepis*, LODDIGES.

*Delalandii*, VIEILLOT. — Brésil méridional.  
*Loddigesi*, GOULD. — Brésil méridional.  
*Beskii*, PELZELN. — Brésil.

Genre *Bellona*, MULSANT.

*cristata*, LINNÉ. — Ile Saint-Vincent, Barbade.  
*exilis*, GMELIN. — Petites-Antilles.

Genre *Telamon*, MULSANT.

*Delattrei*, LESSON. — Amérique centrale.  
*regulus*, GOULD. — Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie.  
*reginae*, SCHREIBERS. — Amazone.

Genre *Paphiosa*. — MULSANT.

*Helenaë*, DELATTRE. — Mexique, Guatemala et Nouvelle-Grenade.

## QUATRIÈME BRANCHE : LES LOPHORNAIRES

Genre *Dialia*, Mulsant.

*adorabilis*, SALVIN. — Volcan de Chirigui.

Genre *Idas*, Mulsant.

*magnificus*, VIEILLOT. — Brésil.

Genre *Lophornis*, Lesson.

*ornatus*, LESSON. — Trinité, Guyane, nord du Brésil, Venezuela.

*Gouldi*, LESSON. — Équateur.

## CINQUIÈME BRANCHE : POLÉMISTRIAIRES

Genre *Aurinia*, Mulsant.

*Verreauxi*, BOURCIER et Mulsant. — Parties supérieures de l'Amazonie, Colombie.

Genre *Polemistria*, Cabanis et Heine.

*chalybaeus*, VIEILLOT. — Brésil.

## Troisième Tribu : les LESBIENS

## PREMIÈRE BRANCHE : LES PRIMNACANTHAIRES

Genre *Tricholopha*.

*Popelairii*, du Bus. — Colombie, Équateur.

Genre *Primnacantha*, Cabanis et Heine.

*Langsdorffi*, VIEILLOT. — Brésil, parties supérieures de l'Amazonie, bords du Napo.

*Conversi*, BOURCIER et Mulsant. — Équateur, Colombie, Veragua, Costa-Rica.

Genre *Mytina*, MULSANT.

*laetitia*, BOURCIER et MULSANT. — Bolivie.

DEUXIÈME BRANCHE : LES PLATURAIRES

Genre *Tilmatura*.

*Duponti*, LESSON. — Guatemala.

Genre *Platura*, LESSON.

*mirabilis* (LODDIGES), BOURCIER. — Pérou.

Genre *Discura*, BONAPARTE.

*longicauda*, GMELIN. — Brésil, Guyanes.

Genre *Steganura*.

*Underwoodi*, LESSON. — Colombie, Venezuela.

*melananthera*, JARDINE. — Équateur.

*solstitialis*, GOULD. — Équateur.

Genre *Himalia*, MULSANT.

*peruana*, GOULD. — Pérou.

*Addae*, BOURCIER. — Bolivie.

Genre *Uralia*, MULSANT et VERREAUX.

*scissura*, GOULD. — Pérou.

TROISIÈME BRANCHE : LES LESBIAIRES

Genre *Cynanthus*, SWAINSON.

*cyanurus*, STEPHENS. — Colombie, Venezuela, Équateur.

Var. *coelestis*, GOULD.

*mocoa*, DELATRE et BOURCIER. — Équateur.

Genre *Sapho*, LESSON.

*sparganurus*, SHAW. — Bolivie, République argentine.

*Phaon*, GOULD. — Bolivie, Pérou.

Genre *Lesbia*, LESSON.

*Amaryllis*, BOURCIER et Mulsant. — Colombie, Équateur, Pérou.

Var. *Victoriae*, BOURCIER et Mulsant.

*Eucharis*, BOURCIER et Mulsant. — Colombie.

*nana*, LESSON. — Pérou.

*Gouldi*, BOURCIER. — Colombie.

*gracilis*, GOULD. — Équateur.

*Ortoni*, LAWRENCE. — Équateur.

Genre *Cometes*, GOULD.

*glyceira*, GOULD. — Nouvelle-Grenade.

*Caroli*, BOURCIER. — Pérou.

### Quatrième Tribu : les ORNYSMIENS

#### PREMIÈRE DIVISION

##### PREMIÈRE BRANCHE : LES HÉLIACTINAIRES

Genre *Heliactin*, BOIÉ.

*cornuta*, PR. de WIED. — Brésil.

Genre *Thaumastura* (BONAPARTE).

*cora*, LESSON. — Pérou occidental.

#### DEUXIÈME DIVISION

##### DEUXIÈME BRANCHE : LES AMALASIAIRES

Genre *Amalasia*, Mulsant.

*enicura*, Vieillot. — Guatemala.

*Elizae*, LESSON. — Mexique méridional.

Genre *Rhodopis*, REICHENBACH.

*vesper*, LESSON. — Pérou occidental.

*atacamensis*, GOULD. — Chili.

Genre *Calothorax*, G. R. GRAY.

*lucifer*, SWAINSON. — Mexique.

Genre *Manilia*, MULSANT.

*pulchra*, GOULD. — Chalchicomula, Oaxaca (Mexique).

Genre *Myrtis*, REICHENBACH.

*Fannyae*, LESSON. — Pérou, Équateur.

TROISIÈME BRANCHE : LES DORICHAIRES

Genre *Doricha*, REICHENBACH.

*Evelynae*, BOURCIER. — Ile de Bahama.

*Briantae*, LAWRENCE. — Costa-Rica, Veragua.

*lyrura*, GOULD. — Ile de Bahama.

QUATRIÈME BRANCHE : LES CALLIPHLOXAIRES

Genre *Calliphlox*.

*amethystinus*, GMELIN. — Trinité, Cayenne, Brésil.

Genre *Philodice*, MULSANT.

*Mitchelli*, BOURCIER. — Équateur, partie méridionale de la Nouvelle-Grenade.

CINQUIÈME BRANCHE : LES ORNISMYAIRES

Genre *Ornismya*, LESSON.

*colubris*, LINNÉ. — New-York, la Caroline, le Mexique.

(Sous-genre *Archilochus*.)

*Alexandri*, BOURCIER et MULSANT. — La Californie, le nord du Mexique.

Genre *Leucaria*, MULSANT.

*Costae*, BOURCIER. — Le Mexique, la Californie méridionale.

## SIXIÈME BRANCHE : LES CALYPTAIRES

Genre *Calypte*, GOULD.

*Annae*, LESSON. — Mexique, Californie.

*Helenae*, LAMBEYE. — Cuba.

Genre *Stellura*, GOULD.

*Calliope*, GOULD. — Mexique, Californie.

## SEPTIÈME BRANCHE ; LES MELLISUGAIRES

Genre *Mellisuga*, BRISSON.

*minima*, LINNÉ. — Jamaïque, Saint-Domingue.

## HUITIÈME BRANCHE : LES SÉLASPHORAIRES

Genre *Atthis*, REICHENBACH.

*Heloisae*, LESSON et DELATTRE. — Cordova, Oaxaca (Mexique), Guatemala (Amérique centrale.)

Genre *Selasphorus*, SWAINSON.

*platycercus*, SWAINSON. — Mexique, Guatemala.

*flammula*, SALVIN. — Costa-Rica, Veragua.

*torridus*, SALVIN. — Veragua.

*Floresii*, GOULD. — Mexique.

*ardens*, SALVIN. — Veragua.

*scintilla*, GOULD. — Costa-Rica, Veragua.

*rufus*, GMELIN. — Mexique, Californie.

## NEUVIÈME BRANCHE : LES ACESTURAIRES

Genre *Eudusia*, Mulsant.

*Yarelli*, Bourcier. — Bolivie, Pérou oriental.

Genre *Myrmia*, Mulsant.

*micrura*, Gould. — Bolivie.

Genre *acestura*, Gould.

*Mulsanti*, Bourcier. — Colombie, Équateur, Pérou.

*Heliodori*, Bourcier. — Venezuela, Colombie.

Genre *Chaetocercus*, G.-R. Gray.

*Jourdani*, Bourcier. — Trinité.

*Rosae*, Bourcier et Mulsant. — Venezuela.

*bombus*, Gould. — Équateur.

# CATALOGUE DES OISEAUX-MOUCHES

## CORRIGENDA

Page 208 :

Après le genre *Eucephala*, mettez :

Genre *Timolia*, Mulsant.

*Lezchi*, Mulsant et Verreaux. — Colombie.

(A supprimer, page 219.)

Page 213 :

Genre *Eugenes*, Gould.

{ *fulgens*, Swainson. — Mexique, Guatemala.

{ ♀ *spectabilis*, Lawrence.

Page 216 :

Après le genre *Helianthea*, mettez :

Genre *Saturia*, Mulsant.

*Isaacsoni*, Parduzaki. — Nouvelle-Grenade.

(A supprimer, page 217.)

Page 219 :

Genre *Heliangelus*,

Supprimez : *smaragdicularis*.

Page 219 :

Après le genre *Helymus*, mettez :

Genre *Nodalia*, Mulsant.

{ *Barrali*, Mulsant et J. Verreaux. — Colombie.

{ *squamigularis*, Gould.

Page 220 :

Après *Williami*, ajoutez :

*quitensis*, Gould. — Équateur.

Page 222 :

Après DEUXIÈME DIVISION, mettez :

PREMIÈRE SECTION.

Page 222 :

Après *exilis*, GMELIN, mettez :

DEUXIÈME SECTION.

QUATRIÈME BRANCHE.

LES TÉLAMONAIRES.

Genre *Telamon*.*Delattrei*, LESSON. — Amérique centrale.*strictilophus*, SALVIN et ELLIOT. — Amazone.

CINQUIÈME BRANCHE.

LES LOPHORNAIRES.

Page 223 :

A la place de CINQUIÈME BRANCHE, mettez :

SIXIÈME BRANCHE.

Page 224 :

A la place de genre *Platura*, mettez :Genre *Loddigesia*, MATTHEWS.

Page 224 :

Au lieu de genre *Sapho*, mettez :Genre *Cometes*, GOULD.

Page 225 :

Après *phaon*, mettez :Genre *Zodalia*, MULSANT.*Ortoni*, LAWRENCE. — Équateur.*Glyceria*, GOULD. — Nouvelle-Grenade.

(A supprimer plus bas.)

Page 225 :

Après *gracilis*, mettez :Genre *Leobia*, MULSANT.*Caroli*, BOURCIER. — Pérou.