

Комиссия по изучению сурков при Териологическом обществе РАН
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт
Администрация Кемеровской области
Центр трансфера технологий СФО



СУРКИ В АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ ЕВРАЗИИ

Тезисы докладов
IX Международного Совещания по суркам стран СНГ

Россия, г. Кемерово, 31 августа – 3 сентября 2006 г.

Кемерово
2006

религиозных канонов, способствовала выработке воли воинов (мужчин, юношей), стойкости к боли, крови и жестокости по отношению к себе и окружающим, что, конечно, немаловажно при военных действиях.

Направление движения воинов Чингиз хана также было заранее предсказано в этой легенде. Надо идти на Запад, за солнцем и догонять ласточку и солнце, т.е. - к победе! Что и было исполнено. Об этом свидетельствует история.

4. Легенды и предания в древней этнической истории имели немаловажное значение. В настоящее время теле-, видео-, радио- и другие средства массовой информации по другому воздействуют на сознание и психику, но и в них жестокость, голый антропоцентризм неприемлем. Возможно, он порождает в психике и в сознании корни жестокости, терроризма.

Литература: Димитриев А.В. Предварительный анализ одной монгольской легенды о тарбагане / А.В. Димитриев, Ж. Батбольд, Б.Б. Бадмаев, А.И. Олигер // Экологический вестник Чувашской Республики. Выпуск 24. – Чебоксары, 2001. - С.38-40.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ СУРКОВ В РЕЛИКТОВОЙ БАТЫРЕВСКОЙ КОЛОНИИ ДО ЗАПОВЕДАНИЯ

Addition data on number dynamics of marmots in Batyrevsk relict colony before
reserving

А.В. Димитриев, А.С. Иванов, Ю.В. Сергеев, Ю.Н. Кузюков

A.V. Dimitriev, A.S. Ivanov, Yu.V. Sergeev, Yu.N. Kuzyukov

*Государственный природный заповедник "Присурский", prisur@chtt.ru
Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике*

Батыревская реликтовая сурковая колония на территории Чувашии, сохранившаяся в годы депрессии популяции сурков, представляет большой интерес для науки. Она была объявлена заказником в 1961 г., в 2000 г. - присоединена к заповеднику "Присурский". Нами восстановлена динамика численности сурков колонии с 30-х годов прошлого века по 2005 г. Часть этих материалов ранее была опубликована (Теплов, Тихвинский, 1936; Кулик и др., 1963, Хрущевский, Сергеев, 1983; Дежкин и др., 1983; Дежкин, 1983, 1985; Хрущевский, 1988; Димитриев, 2001; Димитриев и др., 1997, 2005, Dimitriev et al., 1997, 2005). Но в ранее опубликованных материалах было достаточно много пробелов.

В настоящее время получены дополнительные материалы по динамике численности сурков Батыревской колонии за время существования заказника с 1968 по 1997 гг., которые хранились в архивах бывшего Управления охотничьего хозяйства Чувашской Республики и переданы заповеднику "Присурский" (таблица).

Таблица

Динамика численности сурков Батыревского суркового заказника с 1968 по 1997 гг. по данным Управления охотничьего хозяйства Чувашской Республики

Годы	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
Количество голов	Н.д.	21	24	31	37	41	46	42	40/38*
Количество жилых нор	14	6	6	7	7	8	7	11	12
Годы	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Количество голов	48	40	34/ 16	22	8/18/1 2	33/ 28	23/ 29	28/ 31	25/20/ 21
Количество жилых нор	Н.д.	Н.д.	Н.д.	Н.д.	Н.д.	Н.д.	Н.д.	Н.д.	Н.д.
Годы	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Количество голов	20/ 23	40	42	51/ 56	48	50	51	47	52
Количество жилых нор	Н.д.	8	8	18	16	Н.д.	Н.д.	Н.д.	Н.д.
Годы	1995	1996	1997						
Количество голов	46	40	44						
Количество жилых нор	Н.д.	Н.д.	Н.д.						

Примечание: * - данные учетов, проведенных в разные сроки.

Суровая зима 1978/1979 гг. способствовала в какой-то мере снижению численности сурков. 1981 г. для сурков был критическим, они плохо перезимовали, весной из нор вышли всего 8 сурков. В 1982 г. завезено в колонию из Ульяновской области 20 сурков.

РЕЛЬЕФ СУРЧИН

Relief of marmot's burrow

П.П. Дмитриев
P.P. Dmitriev

*Биологический факультет Московского государственного университета,
ppd@mail333.com*

В Северной Америке описаны положительные формы рельефа, так называемые «мима-бугры (mima-mounds)», связанные с роющей деятельностью гоферов (Dalquest, Scheffer, 1942). Наличие их предполагали и в Сибири, ссылаясь на монографию С.А. Огнева.