

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937
 des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
 REUNIES
 et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})

Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6^e)

ABONNEMENT ANNUEL C. C. P. Lyon 101-98	{	France et Colonies Françaises	500 francs
		Etranger	600 —

CATALOGUE DES CURCULIONIDES DE LA REGION LYONNAISE

par G. AUDRAS et L. SCHAEFER
avec la collaboration de A. HOFFMANN
(suite).

273. *C. quercus* F. (*dryados* Gm.).
Rh.: St-Laurent-de-Vaux (GN), Chaponost (A), Lentilly (A; S), Charbonnières (S). — Ain: Le Plantay (GU), Lent (A). — Is.: bois de Cornavent (F).
274. *C. ilicis* Bedel.
Env. Lyon (REY). Rh.: Mt Ceindre, 4-1928 (R). — Ain: Bugey (REY), Neyron, 4-1927 (R), Crépieux (S). — Is.: Vienne (F).
275. *Centrorrhynchidius horridus* Panz.
Is.: Vienne (F).
276. *C. rufulus* Duf.
Rh.: Villié-Morgon (REY), Montessuy (RI), Ecully, Montagny (A). — Ain: Charnoz (GU).
277. *C. troglodytes* F.
C partout.
278. *Ceuthorrhynchus terminatus* Herbst.
Rh.: Montagny (RO). — Ain: Les Echets (RO).
279. *C. mixtus* Muls.
Ain: Valbonne (GU).
280. *C. quercicola* Payk.
Rh.: La Villardière (J), St-Genis-Laval (H), Ecully (A). — Ain: Charnoz (GU), Lent (A). — Is.: Vienne (F).
Cécidogène aux dépens de *Fumaria officinalis* (F, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1922, p 224).
281. *C. nigrinus* Marsh.
Rh.: St-Genis-Laval (GN), St-Didier (R), Ecully, Chaponost (A), Montagny (VI). — Ain: St-Rambert (A). — Is.: Vienne (F).
282. *C. floralis* Payk.
C partout.
283. *C. pyrrhorhynchus* Marsh.
Rh.: St-Didier, 7-1931, St-Cyr, 7-1931, Les Echarmeaux, 8-1932 (R). — Ain: Le Plantay (GU).
284. *C. posthumus* Germ.
Rh.: Givors (RO), Brignais (PN), Lentilly (A; S). — Ain: Le Plantay (GU), St-Rambert (A), Lent (A; S). — L.: Malleval (S).
285. *C. micans* Bris.
Rh.: Ecully (A, det. HOFFMANN). Répandu surtout dans le midi. Remonte jusqu'aux env. de Paris où il n'est pas rare sur *Senebiera coronopus* (HOFFMANN).
286. *C. viduatus* Gyll.
Env. de Lyon (REY). — Ain: Bugey (REY), Gévrioux, Le Plantay (GU), Fontaine-sur-Saône (J), Les Hôpitaux (A). — Is.: Décines (S).
287. *C. pubicollis* Gyll.
Ain: Le Plantay (GU), Tramoyes (J).
La var. *continuus* Rey est décrite du Bugey.
288. *C. signatus* Gyll.
Env. Lyon (REY). Rh.: St-Genis-Laval (H), Chaponost (S). — Ain: Bugey (GU), vallon de la Cadette, sur *Stachys recta* (GRILAT).
289. *C. geographicus* Goeze.
Répandu dans le Rh. et l'Ain sur la Vipérine.
290. *C. symphyti* Bedel.
Rh.: St-Laurent d'Agny, commun (R. DUMONT). — Is., d'après H.
291. *C. angulosus* Boh.
D'après H dans le Bugey et l'Is.
292. *C. cruciger* Herbst.
Ain: Valbonne, Châteauguillard (GU).
293. *C. larvatus* Schultze.
Env. de Lyon (H). Rh.: Brignais (MORTAMET). — Ain: Bugey (GU).
294. *C. litura* F.
Rh.: répandu dans les Monts du Lyonnais sur *Cirsium arvense*, notamment à Châteaueuville, Yzeron (MÉQUIGNON, HOFFMANN, SICARD). — Is., d'après H.

295. **C. trimaculatus** F.
Lyon (REY, *L'Ech.*, 1895).
296. **C. asperifoliarium** Gyll.
Rh. : St-Germain (A), Ampuis (S). — Ain : Le Plantay, Bugey (GU), St-Rambert, Cerdon (A).
297. **C. pallidicornis** Bris.
Env. de Lyon (RO). Rh. : Tour-de-Salvagny (J), St-Genis-Laval, Brignais (H).
298. **C. albosignatus** Gyll.
Rh. : Irigny, St-Genis-Laval (H). — Is. : Vienne (GA). — Ain : St-Rambert (A).
299. **C. euphorbiae** Bris.
Env. de Lyon (REY). Rh. : Beaujolais (REY), St-Genis-Laval (H), Château-gaillard (GU), Charbonnières (S) — Ain : Les Echets, Beynost (J). — Is. : Décines (J).
300. **C. campestris** Gyll.
Rh. : Montagny, Charbonnières (S), Craponne (VI). — Ain : Le Plantay (GU), Lent (A), Les Echets (VI). — Is. : Vienne (F).
301. **C. triangulum** Boh.
Ain : Le Plantay (GU), Lent (A).
302. **C. chrysanthemi** Gyll.
Lyon, d'après H. — Ain : Le Plantay, Bugey (GU).
s. sp. *rugulosus* Herbst. — Ain : Bugey, Le Plantay (GU), Cordieux (A).
303. **C. melanostictus** Marsh.
Env. de Lyon (RO). Rh. : Tour-de-Salvagny (RI). — Ain : Valbonne, Bugey, Le Plantay (GU), St-Rambert, Lent (A), Miribel (S). — Is. : La Verpillière (VI).
304. **C. arquatus** Herbst.
Rh. : Charbonnières (S). — Ain : Le Plantay (GU), Les Echets (RO), Lent (A). — Is. : Pusignan (RI), étang de Ry (R, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1934, p. 45).
305. **C. pollinarius** Forst.
Rh. : Montessuy (RI), Dardilly (VI). — Ain : Le Plantay, Bourg (GU), Lent, St-Rambert (A), Les Echets (VI).
306. **C. dentatus** Panz.
Rh. : Clos Jouve (RI), Montessuy (R), St-Genis-Laval, 30-4-1930 (GN > VO), Pierre-Bénite, Vaulx-en-Velin (S). — Ain : Valbonne, Trévoux (GU).
307. **C. macula-alba** Herbst.
Rh. : St-Didier (ER), St-Genis-Laval (GN), Montessuy (RI), Ecully, Yzeron, Lentilly (A). — Ain : Valbonne (GU), St-Rambert, Cerdon (A). — Is. : Péage-de-Roussillon (F).
308. **C. marginatus** Payk.
Rh. : Brignais (GN), St-Didier (R), col de Malval (S). — Ain : Le Plantay (GU). — Is. : Vienne (F).
ab. *distinctus* Bris. — Ain : St-Rambert (A).
309. **C. punctiger** Gyll.
Rh. : St-Didier (R), Ecully (A), Lentilly (S). — Ain : Le Plantay (GU). — Is. : Vienne (F).
310. **C. Moelleri** Thoms. (*rotundatus* Bris.).
Rh. : Villié-Morgon (REY). — Ain : Bugey (REY), Le Plantay (GU ; coll. J).
311. **C. suturalis** F.
Rh. : Montessuy (RI), St-Genis-Laval (GN ; D), Montagny (GN). — Ain : St-Rambert (A). — Is. : Décines (RO).
312. **C. consputus** Germ.
Env. Lyon (RO). Rh. : La Merlinche (RO), St-Didier, St-Cyr, Montessuy (R), Montagny (A), Francheville (VO), Chassagny (VI). — Ain : St-Rambert (A). — Is. : Vienne (F), Solaize (A).
313. **C. pleurostigma** Marsh.
C partout sur les Crucifères.
314. **C. Roberti** s. sp. *alliariae* Bris.
Env. de Lyon (RO). Rh. : Salvagny, Oullins (J), Pierre-Bénite (GN), Irigny, St-Genis-Laval (H), St-Didier, sur *Alliaria officinalis* (R), Ecully (A), St-Germain-Mt-d'Or (A ; S), Ampuis (S). — Is. : Solaize (A).
315. **C. griseus** Bris.
Env. de Lyon (RO). Rh. : Givors (J), Brignais (H), Le Garon (SERULLAZ), Montessuy, 6-1932 (R), Ecully (A). — Ain : Lent (A), Valbonne, Villebois, Le Plantay (GU). — Is. : Décines (J).

316. *C. napi* Gyll.
Rh.: Ecully (A), Lentilly (S), St-Genis-Laval (D). — Ain: Villebois, Le Plantay, Valbonne (GU), Miribel (S). — Is.: Sérézin (VI).
317. *C. assimilis* Payk.
Rh., Ain, Is. C sur les Crucifères.
318. *C. rapae* Gyll.
Rh.: Montagny (GN).
319. *C. inaeffectatus* Gyll.
Lyon (REY). — Ain: Bugey (GU).
320. *C. syrites* Germ.
Rh.: Lyon (REY), Villefranche (HOFFMANN).
321. *C. constrictus* Marsh.
Rh.: Givors (RO), St-Didier (R), Montagny (S). — Ain: Le Plantay (GU), La Pape, Beynost (R), St-Rambert (A), Crépieux (VI). — Is.: Vienne (F), Solaize (A).
322. *C. cochleariae* Gyll.
Env. Lyon (RO; F). Rh.: St-Genis-Laval (GN), St-Didier, Dardilly (R), Ecully (A), Charbonnières (A; S), Lentilly (S), Montagny (VI). — Ain (GU), Lent (A; S), St-André-de-Corcy (VI).
323. *C. Schönherri* Bris.
Lyon (type). Rh.: Oullins (J), Chaponost (P).
324. *C. nanus* Gyll.
Rh. (d'après H), Montagny 5-1947 (S). — Ain: Villebois, Le Plantay (GU).
325. *C. resedae* Marsh.
Rh.: Oullins, Yzeron (J), St-Genis-Laval, Irigny (H). — Ain: Valbonne (GU). — Is.: Décines (J).
326. *C. fulvitaris* Bris.
Rh.: St-Cyr, 26-5-1935 (R), Ecully (A). — Is.: Vienne (F).
327. *C. atomus* Boh.
Rh.: Courzieu (RO), St-Genis-Laval (GN), Ecully (A), Charbonnières, Lentilly (S). — Ain: Le Plantay (GU), La Pape (R), Crépieux-les-Brosses (S), Les Hôpitaux (A). — Is.: Vienne (F). — L., d'après H.
328. *C. carinatus* Gyll.
Env. Lyon (H). — Ain: Châteauguillard (GU). — Rh.: Lentilly (A).
329. *C. quadridens* Panz.
Rh.: St-Cyr (R), Ecully (A), Charbonnières, Lentilly, Pierre-Bénite (S), Curis (coll. SPV). — Ain: Le Plantay (GU), St-Bernard (VI). — Is.: Vienne (F).
330. *C. picitarsis* Gyll.
Rh.: St-Genis-Laval (GN), St-Didier (R), Ecully, Montagny (A). — Ain: Le Plantay (GU), Miribel (S), Les Echets (VI).
331. *C. sulcicollis* Payk.
Rh.: Montagny (RO), Lentilly (A; S), Thurins (S). — Ain: Le Plantay (GU), St-Rambert (A).
332. *C. scapularis* Gyll.
Env. Lyon (J). Rh.: St-Genis-Laval (H). — Ain: Bourg (GU), Les Hôpitaux (A).
333. *C. barbareae* Suff.
Ain: Bugey (GU), St-Rambert (A).
334. *C. pervicax* Weise.
Ain: Le Plantay (GU), St-Rambert (A).
335. *C. erysimi* F.
Rh., Ain, Is. C sur les Crucifères. Eclos de *Capsella bursa-pastoris* (F, *Bull. Soc. Ent.*, 1930, p. 149).
336. *C. contractus* Marsh.
Rh., Ain. — L.: Pilat (F), Malleval (S).
337. *C. hirtulus* Germ.
Rh. St-Genis-Laval (RI; GN, 8-6-1930), Ecully (A).
v. *varius* Rey. — Lyon, type; St-Genis-Laval (D).
338. *C. chalybaeus* Germ. v. *aeneomicans* Pic.
Lyon, type. Rh.: Givors (RO), Vaugneray (H), Ecully (A). — Ain: Le Plantay (GU), Cerdon (A). — Is.: Décines (H).
v. *timidus* Weise. — Rh.: Montagny (RO). — Is.: Décines (J).
v. *moguntiacus* Schultze. — Rh.: Chaponost (S, det. HOFFMANN).

- Nous n'avons pas de citations concernant spécialement la forme typique *chalybaeus* Germ. à élytres bleus, mais elle existe vraisemblablement dans la région.
339. **C. pectoralis** Schultze.
Lyon (REY). — Ain : Lent (S).
240. **C. laetus** Rosenh.
Rh. : Couzon (RO), Pierre-Bénite (GN), Beaunant (H). — Is. : Vienne (F).
341. **Orobitis cyaneus** L.
Rh. : St-Cyr, 15-4-1934 (R). — Ain : Le Plantay, Bugey (GU), Cerdon (A). — Is. : Décines (RI).
342. **Coryssomerus capucinus** Beck.
Rh. : Yvours (F), Ecully (A), Charbonnières (S). — Ain : Le Plantay, Bugey (GU), Lent (A).
343. **Sitophilus granarius** L.
Partout dans les grains de blé, seigle, etc.
344. **S. oryzae** L.
Partout dans les grains de riz, maïs, etc., le pain, les pâtes alimentaires. Sur fleurs de Lierre (R).
345. **Calandra** (= *Sphenophorus*) **picea** Pail. et v. **rubida** Rey.
Rh. : Lyon (REY), Montessuy (RI), Lyon-Vaise (A). — Ain : Le Plantay (GU), Beynost (CH).
346. **C. striatopunctata** Goeze.
Répandu dans le Rh. et l'Ain.
347. **Baris analis** Ol.
Rh. : Champagne, 30-5-1946 (R). — Ain : Villebois (GU).
348. **B. morio** Boh.
Rh. : Gerland (RI), Lyon St-Alban (R), Vaulx-en-Velin, Chaponost, Grézieu-la-Varenne, Montagny (S). — Ain : Miribel (S). — Is. : Molard de Décines (R ; A).
Sur les Résédas.
349. **B. laticollis** Marsh.
C partout sur les Crucifères.
350. **B. cuprirostris** F.
Rh. : Ecully (A), Charbonnières, Pierre-Bénite (S), St-Rambert-Ile-Barbe (DE). — Ain : Bourg (GU), La Pape (RI), Thil (CH). — Is. : Vienne (F), La Tour-du-Pin (VI).
351. **B. lepidii** Germ.
Rh., d'après H. — Ain : Bourg, Le Plantay (GU).
352. **B. caeruleus** Scop. et v. **chloris** F.
Rh. : Lyon (RO ; PN), Brignais (GN), Ecully (A), Thurins (Hoffmann), Lentilly (A ; S), St-Genis-Laval (D), Francheville (VO), St-Rambert-Ile-Barbe (DE). — Ain : Le Plantay (GU), St-Rambert, Cerdon (A), Miribel (S). — Is. : Vienne (F). — L. : Pilat (F).
353. **B. picicornis** Marsh.
Rh. : Pierre-Bénite (GN), Gerland, Montessuy (RI), Ampuis (S). — Ain : Châteauguillard, Charnoz (GU), Miribel (S ; P), Les Hôpitaux (S ; VI). — Is. : Molard de Décines (R ; S), Solaize (A).
Au pied des Résédas.
354. **B. chlorizans** Germ.
Partout sur les Crucifères.
355. **Limnobaris T album** L.
C. dans le Rh., l'Ain, l'Is.
356. **L. pilistriata** Steph.
Rh. : Ecully, Charbonnières (A). — Ain : Lent (S). — Is. : Siccieu (R, cf. *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1934, p. 48), Décines (S).
357. **Balanus elephas** Gyll.
Rh. : Mercruy, Thurins, Charbonnières (S), Ecully (A), St-Genis-Laval (D), Francheville (VO), Messimy, Croix-Régis (VI), St-Rambert-Ile-Barbe (DE).
En battant les Châtaigniers en août et début septembre ; vient à la lumière.
358. **B. venosus** Grav.
Rh. : Limonest, Mt Narcel (R), Charbonnières, Thurins, Lentilly, col de Malval, Chaponost, Montagny (S), Yzeron (VI). — Ain : Lent (A), Crépieux (S), Les Hôpitaux (D), Les Echets (VI). — Is. : Vienne (F).
Sur les Chênes.
359. **B. pellitus** Boh.
Rh. : Lyon, quai de Serin, Mt Ceindre (R), St-Didier (S), Vaugneray (VI). —

Ain : Charnoz (GU), La Pape (RI), Crépieux (S); Pont de Chéry (DA).

Sur les Chênes.

360. **B. nucum** L.

Rh. : Orliénas (GN), Thurins (JJ ; S), Lyon (P), St-Didier (R ; S), col de Malval, Charbonnières (S), Francheville (VO), St-Genis-Laval (D). — Ain : Le Plantay (GU), St-André, Cerdon (A), Lent, Miribel, St-Marcel, Crépieux (S), les Allynes (VI). — Is. : Siccieu (CH).

Sur les Noisetiers.

361. **B. glandium** Marsh.

TC partout sur les Chênes.

362. **B. villosus** F.

Assez répandu sur les Chênes. Dans les galles de *Biorrhiza pallida* (F, Bull. Soc. Ent. Fr., 1927, p. 230).

363. **B. cerasorum** Payk.

Rh. : Les Charpennes (FO). — Ain : Le Plantay (GU), St-André-de-Corcy (VI).

364. **B. undulatus** Herbst.

Rh. : Vaugneray (GN), St-Genis-Laval (D). — Ain : Lent (A), St-André-de-Corcy (VI).

365. **Balanobius crux** F.

Rh., Ain, Is. Pas rare sur les Saules. Dans les galles de *Pontania vesicator* sur *Salix fragilis* (F, Bull. Soc. Ent. Fr., 1926, p. 132).

366. **B. salicivorus** Payk.

Rh., Ain, Is. C. sur les Saules.

367. **B. pyrrhoceras** Marsh.

R. : Lyon, Villié-Morgon (REY), Tassin (RI), Ecully, Limonest (A), Lentilly (A ; S ; P), Charbonnières (A ; S ; VO), Ampuis (S), Roche-St-Fortunat, Francheville (VI). — Ain : Charnoz (GU), Crépieux-les-Brosses, St-Marcel (S). — Is. : Vienne (F).

368. **Brachonyx pineti** Payk.

Rh. : Tour-de-Salvagny (RI), Lentilly à Mercruy (R ; P ; S ; D ; VO ; VI), Yzeron (A), col de Malval (S), col de la Fosse, Croix Régis (VI). — Ain : Chalamont, Balan, Meximieux (GU), Lent (S).

Sur *Pinus sylvestris*.

369. **Anthonomus rectirostris** L.

Rh. : Marcy (RI), Lentilly, Charbonnières, Thurins, col de Malval (S), Dardilly (VI), Tassin, mordillant feuille de Pêcher (BIANCHI). — Ain (GU), Neyron (RO), Cerdon, Lent, St-Rambert (A), Villars (S). — Is. : Décines (S).

Sur les Cerisiers sauvages, Merisiers, *Cerasus padus*...

370. **A. varians** Payk.

C partout sur les Pins, surtout en avril. Aussi sur Sapin au col de Malval (S). v. *melanocephalus* F. — Col de Malval (DA).

v. *perforata* Herbst. — L : Pilat (F).

371. **A. rubi** Herbst.

C sur la Ronce. Vit également dans les boutons floraux du Rosier à Tassin (BIANCHI).

La var. *brunneipennis* Curtis, à St-Genis-Laval (VASSEUR).

372. **A. pyri** Koll. (*cinctus* Redt.).

C partout. Très nuisible aux plantations de Poiriers. S'obtient facilement d'élevage en prélevant au premier printemps les bourgeons attaqués ; en battant les Poiriers dans la deuxième quinzaine de septembre.

373. **A. Chevrolati** Desbr.

Rh. : St-Didier, 20-10-1925, 1 ex. (R).

374. **A. bituberculatus** v. *inversus* Bedel.

Ain : Le Plantay (GU). A confirmer.

375. **A. pomorum** L.

Partout. Très nuisible aux Pommiers. S'obtient abondamment à partir des boutons floraux attaqués (clous de girofle) et en battant les Pommiers en avril.

376. **A. spilotus** Redt.

Rh. : St-Didier, St-Cyr (R), St-Genis-Laval (F ; GN ; R ; D), Ecully (A), Lentilly, Thurins (S). — Ain : Massieux (S).

Sur les Poiriers. Avril-juin.

377. **A. undulatus** Gyll.

Ain : Le Plantay (GU).

378. **A. pedicularius** L.
C dans les quatre départements. La s. sp. *conspersus* Rey est décrite de Lyon ; Charbonnières (HOFFMANN).
Sur l'Orme, les arbres fruitiers, le Prunellier, les Aubépines en fleurs...
379. **A. rufus** Gyll.
Ain : Trévoux (GU). — Is. : Vienne (F, vidit HOFFMANN). — Rh. : Charbonnières (A).
v. *pruni* Desbr. — Rh. : Brignais (GN). — Ain : Charnoz, Meximieux (GU), Lent (A).
380. **Bradybatus elongatulus** Boh.
Rh. : Ecully (A). — Ain : Les Hôpitaux (A).
381. **B. subfasciatus** Gerst.
Rh. : La Barolière (RI), Limonest (A), Montagny, commun sur *Acer campestre*, 4-1951 (S), St-Genis-Laval (D), Givors (VI). — Is. : étang de Ry, 4-1946, Maissonas (VI). — L. : Couzon (VI).
382. **Acalyptus carpini** F.
Rh. : Charbonnières, Chaponost (S). — Ain (GU), Lent (A ; S), St-Rambert (A), ile de la Pape, sur Saules (S). — Is. : Jonage (DA).
383. **Elleschus scanicus** Payk.
Ain : Le Plantay (GU), Lent (A).
384. **E. bipunctatus** L.
Rh. : Lentilly (A), Charbonnières (S). — Ain (GU), Lent (A ; S).
385. **E. infimus** Herbst.
Rh. : St-Genis-Laval (H).
386. **Sibinia sodalis** Germ.
Rh. : Chaponost (S, det. HOFFMANN). — Is., d'après H. — L. : Malleval (S).
387. **S. phalerata** Stev.
Rh. : Vaugneray (GN). — Ain : Villebois, Valbonne (GU), Lent (A). — Is. : Décines (RO ; S, det. HOFFMANN).
388. **S. primita** Herbst.
Rh. : Dardilly, 4-4-1948 (VI). — Ain : Le Plantay (GU), La Boisse, 13-4-1927 (R), Lent, St-Rambert (A). — Is. : Vienne (F).
389. **S. variata** Gyll.
Lyonnais, d'après HOFFMANN.
390. **S. potentillae** Germ.
Rh. : Lentilly (A), col de Malval (S). — Ain : Le Plantay, Trévoux, Bugey (GU), Lent, St-Rambert (A). — Is. : Vienne, bois de Cornavent (F). — L. : Pilat (F ; A). Eclis de capsules de *Spergularia rubra* (F, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1930, p. 149).
391. **S. subelliptica** Desbr.
R. : Ecully (A), Charbonnières (A ; S ; P), Montagny (A), Chaponost, Pierre-Bénite (S). — Is. : Vienne (F), Décines (RI), Bourgoin (S), Diémoz (VI).
Sur les *Dianthus*.
392. **S. pellucens** Scop.
Rh. : Yvours (A), Lyon (P), St-André-la-Côte (R), Chaponost, Montagny (S). — Ain : La Boisse (R), St-Marcel (VI). — Is. : Vienne (F), Solaize (A), Décines, St-Quentin-Fallavier (A).
v. *Roelofsi* Desbr. — Is. : Solaize (S).
393. **S. viscaria** L.
C dans le Rh., Ain, Is., avec la v. *lugdunensis* Desbr. sur les Caryophyllées. Dans les capsules de *Silena inflata* (F, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1930, p. 149).
394. **S. vittata** Germ. v. *indigena* Desbr.
Rh. : Montagny, sur *Dianthus carthusianorum*, 3-7-1939 (H), id. (A ; S). — Ain : Les Echets (GRILAT), Neyron (RI).
385. **S. attalica** s. sp. *tibiella* Gyll. (*densata* Rey).
Lyon, type de *densata*. Rh. : St-Genis-Laval, d'après HOFFMANN.
396. **Tychius quinquepunctatus** L.
Très répandu dans le Rh., l'Ain. — Is. : Jardin (VI).
397. **T. venustus** F.
Dans les quatre départements. Sur les Genêts.
398. **T. polylineatus** Germ.
Ain : Le Plantay (GU), Cerdon (A).
399. **T. Schneideri** Herbst.
Rh., Ain, d'après H. — Is. : Décines (RI).

400. *T. elegantulus* Bris.
Ain : Charnoz (GU).
401. *T. funicularis* Bris.
Lyon (REX). — Is. : Solaize, en face Vernaison (A, *Bull. Soc. Linn. Lyon*, 1939, p. 102).
402. *T. striatulus* Gyll.
Rh. : Irigny (GN), Montagny (A). — Ain : coteaux de Miribel, 2 juin (ER), Valbonne, Villebois (GU), Crépieux-les-Brosses (S). — Is. : Péage-de-Roussillon (F), Décines (S).
403. *T. argentatus* Chevr.
Rh., Is., d'après H.
404. *T. flavicollis* Steph.
Ain : Valbonne, Le Plantay (GU). — Is. : Décines (RO).
405. *T. aureolus* Kiesw.
Env. de Lyon (RO). Rh. : Montagny (A). — Ain : Valbonne (GU). — Is. : Solaize (A), St-Quentin-Fallavier (VI).
v. *femoralis* Bris. — Rh. : Couzon, 1 ex., 3-7-1932 (R).
406. *T. junceus* Reich.
Rh. : St-Genis-Laval (GN), Messimy (VI). — Ain : Valbonne (GU), Lent (A). — Is. : Décines (RI).
407. *T. micaceus* Rey.
Ain : Valbonne (GU).
408. *T. meliloti* Steph.
Env. Lyon (RO). Rh. : Couzon, St-Didier (R), Ecully (A), Montagny (S), Lyon Point-du-Jour (VO). — Ain : Le Plantay, Valbonne (GU), Les Hôpitaux (A; D).

(à suivre)

BIBLIOGRAPHIE

R. PAULIAN. — *Atlas des Larves d'Insectes de France*. — Nouvel Atlas d'Entomologie, n° 10, Editions N. Boubée et Cie, Paris, 1956 ; 222 p., 80 fig. dans le texte, 22 planches hors-texte, dont 4 en couleurs.

Donner dans un nombre restreint de pages une histoire naturelle de l'ensemble des larves d'Insectes était une entreprise hardie. Dans l'élégant ouvrage, qui vient de paraître, l'éminent entomologiste qu'est M. R. PAULIAN a eu le courage de la tenter.

De même que divers auteurs anglais et que A. LAMEERE, l'auteur a limité la désignation de « larves » aux stades jeunes d'Insectes présentant des transformations brusques (Holométabola) et à ceux qui évoluant progressivement vivent dans un élément différent de celui que fréquentent les individus sexués correspondants (Hémimétabola) ; les stades jeunes des groupes où il n'existe aucun changement de structure pendant toute l'existence (Protoures, Aptérygotes) ou (Orthoptères, Hémiptères, etc...) dont les transformations continues se passent dans le même milieu depuis l'œuf jusqu'au stade adulte (Paurométabola), ne sont pas pour lui des larves et il n'en est pas question dans le présent ouvrage.

Bien qu'il n'y ait aucune ressemblance entre un asticot, une chenille ornée de vives couleurs et un jeune fourmilion à abdomen presque sphérique et à mandibules formant une pince démesurée, des aspects très analogues peuvent se voir chez des larves appartenant à des groupes éloignés ; il est donc très difficile de trouver des caractères larvaires permettant de différencier les ordres, à plus fortes raison les familles et les genres. Actuellement ces distinctions n'ont pu être mises en évidence que dans quelques groupes ; l'auteur nous donne le résumé de ce qui a pu être fait à ce point de vue à l'époque actuelle. Différents tableaux dichotomiques, dont un pour les ordres et d'autres allant, suivant les cas, aux familles ou même parfois aux genres, facilitent les déterminations. Les dessins au trait et les planches représentent les formes les plus caractéristiques ; on peut toutefois regretter qu'il n'y ait pas plus de figures de larves d'Hyménoptères Symphytes.

Les débutants désireront probablement trouver dans le présent ouvrage des indications se rapportant à des larves particulièrement fréquentes ; il n'y a rien concernant spécialement bien des vulgarités, telles que les larves de la Teigne des fourrures (*Tineola biselliella* Humm.), du Bombyx de la ronce (*Macrothylacea*