

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

SECONDE SÉRIE

VI

1888 - 1893



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, rue de la République, 65.

1888



DOCUMENTS

POUR SERVIR A

L'HISTOIRE DE LA BOTANIQUE DANS LA RÉGION LYONNAISE

Par le D^r BONNET

§ I. — ANTOINE DE JUSSIEU.

Comme un monument de vastes proportions captive les regards de l'observateur désireux d'en scruter tous les détails, de même le mont Pilat a de tout temps fixé l'attention des botanistes de la région Lyonnaise ; mais, entre Du Choul qui fut, en 1555, le premier historien de cette montagne, et Claret de Latourette qui dressa, pour la première fois, en 1770, l'inventaire de ses richesses végétales, il y eut place pour plusieurs explorateurs. L'un des plus consciencieux et des moins connus, J.-B. Goiffon, avait dressé le catalogue détaillé des plantes récoltées par lui au Pilat dans le courant de l'année 1700 et, si ce travail ne fût pas resté inédit, le *Botanicon* de Latourette n'y eût ajouté que bien peu de nouveautés ; je laisse à mon excellent ami, M. le D^r Magnin, le soin de publier la *Descriptio montis Pilati* de Goiffon, d'après la copie du manuscrit original que je lui ai communiquée ; quant à moi, mon rôle sera plus modeste, et je me bornerai à faire connaître quelques particularités inédites des voyages d'Antoine de Jussieu et du père Barrelier au mont Pilat et dans la région Lyonnaise.

Il n'est pas inutile de rappeler, au début de cette étude, que Goiffon fût le maître du premier représentant de cette illustre dynastie botanique dont la ville de Lyon est le berceau : ce fut Goiffon qui révéla au jeune Antoine de Jussieu que sa famille

destinait à l'Église, sa véritable vocation ; ce fut lui qui le recommanda à Chirac, docteur-régent de la Faculté de Montpellier ; ce fut encore sous les auspices de Goiffon, qu'il entra à Paris, au Jardin-Royal, où bientôt il devait occuper une place de professeur. Devenu lui-même un maître, l'élève reconnaissant dédia dans les termes les plus flatteurs l'un de ses premiers travaux (1) à celui qui lui avait ouvert la voie. De ses premières herborisations, auxquelles il est fait allusion dans la dédicace que je viens de rappeler, de Jussieu ne nous a pas conservé le récit, nous savons seulement qu'elles embrassèrent les environs de Lyon, le Forez, le Beaujolais, la Bresse, le Bugey, le Valromey, le Dauphiné, et que Goiffon reçut communication des récoltes de son élève (2). Nommé professeur au Jardin du Roi, Ant. de Jussieu ne fit plus que de courtes visites à sa ville natale ; nous l'y retrouvons cependant dans le courant de l'été 1716, et c'est alors qu'il rédigea les *Notes* que je transcris ci-après ; ce séjour à Lyon et les courses botaniques qui en furent la conséquence, n'étaient du reste que la première étape d'un voyage en Espagne et en Portugal, entrepris par ordre du Régent, dans le but de rechercher les plantes mentionnées dans le *Corollaire* de Tournefort.

Écrit dans un latin qui réunit l'élégance à la simplicité, le manuscrit d'Ant. de Jussieu mentionne plus spécialement les plantes sur lesquelles les auteurs de l'époque n'étaient point d'accord ; chaque espèce est accompagnée d'une description ou d'observations critiques et est le plus ordinairement désignée par une phrase des *Institutes* de Tournefort ou par l'un des synonymes de cet auteur ; ces diagnoses et ces remarques critiques n'offrant plus aujourd'hui qu'un médiocre intérêt, je me bornerai à reproduire les phrases spécifiques du manuscrit, avec l'indication des localités donnée pour chaque espèce ; j'y ai joint la synonymie Linnéenne d'après mes vérifications dans l'herbier des de Jussieu ; il est vrai que les échantillons de cette collection, suivant un usage trop fréquent à cette époque, ne sont pas toujours munis d'indication d'origine, du moins, les étiquettes

(1) *Discours sur les progrès de la botanique* ; Paris, 1718, in-4°, dédié à « Monsieur Goiffon, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier, « Aggrégé au Collège des Médecins et Echevin de Lyon. »

(2) Cfr. : *Mémoires de l'Académie Royale des Sciences*, 1758, p.p. 116 et 117.

détaillées qui les accompagnent permettent-elles de reconnaître avec certitude, à quelle espèce linnéenne Ant. de Jussieu appliquait les synonymes de ses prédécesseurs ou de ses contemporains.

Le manuscrit se termine par une sorte de memento dans lequel Ant. de Jussieu a consigné brièvement quelques remarques d'histoire naturelle, les noms de plusieurs de ses correspondants, et jusqu'à une dépense de 8 livres 13 sols pour l'achat de papier à herbier ; j'ai conservé ces détails qui peuvent intéresser le biographe et, pour plus d'exactitude, j'ai soigneusement respecté l'orthographe d'Ant. de Jussieu.

Enumeratio plantarum observatarum a nobis, anno dⁿⁱ 1716
(Auctore Antonio de Jussieu).

Parisiis egressus cum D^o Simoneau (1) pictore et sculptore in æs, et cum fratre meo Bernardo, quæ Lugdunum viam ducit sumpsi die 20 augusti 1716. Pernoctavimus hac die in pago Juvisy dicto. 21 transivimus per sylvam Fontis bellaquei, ibique collegimus Calamintham quamdam quæ in Turnefortii Institutionibus vocatur « Calamintha procerior, magno flore, sylvæ Fontis bellaquei. » In sylva et circa urbem Fontis bellaquei satis copiose florebat (Calamintha menthæfolia Host.).

Stramonium fructu spinoso, oblongo, flore violaceo, *Inst.* Vulgare est in via circa Nemours (Datura Tatula L.).

Gramen dactylon, spicis villosis, C. B. In aridis frequens secus vias. (Andropogon Ischæmum L.).

Sesamoides fructu stellato. *Inst.* Florebat julio anno 1711 et augusto 1716 circa Bussiere prope Nogent eundo Nivernum. (Asterocarpus Clusii Gay.).

Genista Spartium brevioribus aculeis, *Inst.* Sub finem æstatis florebat circa Cône eundo Nivernum. (Ulex nanus Sm.) Fœniculum sylvestre, perenne, Ferulæ folio breviori, *Inst.* Secus viam obvia plerumque est in incultis. (Seselimontanum L.).

Scrophularia Ruta canina dicta, vulgaris, C. B. Prope la Charité eundo Nivernum et in agro Lugdunensi sæpius fuit obvia. (Scrophularia canina L.).

Xeranthemum flore simplici, minore, *Inst.* Circa la Palisse

(1) Dessinateur et graveur de l'Académie des Sciences.

copiose est eundo Lugdunum. (*Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm.).

Tribuloides vulgare, aquis innascens, *Inst. app.* Florebat fructusque ferebat maturos augusto in paludosis Sancti Gerand eundo Roanne (*Trapa natans* L.).

Linaria Bellidisfolio, C. B. Ubique in vicinia montis Tarare copiose est. (*Anarrhinum bellidifolium* Desf.).

Jacobæa alpina, foliis Ferulaceis, flore minore, *Inst.* In monte Tarare. (*Senecio adonidifolius* Lois.).

Chamæcerasus alpina, fructu nigro, gemino, C. B. In monte Pila supra Lugdunum. (*Lonicera nigra* L.).

Doronicum Plantaginis folio, alterum, C. B. Flos ejus exsiccatus sternutationem movit; a rusticis pro Betonicâ accipitur. In pratis humidis montis Pila. (*Arnica montana* L.).

Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus, C. B. In sylvis montis Pila. (*Doronicum austriacum* Jacq. (1)).

Cacalia foliis cutaneis, acutioribus et glabris, C. B. In sylvis montis Pila. (*Adenostyles albifrons* Rehb. (2)).

Rubus Idæus, spinosus, C. B. Ubique in sylvis montis Pila; fructus mense augusto mature fere incipiebat. (*Rubus idæus* L.).

Sambucus racemosa, rubra, C. B. In silvis copiose satis. (*Sambucus racemosa* L.).

Chrysosplenium foliis minoribus, subrotundis, *Inst.* Secus rivulos sæpius fuit obvia (*Chrysosplenium alternifolium* L.).

Cruciata Lusitanica, latifolia, glabra, flore albo, *Inst.* Rarius occurrit in monte Pila. (*Galium rotundifolium* L. (3)).

(1) Suivant une remarque qui m'est communiquée par le Dr Saint-Lager, les botanistes du siècle dernier, et notamment Ant. de Jussieu, Linné, Claret de la Tourrette et Gilibert, n'ont pas su distinguer, comme il convenait, le *Doronicum pardalianches* du *D. austriacum* décrit et figuré, d'abord par de l'Ecluse (*Rar. plant. histor. XIX*), puis par Jacquin. C'est Vaiolet qui, le premier, a démontré que le *Doronicum* du Pilat est bien le *D. austriacum*. (Voyez Balbis *Flore Lyonnaise*, A. Magnin *Enum. pl. Beaujolais*).

(2) La phrase de C. Bauhin citée par Ant. de Jussieu se rapporte au *Cacalia alpina* L. (*C. glabro folio* Clusius) qui n'existe pas au Pilat. — Il fallait dire « *C. foliis crassis hirsutis* C. Bauhin, *C. incano folio* Clusius ». Telles sont en effet les dénominations imposées par l'auteur du Pinax et par de l'Ecluse au *Cacalia albifrons* (Linné fils), le seul qu'on trouve au Pilat.

(3) Linné rapporte la phrase des Institutes à son *Asperula lævigata*; or, des deux échantillons de l'herbier de Tournefort réunis sous cette même phrase spécifique, l'un appartient au *Galium ellipticum* Willd., et l'autre au *G. articulatum* Lam.; enfin, dans l'herbier de Vaillant le synonyme des Institutes désigne seulement le *G. ellipticum*, tandis que dans l'herbier des de Jussieu il est uniquement appliqué au *G. articulatum*. Malgré cette confusion, il n'est pas douteux, en ce qui concerne la plante du Pilat, qu'Ant.

Uva Ursi, Clus. Ibid. (Arctostaphylos Uva ursi Spreng.).

Chondrilla Sonchifolio, flore purpurascente, major, *Inst.* Ibid. (Prenanthes purpurea L.).

Lactuca montana, latifolia, laciniata, flore cæruleo, *Inst.* Ibid. (Lactuca Plumieri Gr. et Godr.).

Thymelæa Laurifolio deciduo, sive Laureola fœmina, *Inst.* Ibid. (Daphne Mezereum L.).

Valeriana alpina, Scrophulariæfolio, C. B. In summo monte versus la Chaux de Pila et versus le Sau de la rivière de Gier (Valeriana tripteris L.).

Sedum minus, album, teretifolium, subhirsutum, C. B. E rupium rimis erumpit ac supra saxa humida delectatur. Ascendendo montem Pila ex parte urbis Sancti Chaumont, septembri florebat, dein inveni prope Belgarde in Roussilionis provincia et in Hispania versus Granatam. (Sedum hirsutum All.).

Cytisogenista argentea Montis Pilati; Genista sive Spartium purgans, J. B. Vulgaris in monte Pila et vicinia ejus; tum circaurbem Saint-Chaumont rustici ad scopas utuntur et Genistam humilem vocant suâ lingua « Genest griot ». (Sarothamnus purgans Gr. et Godr.).

Papaver pyrenaicum, erraticum, flore flavo, C. B. In loco montis Pila dicto la Combe de Savari. (Meconopsis cambrica Vig.) (1).

Gentiana lutea, major, C. B. Circa Pralégé oppidum. (Gentiana lutea L.) (2).

Viola montana, cærulea, grandiflora, *Inst.* Circa la Bessar. (Viola sudetica Willd.).

de Jussieu ait eu en vue le *G. rotundifolium*. La figure 324 et la note 100 des *Icones* du P. Barrelier ne laissent aucune incertitude sur ce point. Le *G. rotundifolium* L., auquel Ant. de Jussieu donnait les noms de : *Cruciata floribus paniculatis nascentibus* Tourn. et *Rubia semine duplici hispido*, etc., est représenté dans son herbier par des échantillons dépourvus d'indication de localité mais très probablement récoltés au Pilat; En effet, dans une note que j'ai sous les yeux, Ant. de Jussieu mentionne « les Sapins du Pilat » et il fait suivre cette remarque de la phrase caractéristique de *G. rotundifolium* L., or on sait que cette plante est, encore aujourd'hui, assez commune dans les forêts de sapins du mont Pilat.

(1) Je ne sais en quel point du mont Pilat il faut placer cette *Combe de Savari* plusieurs fois mentionnée par de Jussieu; c'est sur la lisière du Bois Noir, dans la vallée du Furon, au-dessus de Valbenoîte que les floristes les plus récents (Cariot, Le Grand, Saint-Lager) indiquent le *Méconopsis Cambrica* Vig.

(2) Pralagier ou Pralégé est encore la seule localité du massif du Pilat où croît la grande *Gentiane*.

Balsamine lutea, sive Noli me tangere, C. B. In monte Pila in loco dicto la Combe de Savari. (Impatiens Noli tangere L.).

Alsine muscosa, Lugd. Ubique in monte Pila (Mœhringia muscosa L.) (1).

Alsine montana, flore laciniato, C. B. In sylvis montis Pila. (Stellaria nemorum L.).

Alsineformis paludosa, tricarpus, major, Pluk. Variat plurimum herba hæc ratione soli plus minusve humidi; rivulorum oras delectatur humidioribusque locis cespitem densum, læte virentem efformat; in siccioribus locis tota planta fit multo minor. Secus rivos copiose crescit in monte Pila. (Montia rivularis Gmel.).

Jacobæa alpina, foliis longioribus, serratis *Inst.* In aridis montis Pila. (Senecio Fuchsii Gmel.).

Vitis Idæa foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante C. B. Frequentissima in toto monte Pila ubi Airelle dicitur. (Vaccinium Myrtillus L.).

Apocynum minus, rectum, canadense, Corn. In horto R. P. Minimorum Lugduni. (Asclepias incarnata L.).

Fœniculum dulce, C. B. In horto cujusdam Carthusiani Lugduni. (Fœniculum dulce D C.).

Tithymalus amygdaloides, angustifolius, Tabern. In Delphinatu, Galloprovincia et Gallia Narbonensi sæpius occurrit ut et in agro Parisiensi. (Euphorbia Esula L.).

Polium montanum, album, C. B. Prope Viennam et alibi in Delphinatu, Galloprovincia et Gallia Narbonensi. (Teucrium Polium L.).

Après avoir passé Saint-Pierre-le Moutier, près d'un village nommé Chatenay : Cailloux semblables à ceux de Medoc.

A Saint-Bel : Mines de cuivre et de vitriol (2).

A Saint-Chaumont : pierres tendres, feuilletées, sur lesquelles sont empreintes des plantes qui paroissent être de la famille de celles qu'on nomme Capillaires ou Fougères (3).

(1) C'est très certainement le *M. muscosa* L. que de Jussieu a voulu désigner, comme j'ai pu le vérifier dans son herbier; la présence dans le massif granitique du Pilat de cette espèce que les botanistes jurassiens ont cru être exclusivement calcicole est un fait important sous le rapports phytostatique.

(2) Cfr.; Ant. de Jussieu: Reflexions sur plusieurs observations sur la nature du gypse, in Mém. de l'Acad. des Sciences 1719 p. 82.

(3) Cfr. Ant. de Jussieu: Examen des causes des impressions de plantes marquées sur certaines pierres des environs de Saint-Chaumont dans la Lyonnais in Mém. de l'Acad. des Sciences 1718 p. 287.

A Lion, visites rendues à M. Goiffon pour apprendre de lui les endroits d'Espagne les plus fertiles en plantes ; en même temps un examen de plusieurs plantes qu'il en avoit rapportées (1).

Visite rendue à Neufville à M. l'archevêque de Lion : herborisation dans le parc avec M. Goiffon.

Lettres de crédit que M. La Croix, banquier, me donne pour ses correspondants d'Espagne et de Portugal.

Reçu de M. Pestalossi (sic) une dent fossile ; voyez Mémoires de l'Académie (2).

§ II. — LE P. BARRELIER.

Le nom du Père Barrelier serait presque ignoré aujourd'hui si l'un des principaux ouvrages du savant dominicain n'eût été sauvé de la destruction et édité par Ant. de Jussieu ; entre ces deux hommes qui ne se sont pas connus, dont l'un avait déjà disparu alors que l'autre n'était pas encore né, il existe donc une sorte de parenté scientifique qui me permet de réunir leurs noms dans cette étude.

En compulsant les *Plantæ per Galliam observatæ* on peut s'assurer que c'est à peine si, dans ce volumineux in-folio, le mont Pilat est cité trois fois, encore l'une de ces citations, celle du *Cruciata major, villosa, flore Molluginis* (Obs. 100 et Icon. 324) appartient-elle à Ant. de Jussieu ; de cette absence presque complète de documents sur la principale montagne du Lyonnais on aurait tort de conclure que le P. Barrelier n'a pas herborisé au Pilat ; je trouve la preuve évidente du contraire dans un manuscrit du P. Barrelier lui-même, lequel, après avoir appartenu à Ant. de Jussieu, est devenu la propriété du Muséum de Paris. C'est un petit volume de 15 cent. de hauteur sur 10 cent. 1/2 de largeur, relié en velin et portant encore sur ses plats les traces de l'incendie qui détruisit une partie des collec-

(1) C'est très probablement à cette époque qu'Ant. de Jussieu reçut de Goiffon une assez belle série de plantes d'Espagne qui figurent encore aujourd'hui dans l'herbier des de Jussieu, conservé au Muséum de Paris.

(2) Cette indication paraît avoir été ajoutée postérieurement à la rédaction du manuscrit ; elle se rapporte probablement à l'un des mémoires de paléontologie publiés par Ant. de Jussieu en 1721 et 1724 (loc. cit. p. p. 69, 322 et 209).

tions et des manuscrits du P. Barrelier ; il contient la liste des plantes récoltées par ce botaniste dans ses nombreuses herborisations en divers lieux de la France. C'est dans ce manuscrit, curieux à bien des titres, que Guettard a puisé toutes les indications relatives à la végétation des environs de Malesherbes (1) ; je ne crois pas, du reste, qu'il ait été fait au travail du savant dominicain, d'autre emprunt que celui que je viens de rappeler.

Le P. Barrelier ayant négligé d'inscrire une date en tête de chacune de ses herborisations, il m'est impossible de fixer avec précision l'époque à laquelle il fit l'excursion du Pilat ; mais divers indices relevés au cours de mes recherches, me donnent à penser que le P. Barrelier a dû visiter cette montagne en même temps qu'il explorait le Dauphiné pour le compte de Gaston d'Orléans, c'est-à-dire pendant la période comprise entre les années 1646 et 1650.

On sait que l'auteur des *Plantæ per Galliam observatæ* avait adopté une nomenclature différente de celle des botanistes de son temps (2) ; pour la faire concorder avec les dénominations linnéennes, j'ai dû, en l'absence des collections du P. Barrelier aujourd'hui détruites, m'en rapporter à la synonymie des anciens auteurs, et plus spécialement, aux herbiers de Tournefort, de Vaillant et d'Ant. de Jussieu.

Index plantarum quæ in monte Pilatiejusque vicinia vegetant
(Auctore Jacobo Barrelier).

Telephium vulgare, majus, C. B. (Sedum Telephium L., non Gr. Godr., S. maximum SUTER).

Lilium Convallium, minus, C. B. ; Gramen Parnassi Cam. In altioribus pratis et silvis. (Maianthemum bifolium D. C.).

Lunaria Botrytis seu racemosa, J. B. In altioribus pratis (Botrychium Lunaria Sw.).

Doronicum Plantaginis folio, alterum, C. B. ; Ptarmica montana, Lugd. In siccioribus et elatioribus pratis (Arnica montana L.).

Coronopus minimus, tenuifolius, hirsutus, Col. (Plantago carinata Schrad.).

(1) Cfr. : Guettard, *Observations sur les Plantes*, p. XXXVIII.

(2) Cfr. : *Mémoires de l'Académie des Sciences*, 1714, p. 42 et 1758, p. 121.

Alchimilla alpina, quinque folia, argentata C. B. Inter saxa altiora (*Alchimilla alpina* L.),

Gnaphalium anglicum, Raj. In declivibus locis (*G. sylvaticum* L.).

Pyrola rotundifolia, major, C. B. In sylvis declivibus (*P. rotundifolia* L.).

Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus, C. B. In summis jugis montis Pilati (*D. austriacum* Jacq.).

Napellus verus, Lob. Ibid. (*Aconitum Napellus* L.),

Vaccinia nigra Dod. ; *Vitis Idæa* foliis oblongis, crenatis, fructu nigro, C. B. Ubique in montosis (*Vaccinium Myrtillus* L.).

Doria major, incana, Barr. *Solidago sarracenica*, Trag., Fuchs. (*Senecio Fuchsii* Gmelin).

Levisticum foliis Cicutæ, Barr. ; *Siler creticum*, Cam. In pratis declivibus. (*Chærophyllum hirsutum* L.).

Meum athamanticum, Moris. In pratis ubique (*Meum athamanticum*, Jacq.).

Valeriana minor, alpina, petræa, Barr. In saxosis jugis (*Valeriana tripteris* L.).

Cacalia prima, incano folio, Clus. In apricis montosis (*Cacalia albifrons* L. fil.).

Martagon Rupp. In monte Pilati. (*Lilium Martagon* L.).

Herba Paris Cæs. In silvis umbrosis. (*Paris quadrifolia* L.).

Aconitum Bathracordis, flore albo, Barr. In editioribus pratis juxta rivos. (*Aconitum Lycoctonum* L.).

Aconitum racemosum, J. B. ; *Christophoriana* Clus. In silvis et acclivibus ad orientem. (*Actæa spicata* L.).

Rapunculus alopecuroides, maculatus, flore albo, Barr. Ibid. (*Phyteuma spicatum* L. ; Cfr: Barrelier, *Plantæ per Gall.* obs. n° 88, Icon. 892).

Rapunculus alopecuroides, vulgaris, flore albo, Barr. Ibid. (*Phyteuma spicatum* L.).


Rapunculus alopecuroides, maculatus, flore cæruleo, Barr. Ibid. (*Phyteuma nigrum* L.).

Polygonatum angustifolium, J. B. (*P. verticillatum* All.)

Oxallis rotundifolia, major, Barr. (*Rumex scutatus* L.).

Adiantum minus, angustifolium, crispum, Barr. In rudibus (*A. Ruta muraria* L.).

Adiantum tenuifolium, mollius, Barr. Ibid. (*Cystopteris fragilis* Bernh. ? ?).



- Ceterach, J. B. Ibid. (Ceterach officinarum Willd.).
 Umbilicus Veneris, minor, Barr. Ibid. (Umbilicus pendulinus D. C.).
 Saxifraga aurea Dod. (Chrysosplenium oppositifolium L.).
 Lychnis viscosa, flore albo, Tourn. In siccis et editioribus pratis montis Pilati (Silene armeria L. var. flore albo).
 Hieracium maculatum, Barr. (Hypochæris maculata L.).
 Veronica flore albo, Barr. In pratis convallium. (V. montana L.).
 Calamintha montana, Pulegii odore, Barr. In silvis. (C. grandiflora Mœnch).
 Calaminthum incanum, minus, Bar. In siccis planitiei. (C. Menthæfolia Host.).
 Chamænerium Tourn. In pratis. (Epilobium spicatum Lam.).
 Linaria purpurea, odorata, Bellidis folio, Barr. In montosis (Anarrhinum bellidifolium Desf.).
 Lychnis viscosa, purpurea, Barr. Inter saxa collis juxta Coindrium (1) quæ est ad viciniam oppidi. (Viscaria purpurea Wimmer).
 Lilium convallarium, majus, Lind. (Convallaria majalis L.).
 Gnaphalium montanum, flore albo, purpureo et carneo, Barr. Ubique in siccioribus. (Antennaria dioica Gærtn.).
 Asperula flore albo, Barr. In silvis. (Asperula odorata L.).
 Filix fontana, tenuifolia, pinna rotunda, major, Barr. In pratis (Cystopteris fragilis Bernh. ?).
 Filix fontana, tenuifolia, acuta, major, Barr. In pratis. (?)
 Filix corniculata, Moris. ; saxatilis, Lob. in rupibus. (Asplenium septentrionale Sw.).
 Satyrium Basilicum, maculatum, elegans, Barr. (Orchis maculata L.).
 Filix saxatilis, major, Barr., (Asplenium septentrionale Sw.).
 Filix carbonaria Tragi, Barr. Dryopteris tenuifolia, ramosa. Barr. In rupibus (Polypodium Dryopteris L.).
 Sonchus lævis, perenni radice, purpureus, Barr. In silvosis. (Prenanthes purpurea L.).
 Platanus, Barr. (Acer pseudoplatanus L.).
 Aria Theophrasti, Barr. (Sorbus Aria Crantz.).

(1) Probablement Condrieu.

Sorbus, J. B. (*Sorbus torminalis* Crantz.).

Cornus altera Barr. (*Cornus mas* L.).

Sambucus montana, *racemosa*, *fructu rubro*, Barr. (*S. racemosa* L.).

Castanea fructu nigro, Barr. (*Castanea vulgaris* L.).

Rubus Idæa, *saxatilis*, *alpina*, Barr. Ubique fere in acclivis (1).

Rubus hirsuta, *rubra*, Barr. Ubique in acclivis. (*R. idæus* L.).

Persicaria siliquosa vulgo *Noli me tangere*, Lob. (*Impatiens Noli tangere* L.).

Bistorta major, Clus. (*Polygonum Bistorta* L.).

Gramen Parnassi, vulgare, Cam. (*Majanthemum bifolium* D C.).

Ranunculus nemorosus *Fuchsii*, flore albo et carneo Barr. (*Anemone nemorosa* L.).

Genista scoparia, minor, Barr. (*Sarothamnus purgans* Gr. et Godr.).

Chamægenista folio articulato. Barr. In acclivibus (*Genista sagittalis* L.).

Chamægenista supina, Bar. (*Genista pilosa* L.).

Padus Theophrasti, Dal. (*Cerasus Padus* D C., *C. racemosa* Lobel).

Sonchus montanus, *purpureus* τετραπεταλον Col. (*Prenanthes purpurea* L.).

Juxta Lugdunum.

Carduus tuberosus, *Cnici facie* vel *Cirsium tuberosum*, Barr. In pratis supra Rhodani pontem (*Cirsium bulbosum* D C.).

Pimpinella major, seu *Sanguisorba*, Barr. Ibid. (*Sanguisorba officinalis* L.).

Sanicula alpina, seu *Diapensia minor*, Barr. In horto Recollectorum Lugduni a fratre Justino. (*Cortusa Matthioli* L.).

(1) Il est probable que ce prétendu *R. saxatilis* est un *R. idæus* jeune et non encore ligneux.