
BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})

Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6^e)

ABONNEMENT ANNUEL : France et Colonies Françaises : 600 francs — C.C.P. Lyon 101-98
Etranger 700 francs

**DESCRIPTION D'UNE FORME NOUVELLE
DE TRICHIURA CRATAEGI L.
(Lep. Lasiocampidae)**

par Ch. BOURSIN (*Paris*).

Notre collègue, M. R. PASSIN, de St-Vincent-du-Lorouër (Sarthe), me soumit récemment un exemplaire de *Trichiura crataegi* L. très différent de la forme normale et qui me parut nouveau. Je me réfèrai à la petite monographie que M. F. DANIEL, le spécialiste bien connu du Muséum de Munich, vient de consacrer à cette espèce¹, mais n'y trouvai rien qui puisse s'appliquer à l'exemplaire de notre collègue. Consulté, M. F. DANIEL répondit qu'il s'agissait là d'une très intéressante forme atteinte de mélanisme partiel et non encore nommée. Je la décris ci-dessous comme suit :

***Trichiura crataegi* L. *Passini* n. f.**

Se distingue de la forme normale par le mélanisme qui atteint la bande foncée médiane, qui est d'un noir accentué, et s'étend depuis la ligne postmédiane jusqu'à la base, ne laissant qu'un faible espace à la côte de la couleur du fond, qui est gris sale. L'aile supérieure apparaît donc divisée nettement en deux parties, une noire et une grise. La ligne antémédiane est absorbée par la teinte noire, ainsi que la ligne basale, et la subterminale est à peine indiquée. Les ailes inférieures sont presque normales, mais très foncées, avec la bande médiane également très sombre.

Le dessous est également légèrement aberrant en ce sens que la bande foncée de l'aile supérieure est très développée, noirâtre, et s'élargissant nettement vers la côte, où elle forme une sorte de tache assez large. A l'aile inférieure la bande médiane est également très apparente. Les autres parties du corps sont normales, bien que plus foncées.

Envergure : 32 mm.

Holotype : 1 ♂, Ruillé Froid-Fonds (Mayenne), commune située à 10 km au nord-est de Château-Gontier, 15 octobre 1955 (Coll. R. PASSIN).

M. R. PASSIN a bien voulu me donner sur cette localité les renseignements suivants. L'altitude moyenne est de 120 mètres, le terrain est très argileux, *il n'y a pas de calcaire*, la campagne est relativement boisée, avec beaucoup de haies. La superficie des parties boisées (forêts et taillis) est de 200 ha sur une superficie communale de 2.200 ha. L'essence forestière qui domine est le chêne, il y a un peu de hêtre, de l'orme et du peuplier. *Trichiura crataegi* s'y trouve en abondance tandis qu'il est plutôt rare à St-Vincent-du-Lorouër (Sarthe).

Cette intéressante forme, pour la capture de laquelle je félicite notre collègue, sera figurée dans un travail ultérieur.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 13 avril 1957.

1. F. DANIEL : « Die Formen von *Trichiura crataegi* L. » in « Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen », V, Nr 7, 8, 9, pp. 67 à 71, 78, 79, 80 et 87 à 94, 1956.